

L. VIDAL & M. DAREAU

**DICTIONNAIRE  
DE SPÉCIALITÉS  
PHARMACEUTIQUES**

1921



**OFFICE DE VULGARISATION  
PHARMACEUTIQUE**

127, Boulevard Sébastopol, PARIS



P. 11247



---

L. VIDAL & M. DAREAU

---

---

# DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

---

1921



---

OFFICE DE VULGARISATION  
PHARMACEUTIQUE

127, Boulevard Sébastopol, PARIS

---





## 1<sup>re</sup> Partie

---

# NOMENCLATURE NOMINALE DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES MÉDICALES,

avec noms et adresses  
de leurs fabricants.

---



Les noms des produits précédés d'un astérisque figurent dans la 2<sup>e</sup> partie du présent ouvrage avec leurs compositions, propriétés thérapeutiques, indications et posologies.



## A

* Acésine	Lab. A. GUILLAUMIN, 13, r. du Cherehe-Midi, Paris (7 <sup>e</sup> ).
* Acrisol Clérambourg	4, rue Tarbé, Paris.
Adrénaline Byla	26, avenue de l'Observatoire, Paris.
* Adrénaline Clin	20, rue des Fossés-Saint-Jaeques Paris.
* Aethone Falcoz	9, rue Boissonnade, Paris.
Alatyl	Lab. H. CARRION & C <sup>e</sup> , 54, faub. St-Honoré, Paris.
Agar Gligon	7, rue Coq-Héron, Paris.
* Agaryl Pournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Ag. Colloïdal	HOFFMANN-LA ROCHE & C <sup>e</sup> , 21, place des Vosges, Paris.
Aconel Coignet	43, rue de Saintonge, Paris.
* Airol Roche	21, place des Vosges, Paris.
Albuminate de fer	COLLIN, 49, r. de Maubeuge, Paris.
Laprade	
Albuvere	Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.
Alcarhène Monnier	19, rue de Chartres à Neuilly-sur-Seine.
Alcoolature d'Aconit	BUISSON, 157, rue de Sèvres, Paris.
Eccalle	
Aldogène Carteret	15, rue d'Argenteuil, Paris.
Alga Montagu	49, boul. Port-Royal, Paris.
* Algarine Nyrdhal	20, rue La-Rochefoucauld, Paris.
* Algatan	Laboratoire de l'Antidol, 40, rue Condoreet, Paris
* Algocratine Lancosme	71, avenue Viotor-Emmanuel III, Paris.
* Algélane Poulenc	92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Allocaïne Lumière	Cours de la Liberté, Lyon.
Amandol	DURET & RÉMY, 5, avenue des Tilleuls, Paris.
Ambrine	48, boul. La-Tour-Maubourg, Paris.
Amibiasine	30, boul. Rabelais au Pare-Saint-Maur (Seine).
Ampoules Bi-iodure Hg. Midy	9, rue du Commandant-Rivière, Paris.
Ampoules Boissy	356, rue St-Honoré, Paris.
* Ampoules Churchill	SWANN, 12, rue Castiglione, Paris.
Ampoules Clin pour Rachi-anesthésie (Syncaïne)	20, rue des Fossés-Saint-Jaeques, Paris.

* Ampoules de Digalène	HOFFMANN-LA ROCHE & C <sup>e</sup> , 21, place des Vosges, Paris.
Ampoules Guillaumin	168, boul. St-Germain, Paris.
Ampoules Paillard & Ducatte	8, place de la Madeleine, Paris.
* Ampoules de Pantopen	HOFFMANN-LA ROCHE & C <sup>e</sup> , 21, place des Vosges, Paris.
* Amylodiasase Thépénier	12, rue Clapeyron, Paris.
* Anaquintine Lescène	à Livarot (Eure).
Anestile Bengué	47, rue Blanche, Paris.
Anæsthénine	DURET & REMY, 5, avenue des Tilleuls, Paris.
* Aniodol	40, rue Condorcet, Paris.
* Antacidol	DURET & REMY, 5, avenue des Tilleuls, PARIS.
* Antalçol Dalloz	13, boul. de la Chapelle, Paris.
* Anthema	Etabl. POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
* Antialgès Christiaens	à Reims.
* Antiasthme Bengalais	FAGARD, 44, rue d'Aguesseau, Boulogne-sur-Seine.
Anticalculose du Dr Barbier	1, place du Louvre, Paris.
Anti-cholestérine	FOULON & C <sup>e</sup> , 188, faub. Saint-Martin, Paris.
Anti-diabétiques Redeuil	7, rue Couche, Paris.
Antigastralgique Winckler	MIDY & C <sup>e</sup> , 9, rue du Commandant-Rivière, Paris.
* Antigrippine Midy	MIDY & C <sup>e</sup> , id.
Antikamnia	5, rue de la Paix, Paris.
Antimucose Mariani	41, boul. Haussmann, Paris.
* Antiphlogistine	116, rue de la Convention, Paris.
Antipyrine	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Antipyrine Clin	20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Antipyrine Le Perdriel	11, rue Milton, Paris.
Antiseptic-Öil	Dr LUCCHINI, au Vernet-La-Varenne (P.-de-D.)
* Antédyne Poulenc Frères	92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Antonal	5 et 7, rue Henry-Gréville, Angers.



*Apaludol	AUCLAIR, à Aigurande (Indre).
Apiel Briand	DEGLOS, 131, rue de Vaugirard, Paris.
Apiel Joret & Homelle	165, rue Saint-Honoré, Paris.
Apieline Chapoteaud	VIAL, 8, rue Vivienne, Paris.
Archésine Trouette-Perret	15, rue des Immeubles-Industriels, Paris.
Argent colloïdal Nyr-dhal	20, rue La-Rochefoucauld, Paris.
*Arhéol Astier	45, rue du D <sup>r</sup> Blanche, Paris.
*Arhine Lambiotte Frères	3, rue d'Edimbourg, Paris.
*Arquéritol	LESURE, 70, r. du Bac, Paris.
Arrhénal Adrian	9, rue de la Perle, Paris.
Arrhénuclène Ber-gérin.	à Chateaudun (Eure-et-Loir).
Arsenic Organique Glasser	COIRRE, 79, rue du Cherche-Midi, Paris.
*Arséniode Buriat	30, rue Pergolèse, Paris.
Arsenien Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.
*Arsénebenzel Billon	POULENC Frères, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Arsledyl Chassaïne	à Ruffec (Charente).
*Arsycodyle Leprince	62, rue de La Tour, Paris.
Arsynal Legrand	GRÉMY, 14, rue de Cliehy, Paris.
*Arthri-sel	BOILLOT & C <sup>e</sup> , 9, rue Saint-Paul, Paris.
*Arthritose	Lab. du MARINOL, à Dieppe (Seine-Inférieure).
*Asciatine	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
*Ascoléine Rivier	26, rue Saint-Claude, Paris.
Aspirine	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Aspirine granulée	Id.
*Aspirine Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Asquirrol Peulene Frères	92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Asthmelysine	Lab. G. MIESCH, 228, boul. de la Villette, Paris.
*Atenes	R. CUISINE, 1 rue de Stras-bourg, Asnières.
*Atophan Cruet	13, rue des Minimes, Paris.
Atexyl Peulenc Frères	92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
*Atural Peulene Frères	92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Audigénine	Maison L. FRÈRE, 10, rue Jacob, Paris.
Aurion Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.

Azotyl	50, rue Rennequin, Paris.
Azufrel Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.
<b>B</b>	
Bactiexyne	USINES CHIMIQUES DU PECQ, 39, r. Cambon, Paris.
Balsamol Lescène	à Livarot (Calvados).
Baume Baissade	D <sup>r</sup> BAISSADE, à La Garde près Toulon (Var).
Baume Analgésique Benqué	47, rue Blanche, Paris.
Baume du D <sup>r</sup> Blan- card	LAPORTE, 1, rue d'Enghien, PARIS.
Baume Delacour	ROGIER, 19, av. de Villiers, Paris.
Baume Duret	VENDEL, 61, rue de Vau- girard, Paris.
Baume Suelta	FOURIS, 9, faub. Poisson- nière, Paris.
Benzhermyl	AGUETTANT, 36, quai Ful- chiron, Lyon.
Béatol	Lab. de Bio-Chimie appli- quée, 21, rue Théodore-de- Banville, Paris.
Benzoate de Naphtol	FRAUDIN, 4, av. Desfoux, Boulogne-sur-Seine.
Benzecalyptol	GOUDAL, 213, rue St-Honoré, Paris.
Benzo-iodhydrine Bruel	36, rue de Paris, Colombes, (Seine).
Benzo-Lactol	26, rue de Sévigné, Paris.
Bétul-ol Midy	9, rue du Commandant-Ri- vière, Paris.
Bibremure de Hg. Vicarie	17, boul. Haussmann, Paris.
Bière Déjardin	109, boul. Haussmann, Paris.
Bifidus Minerva	10, rue Nouvelle, Bagneux (Seine).
Bi-iodural Nevat	à Mâcon (S.-&-L.).
Bi-iodure de Hg. Midy	9, rue du Commandant-Ri- vière, Paris.
Bi-iodure Souffren	Etablissements BUISSON, 157, rue de Sèvres, Paris.
Biléyl Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Bilifluine	BEAUGONIN, 21, rue Piepus, Paris.
Biliel Bouty	3 <sup>es</sup> , rue de Dunkerque, Paris.
Binol Roger	177, boul. St-Germain, Paris.
Biocalcose Chevretin	Laborat. CHEVRETIN & LE- MATTE, 5, rue Ballu, Paris.

* Biogénol Demasles	à Vienne (Isère).
Bioésine Richard	à Lorient.
* Biolactyl Fournier	25, boul. de l'Hôpital, Paris.
* Bienéol	FUSADE, à Limoges.
* Biophonine Girard	48, rue d'Alésia, Paris.
Biosine Le Perdriel	11, rue Milton, Paris.
Biphosphate de chaux	Etab. JACQUÉMAIRE, Villefranche (Rhône).
Bismuth Desleaux	LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel III, Paris.
Blastéase	HOFFMANN-LA ROCHE & C <sup>e</sup> , 21, pl. des Vosges, Paris.
* Blédine Jacquemaître	à Villefranche (Rhône).
Bluetine	Régis MEILLER, à Dunières (Hte-Loire).
Beldine Houdé	9, rue Dieu, Paris.
* Beldo Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Beldo-Verne	à Grenoble (Isère).
Beldoine Eparvier	26, Grand'Rue St-Clair, Lyon.
* Beléase Monal	Laboratoires MONAL & C <sup>e</sup> , 6, rue Danbigny, Paris.
Bonbons vermifuges Rcyer	LAUMONIER, 225, rue Saint-Martin, Paris.
Bornyval	L. ROHAIS & C <sup>e</sup> , 2, rue des Lions, Paris.
Boro-borax Vigier	12, boulev. Bonne-Nouvelle, Paris.
Bromalbin Adrian	9, rue de la Perle, Paris.
* Broméline Montaigu	49, boul. Port-Royal, Paris.
* Bromiase Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.
Bromocarpine	OLIVIERO, 87, rue Denfert-Rochereau, Paris.
* Bromogénol Pépin	PIPIN & LEBOUCCQ, à Courbevoie (Seine).
Bromemaisine Salle	4, rue Elzévir, Paris.
* Bromene Robin	13, rue de Poissy, Paris.
* Bromure de camphre Clin	20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Bromure Laroze	ROHAIS & C <sup>e</sup> , 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
Bromure de Potassium	CLIN, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
* Bromure Sauffron	Etablissements BUISSON, 157, rue de Sèvres, Paris.
Bronchoplastre	CAVAILLÈS, 34, r. de Turin, Paris.
Breséyl	18, rue de Paris, Puteaux (Seine).
Buctol Pâris	4, rue Lamotte-Piquet, Paris.
* Bulgarine Thépénier	12, rue Clapeyron, Paris.

## C

- Cabilline** CHAMPION, 25, boulevard Latour-Maubourg, Paris.
- Cachets Boveil** 14, rue Grenette, Lyon.
- Cachets Charvoz** à Tassin-la-Demi-Lune (Rhône)
- Cachets du Dr Faivre** à Lyon.
- \* Cachets Roche de Thiecel** HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>e</sup>, 21, place des Vosges, Paris.
- \* Cachets de galacalcine Latour** 17, place des Vosges, Paris.
- Cacodylate de soude Clin** 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- Cacodylate Vigier** 12, boulev. Bonne-nouvelle, Paris.
- Cacodyle Gennen** 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
- \* Cacodyle-Phosphate vital Jacquemaire** à Villefranche (Rhône).
- Cæcaline Gagnière** à Clermont-Ferrand.
- Caféine Houdé** 9, rue Dieu, Paris.
- \* Calcéose Beillot** 9, rue Saint-Paul, Paris.
- \* Calciline** WATELET & C<sup>e</sup>, 25, rue Vanneau, Paris.
- Calciline** DIGNÉ Fils, à Fréjus (Var).
- Capsules Bonnefond** MONTAGU, 49, boulevard Port-Royal, Paris.
- Capsules Coignet** 43, rue de Saintonge, Paris.
- \* Capsules Dartois** FREYSSINGE, 6, rue Abel, Paris.
- Capsules Delpech** LABELONYE & C<sup>e</sup>, 99, rue d'Aboukir, Paris.
- Capsules Enter-Lerès** A. SOREL, à Boulogne-sur-Mer.
- Capsules de Gonosan** ROHAIS & C<sup>e</sup>, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.
- Capsules d'Ichtyol Vigier** 12, boulev. Bonne-Nouvelle, Paris.
- Capsules Pautan-berge** 165, rue Saint-Denis, Courbevoie (Seine).
- Capsules Ramel** COMAR & C<sup>e</sup>, 20, rue des Fossés St-Jacques, Paris.
- Capsules Raquin** FUMOUE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
- Capsules salées** LACROIX, 31, rue Philippe-de-Girard, Paris.
- Capsules Sérafen** 9, rue de la Perle, Paris.
- Capsules de Terpinol** GONNON, 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
- Carnine Lefrancq** FUMOUE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
- \* Cascara Alexandre** 41, rue de Rome, Paris.

- \* Cascara Midy 9, rue du Commandant-Rivière, Paris.
- \* Cascarine Leprince 62, rue de la Tour, Paris.
- \* Catalysine du Dr V. queraf FREYSSINGE, 6, rue Abel, Paris.
- \* Cataplasme Lelièvre 115, rue de la Réunion, Paris.
- \* Cathode Labor. BRISSON & C<sup>e</sup>, 111, rue du Mont-Cenis, Paris.
- Céréalose Labor. ASTIER, 45, rue du Docteur-Blanche, Paris.
- \* Cérébrine Fournier 49, boulevard Port-Royal, Paris.
- \* Cétrareose Gigon 7, rue Coq-Héron, Paris.
- \* Charbon de Bellec FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.
- \* Charbon granulé 4, avenue Desfieux, Boulogne-sur-Seine.
- \* Charbon naphtolé 4, avenue Desfieux, Boulogne-sur-Seine.
- \* Charbon Tissot 34, boulevard de Clichy, Paris.
- \* Chéloïdine BROCADET, 89, rue du Commerce, Paris.
- Chloral bromuré DURIEZ, 20, place des Vosges, Paris.
- \* Chloramide Dubois Labor. FREYSSINGE, 6, rue Abel, Paris.
- Chloréthyle Benqué 47, rue Blanche, Paris.
- \* Chloridia VERRIER & GUERNIER, 64, rue des Tournelles, Paris.
- \* Chlorobyl Labor. de Bio Chimie appliquée, 21, rue Théodore-de-Banville, Paris.
- Chloro-Calciol 8, rue de Constantinople, Paris.
- \* Chloroforme anes- USINES DU RHONE, 21, rue
- \* Chloroforme Lamber- Jean-Goujon, Paris.
- \* Choléine Camus 3, rue d'Edimbourg, Paris.
- \* Choléiteires Byla DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, Paris.
- \* Cholélyse Carbou 26, avenue de l'Observatoire, Paris.
- \* Choléobeldine Thé- 8, rue Jean-de-Bellay, Paris.
- \* Choléokinase 21, rue des Roses, à Dijon.
- \* Choléolactol Daquin DURET & REMY, 5, avenue des Tillents, Paris.
- \* CholerGINE 5, rue des Remises, St-Maur (Seine).
- Chrysoptase Daniel BRUNET, 6, rue de la Source, Paris.
- Cigarettes améri- FOUQUET & C<sup>e</sup>, 109, rue
- \* caines Leroy Landrin, 20, rue de La Rochefoucauld, Paris.

- Cigarettes du Dr Cléry 53, boul. St-Martin, Paris.  
 Cigarettes Espic 20, rue Saint-Lazare, Paris.  
 Citrosodine Grémy LONGUET, 50, rue des Lombards, Paris.  
 Clonazone Daufresne 40, rue Thier, Le Havre.  
 Coagulé Ciba O. ROLLAND, 1, pl. Morand, Lyon.  
 Coca Gmet 27, faub. Montmartre, Paris.  
 Cocaïne Midy 9, rue Commandant-Rivière, Paris.  
 Coccidal Grémy 14, rue de Clichy, Paris.  
 Codeforme Boitu 9, rue Dupuytren, Paris.  
 Colchi-Sal Midy 9, rue Commandant-Rivière, Paris.  
 Collargol Midy Id.  
 Colle-iodé Dubois 7, rue Jadin, Paris.  
 Colchiflor Vial 8, rue Vivienne, Paris.  
 Collobiases Dausse 4, rue Aubriot, Paris.  
 Colloïdes Clin 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.  
 Colloïdogénine du Dr Bayle CHAIX, 10, rue l'Orne, Paris.  
 Colloplastre CAVAILLÈS, 34, r. de Turin, Paris.  
 Collosol cadique Pépin 9, rue du 4-Septembre, Paris.  
 Collothiel COMAR & C<sup>e</sup>, 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.  
 Collaborine LAUMONIER, 225, rue Saint-Martin, Paris.  
 Collyres stérilisés C in 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.  
 Combrétine Limousin 10, rue du Bac, Paris.  
 Composé Gmet 27, faub. Montmartre, Paris.  
 Comprimés de Châtel Guyon MIRATON, à Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme).  
 Comprimés Guillaumin 13, rue du Cherche-Midi, Paris.  
 Comprimés Rogé-Cavaillès PEPIN, 9, rue du 4-Septembre, Paris.  
 Comprimés de Thlocol Roche HOFFMANN-LA ROCHE, 21, place des Vosges, Paris.  
 Comprimés Vichy-Etat G. PRUNIER & C<sup>e</sup>, 6, rue de la Tacherie, Paris.  
 Conduranço Ginet 27, faub. Montmartre, Paris.  
 Conduranço granulé Astier Laboratoires ASTIER, 45, rue du Docteur-Blanche, Paris.  
 Conicine Guilliermond DEGLÔS, 131, rue de Vaugirard, Paris.  
 Coréine DANIEL BRUNET, 6, rue de la Source, Paris.

• Corps Thyroïde Meneour	à Boulogne-sur-Seine.
• Cesmarégyle Tbévenet.	21, rue des Roses, à Dijon.
Cratægél Boulet	36, avenue Duquesne, Paris.
Cratægus Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Cratægus Oxyacantha	ROUSSEL, 10, rue Washington, Paris.
• Créosotforme Lambiotte Freres	3, rue d'Edimbourg, Paris.
Crésyl Jeyes	36, rue des Francs-Bourgeois, Paris.
Cryoéénine Lumière	9, cours de la Liberté, Lyon.
Cuprien Ceuturieux	18, avenue Hoche, Paris.
• Curatoxine Vendel	61, rue de Vaugirard Paris.
Curéol Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Cypridol Chapelle	8, rue Vivienne, Paris.
Cytagél	7, r. Vieille-la-Temple, Paris.
Cyto-Serum Corbière	27, rue Desrenaudes, Paris
Cyteplasmine Ducaffe	8, place de la Madeleine, Paris.
Cytuline Ceuturieux	18, avenue Hoche, Paris.

## D

Dentiseline Brissou	31, r. Boissy-d'Anglas, Paris.
• Dermofagine	15, pl. Godefroy-de-Bouillon, Boulogne-sur-Mer.
• Dermoplastol	DUMESNIL, 10, r. du Plâtre,
Diabéphobe	19, rue Jacob, Paris.
• Diabélifuge	Laborat. SCIENTIA, 10, rue Fromentin, Paris.
Diadermine	BONETTI Fr., 12, rue Vavin, Paris.
• Dial Ciba	O. ROLLAND, 1, pl. Morand, Lyon.
• Dialacetine Ciba	Id.
• Dialyl Brunet	16, rue Boulainvilliers, Paris.
• Diarrhéol	Villa Michel-Ange, à Beausoleil, près Nice.
• Diasténine Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
• Didial Ciba	O. ROLLAND, 1, pl. Morand, Lyon.
Diéménal	J. DEPRUNEAUX, 18, rue de Beaune Paris.
Diénel	Id.
• Digalène Roche	F. HOFFMANN-LÀ ROCHE & C <sup>e</sup> , 21, place des Vosges, Paris.
Digestif Capmartin	GILBERT, 3, rue du Trésor, Paris,

Digestif Clin	20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Digestif Pinel	D <sup>r</sup> THOUVENIN, à Bonnelles (S.-&-O.).
Digestif Recourat	à Fontaine-Bonneleau (Oise).
Digifoline Ciba	O. ROLLAND, 1, pl. Morand, Lyon.
Digitale Dausse	4, rue Aubriot, Paris.
Digitale Ecalle	BUISSON, 157, rue de Sèvres, Paris.
Digitaline Homelle & Quévenne	GENEVOIX, 14, rue des Beaux-Arts, Paris.
Digitaline cristallisée de Nativelle	49, boulevard Port-Royal, Paris.
Digitaline Mialhe	8, rue Favart, Paris.
Dimétel Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Dilodiforme Taine	ADRIAN, 9, rue de la Porte, Paris.
Dloradin	22, av. de Neuilly, Neuilly-sur-Seine.
Dioscène Prunier	6, avenue Victoria, Paris.
Disques Tulasne	11, rue Blanche, Paris.
Diurène	CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, Paris.
Dmégon	POULENC Frères 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Dmesta	Id.
Dmetys	Id.
Doloma	GUICHARD, 2, rue l'Hôpital-Saint-Louis, Paris.
Dragées antinerveuses Cavallès	PEPIN, 9, r. du 4-Septembre, Paris.
Dragées Benqué	47, rue Blanche, Paris.
Dragées Blottière	6, rue Dombasle, Paris.
Dragées de Bondon-veau	GUERIN, 60, cours de Vincennes, Paris.
Dragées Carbonel	CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, Paris.
Dragées Demazières	DEGLOS, 131, rue de Vaugl-rard, Paris.
Dragées de fer Ceagnet	43, rue de Saintonge, Paris.
Dragées de fer Rabuteau	CÔMAR & C <sup>e</sup> , 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Dragées erçotées	MANNET, à Loudun (Vienne)
Dragées Gélinau	MOUSNIER, à Secaux.
Dragées Gélis et Conté	LABELONYE, 99, rue d'A-boukir, Paris.
Dragées de Gille	GIRARD & C <sup>e</sup> , 73, rue Sainte-Anne, Paris.
Dragées du D <sup>r</sup> Hecquet	49, boul. Port-Royal, Paris.
Dragées Névrosthé-niques "Yse"	65, rue Louis-Blanc, Paris.



Dragées Nyrdhal	26, rue La-Rochefoucauld, Paris.
Dragées Pautauberge	165, r. St-Denis, Courbevoie.
Dragées Reine du fer	CHEVALIER, 5, rue Aubriot, Paris.
Dragées de Ruizia	LANDRIN, 20, rue La-Rochefoucauld, Paris.
Dragées Semedo	2, rue Colonel-Renard, à Meudon (S.-&-O.).
Dragées Vulcase Brisson	31, r. Bolssy-d'Anglas, Paris.
Dulcorine Brava	164, rue Saint-Honoré, Paris.
Dyspeptine Hepp	Labor. du Puits-d'Angle, Le Le Chesnay (S.-&-O.).

## E

Eau Antileucorrhéique Blottière	6, rue Dombasle, Paris.
Eau Chambille	MONTAGU, 49, boul. Port-Royal, Paris.
Eau de St-Colomban Ektegan	Bains-des-Bains (Vosges). 12, rue Lamartine, Paris.
Elatine Bouin	FAGARD, 44, rue d'Aguessean, Boulogne-sur-Seine.
Elbon Ciba	O. ROLLAND, 1, pl. Morand, Lyon.
Electrarégel Clin	20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Electraurel Clin	Id.
Electrocuprel	COMAR & C <sup>e</sup> , 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Electro Hg	COMAR & C <sup>e</sup> , id.
Electromanganol	COMAR & C <sup>e</sup> , id.
Electromartiel	COMAR & C <sup>e</sup> , id.
Electropalladiol	COMAR & C <sup>e</sup> , id.
Electro-p latinol	COMAR & C <sup>e</sup> , id.
Electro-Rhodiel	COMAR & C <sup>e</sup> , 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Electrosélénium	COMAR & C <sup>e</sup> , id.
Elixir d'antipyrine Laroze	ROHAIS & C <sup>e</sup> , rue des Lions-Saint-Paul, Paris.
Elixir Benjean	26, rue des Petits-Champs, Paris.
Elixir Bonnefond	MONTAGU, 49, boul. Port-Royal, Paris.
Elixir Bravais	3, rue Mogador, Paris.
Elixir Chambille	MONTAGU, 49, boul. Port-Royal, Paris.
Elixir créosoté Bonnefond	MONTAGU, id.

*Elixir Déret	COMAR & C <sup>ie</sup> , 20, rue des Fossés St-Jacques, Paris.
*Elixir Duehamp	Comte de GRAUWE, 10, rue Roeroy, Paris.
Elixir Duret	10, rue du Bac, Paris.
Elixir eupeptique Tisy	VAUDIN & GUILLAUMIN, 12, rue Charles V, Paris.
Elixir ferre crêpé	MANNET, à Loudun (Vienne).
Elixir Glover	R. CRUET, 13, rue des Minimes, Paris.
Elixir Grez	COLLIN, 49, rue Maubeuge, Paris.
Elixir du Dr Hequet	MONTAGU, 49, boul. Port-Royal, Paris.
Elixir Houdé	9, rue Dieu, Paris.
*Elixir Iode-dépuratif	C. PÉPIN, 9, rue du 4-Septembre, Paris.
Elixir Mannet ioduré	à Loudun (Vienne).
Elixir Mariani	41, boul. Haussmann, Paris.
Elixir Martin-Mazade	à Saint-Vallier (Drôme).
*Elixir du Dr Mialhe	8, rue Favart, Paris.
Elixir polybromuré Yvon	5, rue de la Feuillade, Paris.
Elixir Roussel	10, rue Washington, Paris.
Elixir toni-radical Blottière	6, rue Dombasle, Paris.
Elixir tribromuré Mannet	à Loudun (Vienne).
Elixir Vireoque	DEGLÔS, 131, rue de Vaugirard, Paris.
Elixir de Virginie Nyrdhal	LANDRIN, 20, rue La-Rochefoucauld, Paris.
Elixir Vital Quentin	MOUSNIER, à Seeaux.
Elkessam Collin	49, rue de Maubeuge, Paris.
*Embryonine du Dr Barré	à Argentan (Orne).
Emétinol Viel	7, rue Saint-Yves, Rennes.
Emplâtre Duret	61, rue de Vaugirard, Paris.
Emulsion Bonnefond	MONTAGU, 49, boul. Port-Royal, Paris.
Emulsion Defresne	Les Lilas (Seine).
*Emulsion Marchais	à la Rochelle (Char.-Infér.).
*Eodecrisines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
*Epergétènes végétaux Byla	26, avenue de l'Observatoire, Paris.
*Epésol Clin	20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Engelurel	ALEXANDRE, 22, rue de Vienne, Paris.
*Eniede Lefebvre	2, rue Duphot, Paris.

Entéroseptyl Clérambourg	BRUNERYE, 4, rue Tarbé, Paris.
Entérovaecin Lumière	9, cours Liberté, Lyon.
Entérozone	Lab. Peroxydines, 135, rue de Rome, Paris.
Entérozyme Chevretin & Lemalle	5, rue Ballu, Paris.
Eranol	45, rue de l'Ecliquier, Paris.
Ergot de seigle Dausse	4, rue Aubriot, Paris.
Ergotine Bonjean	LABELONYE, 99, r. d'Aboukir, Paris.
Ergotine Yvon	5, rue Lafeuillade, Paris.
Ergotinine Tanret	10, rue du Commandant-Rivière, Paris.
Erséol Prunier	6, rue de la Tacherie, Paris.
Eseuléol	FOURIS, 9, faub. Poissonnière, Paris.
Ether anesthésique	USINÉS DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Ether amyl valérianique	G. BRUEL, 36, rue de Paris, à Colombes (Seine).
Eugéline Prunier	6, rue de la Tacherie, Paris.
Eukérol Clément	7, passage Thionville, Paris.
Eukinase Carriou	54, faub. St-Honoré, Paris.
Eulaetine Millet	8, rue Richer, Paris.
Eumietine Leprince	62, rue de la Tour, Paris.
Eupeptique Monaven	VACHERON, 26, av. Vallioud à Ste-Foy, près Lyon.
Euphorine du Dr Chaboud	DUSSUEL & FAURE, 26, rue Petits-Champs, Paris.
Eupoine Vernade	DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, Paris.
Evonymine Thibaut	76, rue Petits-Champs, Paris.
Exalgine Defresne	Les Lilas (Seine).
Exol Coquet	43, rue de Saintonge, Paris.
Extrait de Malt Français Déjardin	109, boulevard Haussmann, Paris.
Extrait de Malt Français Déjardin glycérophosphaté	109, boulevard Haussmann, Paris.
Extraits Meneour	49, avenue Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.

## F

Farine lactée Nestlé	16, rue du Parc-Royal, Paris.
Farine lactée Salvy	6, rue Daubigny, Paris.
Farines Jammot	47, rue Mironmesnil, Paris.
Favolysine Thévenot	21, rue des Roses, Dijon.
Fer Bravais	Comte de GRAUWE, 16, rue de Rocroy, Paris.

- Fer injectable Roussel MOUSNIER, à Secaux.  
 Fer Lareade 151, rue Lafayette, Paris.  
 Fermentérel Milan CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, Paris.  
 Ferments organiques COIRRE, 79, rue Cherche-Midi, Paris.  
 Zévor  
 Ferosthyl PARIS, 4, rue de Lamotte-Piequet, Paris.  
 Ferroxal Buisson 157, rue de Sèvres, Paris.  
 Fer Quévenne GÉNEVOIX, 14, rue des Beaux-Arts, Paris.  
 Fer Rabuteau COMAR & C<sup>e</sup>, 29, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.  
 Ferrocodile Leprince 62, rue de la Tour, Paris.  
 Ferrophytine Ciba O. ROLLAND, 1, pl. Morand, Lyon.  
 Ferrygène Carrau Labor, TISSOT, 34, boul. de Clichy, Paris.  
 Fer vital de Jacquemaire à Villefranche (Rhône).  
 Figadol Vivien 6, rue d'Abbeville, Paris.  
 Fixase PARET, à Marseille.  
 Fixine Grémy LONGUET, 50, rue des Lombards, Paris.  
 Fluène LANDRIN, 29, rue La-Rochefoucauld, Paris.  
 Fluid Listérol 61, rue St-Didier, Paris.  
 Fluocodyle Labor. LAFARGE, 5, rue de Babylone, Paris.  
 Fluorformel Gwin 60, rue Saussure, Paris.  
 Fole-Endocrisines 26, boul. de l'Hôpital, Paris.  
 Feurnier  
 Formaçol Bouly 3<sup>me</sup>, rue de Dunkerque, Paris.  
 Fortossan Ciba O. ROLLAND, 1 pl. Morand, Lyon.  
 Fosfexyl Carron Laborat. CARRON, 40, rue Milton, Paris.  
 Festrychnol Chantreau 8, rue de Constantinople, Paris.  
 Franquilese Flach 6, r. de la Cossonnerie, Paris.  
 Frêne Gmet 27, faub. Montmartre, Paris.  
 Fructaline Logeais 61, rue Saint-Didier, Paris.  
 Fucoglycine Le Perdriel 11, rue Milton, Paris.  
 Fucosine Prothière 55, rue Auguste-Comte, Lyon.  
 Fucus Gmet 27, faub. Montmartre, Paris.  
 Fumigator Gwin 60, rue Saussure, Paris.

## G

- Gadiodine Labesse 36, rue des Lices, Angers.  
 Gaiaacalcine Latour 17, place des Vosges, Paris.

Gélaeol phosphaté	165, r. St-Denis, Courbevoie.
Gélauberée	
Gélaephosphat Clin	20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Géarsine Dueatte	8, pl. de la Madeleine, Paris.
Géarsol Bouty	3 <sup>re</sup> , rue de Dunkerque, Paris.
Géactogènes Jolivet	140, faub. St-Honoré, Paris.
Géyl Naline	à Villeneuve - la - Garenne
Géardnal	Etab. POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris
Gastérine Frémont	à Viehy (Allier).
Gastroeol	A. BENDERITTER, à Vendôme (L.-&Ch.).
Gastropeptyl	71, rue Saint-Jacques, Paris
Gastro-Sadine	25, rue Vaneau, Paris.
Gastrozymase Bouty	3 <sup>re</sup> , rue de Dunkerque, Paris.
Gaurel	PÉPIN & LEBOUCCQ, 30, rue Armand-Sylvestre, Courbevoie.
Gayacolehine	A.-J. CHAUCHY, 40, rue de la Bienfaisance, Paris.
Gélee antidiarrhéique Lumière	SESTIER, 9, cours de la Liberté, Lyon.
Géleharine	POULENC Fr. 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Gélotanin	Lab. CHOAY, 44, avenue du Maine, Paris.
Gemme Lagasse	JANSON, Bar-sur-Aube.
Génét Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Géedyl	J. ROBERT, 39, rue de Bourgogne, Paris.
Germese	Laborat. MOREAU, 7, rue d'Hauteville, Paris.
Gernyl	DELABORDE, pharmacien, rue de la Liberté, Dijon.
Globules Hébert	à Saint-Lô (Manche).
Globules Fumouze	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Globules Lainer	LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel III, Paris.
Globules Linarix	CLIN, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Globules Roman	Labor. MONAL & C <sup>ie</sup> , 6, rue Daubigny, Paris.
Globules téniafuges	17, rue Cadet, Paris.
Secréta	
Glute-bulles Jougl	34, boulev. de Clichy, Paris.
Glycère Dalloz	13, boul. de la Chapelle, Paris.
Glycérométhylarsénié	BLOTTIÈRE, 6, rue Dombasle, Paris.
Glycérephosphates effervescents	LE PERDRIEL, 11, rue Milton, Paris.

Glycérophosphates Freyssinge	FREYSSINGE, 6, rue Abel, Paris.
Glycérophosphates Jacquemaire	à Villefranche (Rhône).
Glycérophosphate Robin	13, rue de Poissy, Paris.
Glycogène Clin	20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Glyco-lactimase Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.
Glycomorrhuum Faudon	MAYNIEL, 85, rue Turbigo, Paris.
Glyco-phénique Dr Déclat	G. PRUNIER & C <sup>ie</sup> , 6, rue de la Tacherie, Paris.
Glycophosphates granulés Astier	Labor. ASTIER, 45, rue du Docteur Blanche, Paris.
Glykolaine Robin	13, rue de Poissy, Paris.
Glyphosphates G. Chanteaud	108, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Glyphospher	GIVAUDAN-LAVIROTTE, 8, quai des Étroits, Lyon.
Gmet (Extraits)	27, faub. Montmartre, Paris.
Gobérol	CHARMAISON, 35, aven. de Royat, Clermont-Ferrand.
Goléane Maignen	MILLET, 8, r. Richer, Paris.
Goménol Prévot	17, rue Ambroise-Thomas, Paris.
Gonaérine	Etablis. POULENC Fr, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
Goudron Freyssinge	6, rue Abel, Paris.
Goudron E. Guyot	19, rue Jacob, Paris.
Gouttes Gigon	7, rue Coq-Héron, Paris.
Gouttes amères Hébert	14, rue Thiers, Saint-Lô (Manche).
Gouttes livoniennes	TROUETTE-PERRET, 15, r. Immeubles-Industriels, Paris.
Gouttes de Lolotzé Isberg	BERGER, 90, avenue du Bac, La Varenne-Saint-Hilaire.
Gouttes Nicot	CANTIN, à Palaiseau (S.-O.).
Gouttes Pausodun	147, boulev. Montparnasse, Paris.
Gouttes Paidophiles du Dr Guiraud	Henry ROGIER, 19, avenue de Villiers, Paris.
Gouttes de Séru	M. LETTRY, 42, avenue de Breteuil, Paris.
Grains Clérambourg	4, rue Tarbé, Paris.
Grains Entéritine	BEUGONIN, à Auxerre.
Grains de Plombières	Henry ROGIER, 19, avenue de Villiers, Paris.
Grains de santé Dr Frank	T. LEROY, 96, rue d'Amsterdam, Paris.

* Grains de Vals	NOGUÉS, 64, boulev. Port-Royal, Paris.
* Grains de vie Clérambourg	4, rue Tarbé, Paris.
Granulé Bravaix	3, rue Mogador, Paris.
Granulé calmar-frenkel	CHEVRETIN & LEMATTE, 24, rue Caumartin, Paris.
* Granules Cresnier	NITOT, 6, rue Chanoinesse, Paris.
Granulé du Dr Mousaud	H. RIVIER, 26, rue Saint-Claude, Paris.
* Granulé Girard	48, rue d'Alésia, Paris.
Granules du Dr Papillaud	GIGON, 7, rue Coq-Héron, Paris.
Granules Homelle & Quévenne	14, rue des Beaux-Arts, Paris.
Granules Houdé	9, rue Dieu, Paris.
Granules des Vesges	21, boul. Haussmann, Paris.
Granules trois cachets	COIRRE, 79, rue du Cherche-Midi, Paris.
* Gui Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
* Gulpsine Leprince	62, rue de la Tour, Paris.

## H

* Hamaméline Royà	41, rue de Rome, Paris.
Hamaméliode	Lab. OBERLIN, 17, rue Cadet, Paris.
Hamamélis Dausse	4, rue Aubriot, Paris.
* Hamamélis Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Hamamélis Natten	34, boul. Clichy, Paris.
Hamamélis Virginia	61, rue Saint-Didier, Paris.
Hectarpyre Naline	à Villeneuve-la-Garenne (Seine).
Hectine Naline	Id.
Hélenine du Dr Kerab	CHAPES, 12, rue d'Isly, Paris.
Héماغène Tailleur	à Fontainebleau.
* Héماغénine du Dr Giraud	AUCLAIR, à Aigurande (Indre).
Hémarsyl du Dr Roux	CAILLAU, à Argentat (Corrèze).
Hémat - Sérum Cerbière	27, rue Desrénaudes, Paris.
Hémocléline Lafay	54, Chaussée d'Antin, Paris.
Hémoglobine Bevel	Lab. VENOT, 101, av. Mozart, Paris.
Hémoglobine Crinon	45, rue de Turenne, Paris.
Hémoglobine Dalloz	13, boul. de la Chapelle, Paris.
* Hémoglobine Deschiens	9, rue Paul-Baudry, Paris.
Hémoglobine Star	3, rue du Trésor, Paris.

Hémeneurel Coquet	43, rue de Saintonge, Paris.
Hémeplase Lumière	9, cours Liberté, Lyon.
Hémestyl du Dr Roussel	21, rue d'Aumale, Paris.
Hémoténine	Etabl. Albert BUISSON, 157, de Sèvres, Paris.
Hémozol	BEYTOUT & CISTERNE, 12, boul. Saint-Martin, Paris.
Hépatine Bouty	3 <sup>es</sup> , rue de Dunkerque, Paris.
Hépato-Byl	DANIEL-BRUNET, 6, rue de la Source, Paris.
Hermophényl	9, cours Liberté, Lyon.
Hércline Vicario	11, boul. Haussmann, Paris.
Hétérelysine	Laborat. OLIVIERO, 87, rue Denfert-Rochereau, Paris.
Heudebert (Produits)	85, rue St-Germain à Nanterre.
Hexotal	A. LÉGER, 10, rue Saint- Antoine, Paris.
Hippesarcine Roy	8, quai des Étroits, Lyon.
Histogénol Naline	à Villeneuve-la-Garenne.
Holos Deschiens	9, rue Paul-Baudry, Paris.
Hopoçan	12, rue Lamartine, Paris.
Hormolaxine	RENARD, 8, rue de Passy, Paris.
Hordénine Lauth	9, rue du 4-Septembre, Paris.
Hordéomaltine	10, rue Richelieu, Paris.
Huillaxine Gillet	59, rue de Châteaudun, Paris.
Huile F. M. Hocq	2, rue Castiglione, Paris.
Huile F. M. Peerless	30, boul. Strasbourg, Paris.
Huile grise Duret	10, rue du Bac, Paris.
Huile grise stérilisée	VIGIER, 12, boulev. Bonne- Nouvelle, Paris.
Huile de ricin Crolas	8, quai des Étroits, Lyon.
Hydrastis Dausse	4, rue Aubriot, Paris.
Hydrastis Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Hypnase Vergetot	163, rue de Flandre, Paris.
Hypneural Cos	LABELONYE, 99, rue d'Aboukir, Paris.
Hypoehlorine	22, rue Troussseau, Paris.
Hypodermie "Le Pecq"	39, rue Cambon, Paris.
Hypodermezone	Laborat. PEROXYDINES, 137, rue de Rome, Paris.
Hypophosphites Churchill	SWANN, 12, rue Castiglione, Paris.
Hypophosphites Fellows	5, rue de la Paix, Paris.
Hypophyse-Endocris- sipes Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.



## I

- Ibogaïne Nyrdhal
- Immunizels Grémy
- Injection Brou
- Injection Clin Strychno-Phospharsinée
- Injections Hg. Rogé
- Cavaillès
- Innetyol
- Internoses
- "Le Pecq"
- Intraits Dausse
- Iodalbin Adrian
- Iodalia
- Iodalese Galbrun
- Iodargel Viel
- Iodaseptine Cortial
- Iodéine Montagu
- Iodéol Viel
- Iodéyl Fournier
- Iodoécérol Dalloz
- Iodoéol Carrien
- Iodoégérol Pépin
- Iodemaisine Salle
- Iodemétine Hautdier
- Iodone Robin
- Iodostarine Roche
- Iodo-Thyreïdine
- Catillen
- Iodo-Trypsine
- Iodural Novat
- Iodurase
- Iodure de Potassium
- Clin
- Iodures Crés
- Iodures Foucher
- Iodures Laroze
- Iodures Souffren
- Ioglysol
- Iolase Corbière
- LANDRIN, 20, rue La-Rochefoucauld, Paris.
- 14, rue de Clichy, Paris.
- BLOTTIÈRE, 6, rue Dombasle, Paris.
- 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
- PÉPIN, 9, rue du 4-Septembre, Paris.
- 35, rue des Petits-Champs, Paris.
- 39, rue Cambon, Paris.
- 4, rue Aubriot, Paris.
- 9, rue de la Perle, Paris.
- BONETTI, 12, r. Vavin, Paris.
- 8, rue du Petit-Musc, Paris.
- 7, rue St-Yves, Rennes.
- 125, rue de Turenne, Paris.
- 49, boul. Port-Royal, Paris.
- 7, rue St-Yves, Rennes.
- 26, boul. de l'Hôpital, Paris.
- 13, b<sup>e</sup> de la Chapelle, Paris.
- 54, faub. Saint-Honoré, Paris.
- à Courbevoie (Seine).
- 4, rue Elzévir, Paris.
- 37, rue Galilée, Paris.
- 13, rue de Poissy, Paris.
- F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>e</sup>, 21, place des Voges, Paris.
- 3, boul. St-Martin, Paris.
- 50, rue Rennequin, Paris.
- à Mâcon (Saône-et-Loire).
- COUTURIEUX, 18, avenue Hoche, Paris.
- 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
- 10, rue du Bac, Paris.
- 142, boul. St-Germain, Paris.
- ROHAIS & C<sup>e</sup>, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.
- Etabl. BUISSON, 157, rue de Sèvres, Paris.
- COMAR & C<sup>e</sup>, 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
- 27, rue Desrenaudes, Paris.

- Iénoïdes** (Précédés Fouard)  
**Ipéca total** Dausse  
**Irol** Churchill  
**DARRASSE**, 13, rue Pavée Paris.  
 4, rue Aubriot, Paris.  
**SWANN**, 12, rue Castiglione. Paris.

## J

- Jécol**  
**Jugland Gmet**  
**Juglandine** Ferrouillat  
**Juglanrégine** André  
**Juvénor**  
 36, rue Rivay, Levallois-Perret (Seine).  
 27, faub. Montmartre, Paris.  
 35, rue de Rivoli, Paris.  
 2, rue des Alpes, à Valence.  
 6, rue du Mont-Thabor, Paris.

## K

- Kalmine Métadier**  
**Kéfir** Carrien  
**Kélène**  
**Képhaldol**  
**Képhir** Sallières  
**Képhir** Salmon  
**Kerlel** Lerch  
**Kimosine** Rogier  
**Kinzurine** Menceur  
**Kipsol**  
**Kluehol**  
**Kela-fer-Trouette**  
**Kela granulée** Astier  
**Kela granulée** Roy  
**Kela** Gmet  
**Kela** Midy  
**Kela** Menaven  
**Kela** Pausodun  
**Kela** Piehat  
**Kréazone**  
**Kréoïes** Novat  
 à Tours.  
**V. BORRIEN & C<sup>e</sup>**, 54, faub. Saint-Honoré, Paris.  
**USINES DU RHONE**, 21, rue Jean-Goujon, Paris.  
**RATIÉ**, 45, rue de l'Ecliquier, Paris.  
 à Pontoise.  
 28, rue de Trévise, Paris.  
 à Saint-Etienne.  
 19, avenue de Villiers, Paris.  
 49, avenue Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.  
**BERTAUT-BLANCARD**, 64, r. La Rochefoucauld, Paris.  
 38, Grand'Rue, Boulogne-sur-Seine.  
 15, r. Immeubles-Industriels, Paris.  
 45, rue du Dr Blanche, Paris.  
 81, boul. Suchet, Paris.  
 27, faub. Montmartre, Paris.  
 9, rue Commandant-Rivière, Paris.  
**VACHERON**, 4, av. Vallioud, à Sainte-Foy, près Lyon.  
**FOURNIER**, 147, boulevard Montparnasse, Paris.  
 5, cours Charlemagne, Lyon.  
**TROUETTE**, 15, rue des Immeubles-Industriels, Paris.  
 à Mâcon (Saône-et-Loire).

## L

- \* Lab-Laeto-Ferment MIALHE, 8, r. Favart, Paris.
- \* Laccodermes Brisson 111, rue du Mont-Cenis, Paris.
- Laetafel Pearson 43, rue Pinel, Saint-Denis.
- Laétéol Boucard 30, rue Singer, Paris.
- \* Lactimase Coutu- 18, avenue Hoche, Paris.
- rienx
- Lactérine Salières à Pontoise (S.-&-O.).
- \* Lactobacilline 13, rue Pavée, Paris.
- Lactobyl 21, rueThéodore-de-Banville,
- Paris.
- Laetochel Id.
- \* Lactolaxine Fydau PARIS, 4, r. Lamotte-Piquet,
- Paris.
- Laetephesphine 8, rue de la Pompe, Paris.
- Lactospore Tulivet 12, place de la République,
- Bois-Colombes.
- \* Laetozymase B. Labor. CHEVRETIN & LE-
- MATTE, 5, rue Ballu, Paris.
- \* Lantel Couturieux 18, avenue Hoche, Paris.
- \* Laxagarine DURET & R. MY, 5, avenue
- des Tillouls, Paris.
- Laxamer Lefèvre 52, rue Decamps, Paris.
- Laxatif Châtel- PERRAUDIN, 70, rue
- Guyon Gubler Legendre, Paris.
- Laxatif ferment à Malzéville (M.-&-M.).
- Laxatif Gebey BEYTOUT & CISTERNE, 12,
- boul, Saint-Martin, Paris.
- Laxatif Miraton à Châtel-Guyon (P.-de-D.)
- \* Laxatif Orgeat 35, rue Rivay, Levallois-
- Perret.
- Laxatone Déjardin 100, boul. Haussmann, Paris.
- Laxarine Terrial 39, boul. Haussmann, Paris.
- Laxogélase Tulivet 12, place de la République,
- Bois-Colombes.
- Laxol Fraudin 4, av. Desfoux, Boulogne-s-S.
- Laxo-lin 182, av. de Versailles, Paris.
- \* Laxopeptine Girard 48, rue d'Alésia, Paris.
- Laxophore Brachin à Joinville. (Hte-Marne).
- \* Lebnol Labor. THIÉVENOT, à Dijon.
- \* Lécithine Adrian 9, rue de la Perle, Paris.
- \* Lécithine Clin 20, rue des Fossés-St-Jacques,
- Paris.
- Lécithine Vial 8, rue Vivienne, Paris.
- \* Lécithosine Robin 13, rue de Poissy, Paris.
- Leniforme 20, r. Larochehouard, Paris.
- Leptandrine Royer LAUMONIER, 225, rue Saint-
- Martin, Paris.
- \* Levurase CHARMAISON, à Clermont-
- Ferrand.
- Levure Coirre 79, r. du Cherche-Midi, Paris.

Levure Maltine Déjardin	109, boul. Haussmann, Paris.
Levurine extractive Centurieux	18, avenue Hoche, Paris.
Limel Churchill	12, rue Castiglione, Paris
Lipodol Lafay	54, Chaussée d'Antin, Paris.
Lipochol Byla	26, avenue de l'Observatoire, Paris.
Lipoféine	O. ROLLAND, 1 pl. Morand, Lyon.
Lipogyre Ciba	Id.
Lipoïdes H. I.	H. CARRION, 54, faub. Saint- Honoré, Paris.
Lipofédine Ciba	O. ROLLAND, pharmacien, 1, place Morand, Lyon.
Liqueur d'Hermès	BEYTOUT & CISTERNE, 12, boul. Saint-Martin, Paris.
Liqueur Laprade	COLLIN & C <sup>e</sup> , 49, rue de Maubeuge, Paris.
Liqueur Laville	COMAR, 20, rue des Fossés- Saint-Jacques, Paris.
Liqueur peptophos- phorique	ADRIAN, 9, rue de la Perle, Paris.
Liquides organiques	BOUTY, 3 <sup>me</sup> , rue Dunkerque- Paris.
Listose Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Litharsyne Ferré	142, boul. St-Germain, Paris.
Lithine efferves- cente	LE PERDRIEL, 11, r. Milton, Paris.
Luargel	POULENC Fr., 92, rue Vieille- du-Temple, Paris.
Luatine	M. SAVE, 2, av. Parmentier, Paris.
Lusiforme	CARTERET, 15, rue d'Argen- teuil, Paris.
Lutéovar	FOULON & C <sup>e</sup> , 183, faub. St-Martin, Paris.
Lycétol Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Lymphase du Dr Leriche	164, rue St-Honoré, Paris.
Lysiede Clérambourg	4, rue Tarbé, Paris.
Lysel	31, rue Parmentier, Ivry (Seine).

## M

Magnésie Durel	7, boulevard Denain, Paris.
Magnésie Roy	81, boulevard Suchet, Paris.
Magol Churchill	SWANN, 12, rue Castiglione, Paris.
Mallase Fanta	6, rue Guyot, Paris.

Malt Barley	6, rue Guyot, Paris.
Malt Déjardin	109, boul. Haussmann, Paris.
Maltéa Moser	12, rue de Bruxelles, Lyon.
Maltésine Tisset	34, boulevard Clichy, Paris.
Maltine Gerbay	à Roanne (Loire).
Malt Moritz	189, rue de Vaugirard, Paris.
Malt Régina	34, rue Pajol, Paris.
Malt Strauss	DEMORY, 12, r. Broca, Paris.
Maltéine Defresne	MACQUAIRE, Les Lilas (Seine).
Malto-Fer Déjardin	109, boul. Haussmann, Paris.
Mamelle-Endocrinses Fournier	26, boulevard de l'Hôpital, Paris.
Mangaine	SCHMIT, 71, rue Ste-Aune, Paris.
Manganésia	64, rue des Tournelles, Paris.
Marinol (Laborat. du)	à Dieppe (Seine-Inférieure).
Marron d'Inde Dausse	4, rue Aubriot, Paris.
Marsyle Clin	20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Mas de la Ville	à Arles-sur-Rhône.
Maya Bulgare	322, rue Saint-Honoré, Paris.
Médication arrhé- nique simple et composée	CLIN, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Médulline Bouty	3 <sup>me</sup> rue de Dunkerque, Paris.
Mentholina	GUIGNIER, à Bois-Colombes.
Mercuriaux Vigier	12, boulev. Bonne-Nouvelle, Paris.
Mésotherium Buisson	157, rue de Sèvres, Paris.
Méroléol Salle	4, rue Elzévir, Paris.
Métharfer Bouty	3 <sup>me</sup> , rue de Dunkerque, Paris.
Métharsénobenzol	USINES CHIMIQUES DU PECQ, 39, r. Cambon, Paris.
Métharsinate Clin	20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Métharsol Bouty	3 <sup>me</sup> , rue de Dunkerque, Paris.
Méthylarsinate Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Méthylarsinate Vigier	12, boulev. Bonne-Nouvelle, Paris.
Méthylese	14, rue de la Paix, Nice.
Métricine	25, Grande-Rue, à Asnières (Seine).
Metritols	LÉES, 124, rue du Bac, Paris.
Mictasol	Labor. DIEULAFÉ, 16, aven. Trudaine, Paris.
Minéralogène	VIAL, 4, place Croix-Rouge, Lyon.
Minérol	10, rue Richelieu, Paris.

Minérolaxine	6, rue Delaborde, Paris.
Le Tanneur	
Mohavène	Comte de GRAUWE, 16, rue de Rocroy, Paris.
Meride (Produits)	20, rue de La Rochefoucauld, Paris.
Merrhuétine Jungben	DUHÈME, à Courbevoie.
Merrhuine Puy	à Grenoble.
Merrhuol Chapoteaud	VIAL, 8, rue Vivienne, Paris.
Meuches Fumeuze	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Mucogène Astier	45, rue du D <sup>r</sup> Blanche, Paris.
Muqueuse Endocri- sines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Musculosine Byla	26, avenue de l'Observatoire, Paris.
Mycedermine	10 <sup>r</sup> , boul. Haussmann, Paris.
Déjardin	
Mycolysine, Deyen	LEBEAULT, 5, rue Bourg- l'Abbé, Paris.
Myoséine	CARTERET, 15, rue d'Argen- teuil, Paris.

## N

Narcotile Bengué	47, rue Blanche, Paris.
Narcyl Grémy	LONGUET, 50, rue des Lom- bards, Paris.
Narsénel	POULENC Fr., 92, r. Vieille- du-Temple, Paris.
Nazochlorine Cham- penois	29, avenue Friedland, Paris.
Néo-Arsycedile	M. LEPRINCE, 62, rue de la Tour, Paris.
Néofilhos Le Perdriel	11, rue Milton, Paris.
Néo-Kola Lumière	9, cours Liberté, Lyon.
Néol Bettu	9, rue Dupuytren, Paris.
Néo-laxatif Chapotel	56, boulevard Ornano, Paris.
Néolides H. B.	9, rue Dupuytren, Paris.
Néoquinine Falières	COMAR & C <sup>r</sup> , 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Néo-Rhemmol	LEPRINCE, 62, rue de la Tour, Paris.
Néphrine Bouty	3 <sup>me</sup> , rue de Dunkerque, Paris.
Néphrine Byla	26, avenue de l'Observatoire, Paris.
Nervecitrine Tiaset	34, boulev. de Clichy, Paris.
Neuregalacel Dethan	11, r. Alphonse-de-Neuville, Paris.
Neurène	DANIEL-BRUNET, 6, rue de la Source, Paris.
Neurinase	GENEVRIER, 2, rue du Débarcadère, Paris.

Neuroiodure Dethan	11, r. Alphonse-de-Neuville, Paris.
Neurosine Prunier	6 rue de la Taôcherie, Paris.
Neurosthyl	PARIS, 4, r. Lamotte-Piquet, Paris.
Neuretrophel Byla	26, avenue de l'Observatoire, Paris.
Névralgésine Débordés	à Moulins (Allier).
Névralgél Bressard	1, rue de la Cordouan, La Rochelle.
Névraltéine Rogier	19, avenue de Villiers, Paris.
Névresthénine Freysingé	6, rue Abel, Paris.
Nisaméline	TROUETTE, 15, r. Immeubles-Industriels, Paris.
Nitrite de soude Roussel	10, rue Washington, Paris.
Noprine Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Nesol Ağuettant	36, quai Fulchiron, Lyon.
Nevargyre Guillaumin	13, rue du Cherche-Midi, Paris.
Nevarine Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Novarsénobenzol Billon	POULENC Fr., 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
Nucléarène Coğnet	43, rue de Saintonge, Paris.
Nucléarsitel Robin	13, rue de Poissy, Paris.
Nucléatol Robin	Id.
Nucléo-fer Girard	48, rue d'Alésia, Paris.
Nutritine Déjardin	109, boul. Haussmann, Paris.
Nyetal	DURET & REMY, 5, avenue des Tilleuls, Paris.
Nyrdhal (Produits)	20, rue La Rochefoucauld, Paris.



Océanine Chevreton et Lematté	5, rue Ballu, Paris.
Ocréine Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Oénase Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.
Oénophos	GUICHARD, 2, r. de l'Hôpital-Saint-Louis, Paris.
Olarsol Dumouthiers	11, rue de Bourgogne, Paris.
Oléo-Iode Dubois	7, rue Jadin, Paris.
Oléolaxine	DURET & RÉMY, 5, avenue des Tilleuls, Paris.
Opocaleium	121, av. Gambetta, Paris.
Opelaxyl Corbière	27, rue Desrenaudes, Paris.
Ophthalmine Leprince	62, rue de la Tour, Paris.
Opothérapie Benty	3 <sup>me</sup> , rue de Dunkerque, Paris.

Opothérapie Byla	26, avenue de l'Observatoire, Paris.
Opothérapie Carrion	54, faub. Saint-Honoré, Paris.
Opothérapie Choay	44, avenue du Maine, Paris.
Opothérapie Chaix	10, rue de l'Orne, Paris.
Opothérapie Chevretin et Lematte	5, rue Ballu, Paris.
Opothérapie Fournier	26, boulevard de l'Hôpital, Paris.
Opothérapie Fumouze	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Opothérapie Monceur	49, aven. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
Opothérapie "Le Pecq"	39, rue Cambon, Paris.
Opothérapie Vigier	12, boulev. Bonne-Nouvelle, Paris.
Opezones Lumière	9, cours Liberté, à Lyon.
Opsine Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Orchitase Pâris	4, r. Lamotte-Piequet, Paris.
Orchitine Byla	26, avenue de l'Observatoire, Paris.
Ostéo-hépatine	DANIEL-BRUNET, 6, rue de la Source, Paris.
Ostréine Buisson	157, rue de Sèvres, Paris.
Ouabaïne Arnaud	49, boul. Port-Royal, Paris.
Quataplasme Langlebert	SABATIER, 10, rue Pierre-Ducieux, Paris.
Ovaire-Endocrisines Fournier	26, boulevard de l'Hôpital, Paris.
Ovigéine Bouty	3 <sup>me</sup> , rue de Dunkerque, Paris.
Ovo-lécithine Billon	POULENC Frères, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Ovothyrol	DANIEL-BRUNET, 6, rue de la Source, Paris.
Ovules Chaumel	78, faub. St-Denis, Paris.
Ovules Derma	ROBIN, 13, r. de Poissy, Paris.
Ovules Roche	F. HOFFMANN-LA ROCHE, & C <sup>ie</sup> , 21, place des Vosges, Paris.
Oxycyanure d'hydrargyre	GUILLAUMIN, 168, boulevard Saint-Germain, Paris.
Oxydethyryne Pâris	4, r. Lamotte-Piequet, Paris.
Oxydevarine Pâris	Id.
Oxygénés du Dr Prim	27, rue Fourcroy, Paris.
Oxygène-Bère Obs	A. OBOUSSIER, 10, r. Victor-Hugo, Neuville-sur-Saône.
Oxygènezone	11, rue Saint-Sabin, Paris.
Oxymenthol Perraudin	Laborat. SCIENTIA, 7, rue Fromentin, Paris.
Ozel	à Avignon.



## P

- Paludase Corbière** 27, rue Desrenaudes, Paris.  
**Panbiline** à Annonay (Ardèche).  
**Pancalcine** L. PAPET, 15, r. d'Etampes,  
 Dourdan (S.-&-O.).  
**Pancréas-Endocri-** 26, boul. de l'Hôpital, Paris.  
**sines Fournier**  
**Pancréatine** MACQUAIRE, Les Lilas  
 Defresne (Seine).  
**Pandigitale Heudas** H. RIVIER, 26, r. St-Claude,  
 Paris.  
**Pangadaine** SOUILLARD & C<sup>e</sup>, 41, rue  
 Francs-Bourgeois, Paris.  
**Panglandine Centu-** 18, avenue Hoche, Paris.  
**rieux**  
**Panhémol** BOUYSSOU, 90, avenue des  
 Ternes, Paris.  
**Panlacte-Midy** Labor. Midy, 9, rue du Com-  
 mandant-Rivière, Paris.  
**Pantopen Roche** F. HOFFMANN-LA ROCHE  
 & C<sup>e</sup>, 21, place des Vosges,  
 Paris.  
**Pannrel Tissot** 34, boul. de Clichy, Paris.  
**Papaine Trouette** 15, rue Immeubles-Indus-  
 triels, Paris.  
**Papier Albespeyres** FUMOUE, 78, faub. Saint-  
 Denis, Paris.  
**Papier du Dr Balme** ROGIER, 19, avenue de  
 Villiers, Paris.  
**Papier Barral** 78, faub. Saint-Denis, Paris.  
**Papier Vriènard** DUMONT, à Montereau.  
**Paraffinéol Hamel** HAMEL, pharm., Le Mans.  
**Paralactine Byla** 26, avenue de l'Observatoire,  
 Paris.  
**Parathyroïde-Endo-** 26, boulevard de l'Hôpital,  
 erisines Fournier Paris.  
**Paratoxine Lemoine** 8, pl. de la Madeleine, Paris.  
**Paroxyl** THIRIET & C<sup>e</sup>, 26-28, rue  
 des Ponts, Naney.  
**Pastilles Brunelet** 22, rue Turbigo, Paris.  
**Pastilles de Cocaïne** 9, rue Commandant-Rivière,  
 Midy Paris.  
**Pastilles Dethan** 11, rue Alph. de Neuville,  
 Paris.  
**Pastilles Géraudel** GÉRAUDEL, 36, rue Rivay,  
 Levallois-Perret.  
**Pastilles Houdé** 9, rue Dieu, Paris.  
**Pastilles de Macken-** CHAUCHY, 40, rue de la  
 sie Bienfaisance, Paris.

- **Pastilles Méry**
- Pastilles Miraton**
- Pastilles sulfocaine**  
**du Dr Fayès**
- Pastilles Vichy-Etat**
- Pastilles Végnet**
- Pâte d'acénit Bon-  
jean**
- Pâte Aubergier**
- Pâte de Lamoureux**
- Pâte Rami**
- Pavéron Dausse**
- Peetopunch Mous-  
nier**
- Pelliscél**
- **Pélespanines**
- Penghawar Vicario**
- **Pepto-fer du Dr Jail-  
lét**
- **Peptokela Robin**
- **Peptenate de fer  
Robin**
- Peptone Catillon**
- Peptone Chapoteaud**
- Peptone Defresne**
- Peptovalériane  
Gigon**
- Péricols Legros**
- **Péristaltine Ciba**
- **Perles Taphosote**
- **Peroxydines**
- Persodine Lamière**
- Pertussin Salle**
- Pétroléine Laneelet**
- Phageeytine Bureau**
- Phenenealyptol**
- Phénol Bobœuf**
- Phénosalyl Tereinet**
- Comte de GRAUWE**, 16, rue  
de Roeroy, Paris.
- à Châtel-Guyon (P.-de-D.)**
- FOUQUET & C<sup>ie</sup>**, 3, rue du  
4-Septembre, Paris.
- 24, boul. des Capucines, Paris.**
- DEFRANCE**, 5, rue Eugène-  
Delaeroix, Paris.
- DUSSUEL & FAURE**, 26, rue  
des Petits-Champs, Paris.
- COMAR**, 20, rue Fossés-Saint-  
Jacques, Paris.
- GIRARD & C<sup>ie</sup>**, 73, rue Sainte-  
Anne, Paris.
- FOUGERAT**, 44, rue Chaptal,  
Levallois-Perret.
- 4, rue Aubriot, Paris.**
- à Secaux (Seine).**
- LANDRIN**, 20, rue La Roche-  
foucauld, Paris.
- FOURNIER Frères**, 26, boul.  
de l'Hôpital, Paris.
- 17, boul. Haussmann, Paris.**
- DARRASSE Frères**, 13, rue  
Pavée, Paris.
- 13, rue de Poissy, Paris.**
- Id.**
- 3, boul. Saint-Martin, Paris.**
- VIAL**, 8, rue Vivienne, Paris.
- MACQUAIRE**, Les Lilas  
(Seine).
- 7, rue Coq-Héron, Paris.**
- DUVERGIER**, 74, r. Raspail,  
Bois-Colombes.
- O. ROLLAND**, 1, pl. Morand,  
Lyon.
- LAMBIOTTE Frères**, 3, rue  
d'Edimbourg, Paris.
- 135, rue de Rome, Paris.**
- 9, cours Liberté, Lyon.**
- 4, rue Elzévir, Paris.**
- 11<sup>bis</sup>, rue du Conservatoire,  
Paris.**
- 26, rue Saint-Claude, Paris.**
- MOUSNIER**, à Secaux.
- ALEXANDRE Fils**, 47, rue  
de Rome, Paris.
- LEMAITRE**, 158, rue Saint-  
Jacques, Paris.

Phlyetol	ROBERT & CARRIERE, 37, rue de Bourgogne, Paris.
*Phosléryl Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
*Phosète Lambiotte Frères	3, rue d'Edimbourg, Paris.
Phospharsyl colloï- dal du Dr Pinard	à Angoulême (Charente).
Phosphate colloïdal du Dr Pinard	Id.
Phosphate de fer Leras	VIAL, 8, rue Vivienne, Paris.
Phosphate Vital de Jaquemaire	à Villefranche (Rhône).
*Phosphatine Falières	6, rue de la Tâcherie, Paris.
Phospho-Fluor	38, rue Poulet, Paris.
*Phosphogène Favri- chon	à Saint-Symphorien-de-Lay (Loire).
Phosphogène Pachaut	130, boul. Haussmann, Paris.
Phosphinal Juin	3, quai aux Fleurs, Paris.
*Phosphotal Clin	20, rue des Fossés-Saint- Jacques Paris.
Phosphoréol Tissot	34, boul. de Clichy, Paris.
Phosphure de zinc Clin	20, rue des Fossés-Saint- Jacques, Paris.
Phostrychnol	CHANTEREAU, 8, rue de Constantinople, Paris.
*Phylactène Byla	26, avenue de l'Observatoire, Paris.
*Physcine Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
*Phytinate de Qui- nine Ciba	O. ROLLAND, 1, pl. Morand, Lyon.
*Phytine Ciba	Id.
Pilules antidia- bétiques Midy	9, rue Commandant-Rivière, Paris.
Pilules antidyspep- tiques Lancetot	H. RIVIER, 26, rue Saint- Claude, Paris.
Pilules Bengué	47, rue Blanche, Paris.
*Pilules Blancard	64, rue La Rochefoucauld, Paris.
Pilules Bland	24, place des Vosges, Paris.
Pilules Besredon	GIGON, 7, r. Coq-Héron, Paris.
Pilules Culpier	30, r. Louis-le-Grand, Paris.
Pilules Crauch	34, boul. de Clichy, Paris.
Pilules du Dr Cronier	75, rue de la Boétie, Paris.
Pilules Cuticura	3, avenue Lowendal, Paris.
Pilules du Dr De- bouzy	LONGUET, 50, rue des Lom- bards, Paris.
*Pilules Gip	64, boul. Port-Royal, Paris.
*Pilules d'Hermal	H. RIVIER, 26-28, rue Saint- Claude, Paris.

Pilules du Docteur Séjournet	LEPRINCE, 62, rue de la Tour, Paris.
Pilules Lartigue	FUMOUCHE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
Pilules de Meussette	COMAR, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Pilules Philippe	MONVENOUX, Lyon.
Pilules de Quassine Frémint	FREYSSINGE, 6, rue Abel, Paris.
Pilules Rébillon	R. CRUET, 13, r. des Minimes, Paris.
Pilules savonneuses Boissy	DELOUCHE, 356, rue Saint-Honoré, Paris.
Pipérazine Midy	9, r. Commandant-Rivière, Paris.
Pipérazel Tissot	34, boul. de Cliehy, Paris.
Piscidia Guet	27, faub. Montmartre, Paris.
Pituaglandol Roche	21, place des Vosges, Paris.
Pituilebine Byla	26, avenue de l'Observatoire, Paris.
Pixel Koebly	7, rue Rodier, Paris.
Placenta Endocrinses Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Plasma de Quinton	54, faub. St-Honoré, Paris.
Pneumase Leriche	164, rue St-Honoré, Paris.
Pneumo-caléine	50, rue Rennequin, Paris.
Podephyllé Coirre	70, r. du Cherche-Midi, Paris.
Poliel Churchill	SWANN, 12, rue Castiglione, Paris.
Polybromure Gennon	14, rue Victor-Hugo, Lyon.
Polyformlate Ceuturiens	18, avenue Hoche, Paris.
Polytaxyle Hamel	18, rue Tanerède à Coutances.
Pommade adrénostyptique Midy	Labor. MIDY, 9, rue Commandant-Rivière, Paris.
Pommade Cuticura	3, avenue Loewendal, Paris.
Pommades Royer	LAUMONIER, 225, rue Saint-Martin, Paris.
Potien Boissel	4, cours Liée, Bordenaux.
Poudre américaine Leroy	MORIDE, 20, rue La-Rochefoucauld, Paris.
Poudre Escoufflaire	à Baisieux (Nord).
Poudre de viande Favret	BLOTTHIÈRE, 6, r. Dombaste, Paris.
Poudre de viande Rousseau	TROUETTE, 15, rue Immeubles-Industriels, Paris.
Poudre de viande Trouette	Id.
Poudre du Dr Cléry	53, boul. St-Martin, Paris.
Poudre Espie	20, rue St-Lazare, Paris.
Poudre Gépia	AMOUROUX, 186, rue du Chemin-Vert, Paris.

<b>Poudre Jifa</b>	FOUGERAT, 44, r. Chaptal, / Levallois-Perret.
<b>Poudre Lartigue</b>	78, faub. St-Denis, Paris.
<b>Poudre Laxative de Vichy (du D<sup>r</sup> Sou- lignoux)</b>	G. PRUNIER & C <sup>ie</sup> , 6, rue de la Tâcherie, Paris.
<b>Poudre Paterson (Dethan)</b>	11, rue Alphonse de Neuville, Paris.
<b>Poudre sulfureuse Simon</b>	MARIANI, 41, boul. Hauss- mann, Paris.
<b>*Preventyl</b>	40, rue d'Enghien, Paris.
<b>*Procuta</b>	Labor. BRISSON & C <sup>ie</sup> , 111, rue du Mont-Cenis, Paris.
<b>*Produits diététiques</b>	FAVRICHON, à St-Sympho- rien-de-Lay (Loire).
<b>*Propiden</b>	Etab. POULENC Fr., 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
<b>Prosthénase Gal- brun</b>	8, rue du Petit-Muse, Paris.
<b>Protéol</b>	5, rue Bourg-l'Abbé, Paris.
<b>Protiodé Grémy</b>	14, rue de Clichy, Paris.
<b>Protyline Roche</b>	F. HOFFMANN-LA ROCHE & C <sup>ie</sup> , 21, pl. des Vosges, Paris. à Villefranche (Rhône).
<b>Prunelline Best</b>	14, rue de Clichy, Paris.
<b>*Psinase Grémy</b>	26, av. de l'Observatoire, Paris.
<b>Pulmine Byla</b>	3 <sup>ue</sup> , rue de Dunkerque, Paris.
<b>Pulmonine Bouty</b>	15, rue de Rome, Paris.
<b>Pulmosérum Bailly</b>	5, rue des Remises, St-Maur, (Seine).
<b>*Purganol Daquin</b>	7, rue Rodier, Paris.
<b>Purgyl Kochly</b>	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
<b>Pyramiden</b>	GRIGNON, 2, rue Duphot, Paris.
<b>Pyrélaive Collas</b>	à Ablon (Seine-&-Oise).
<b>Pyréthane</b>	à Alençon (Orne).
<b>Pyreléol Edet</b>	
<b>Q</b>	
<b>Quassine Frémint</b>	6, rue Abel, Paris.
<b>*Quiétol</b>	POULENC Frères, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
<b>*Quina Laroche</b>	COMAR, 20, rue des Fossés- Saint-Jacques, Paris.
<b>*Quinéine</b>	10, rue Fromentin, Paris.
<b>Quinine Pelletier</b>	VIAL, 8, rue Vivienne, Paris.
<b>Quinium Roy</b>	81, boul. Suchet, Paris.
<b>Quino-bromine Roussel</b>	10, rue Washington, Paris.
<b>Quinoforme Lacroix</b>	31, rue Philippe-de-Girard, Paris.

\* **Quinquina Gmet**  
**Quinquina granulé**  
**Astier**  
**Quinquina Watelet**  
**Quiphes Churchill**

27, faub. Montmartre, Paris.  
 Labor. **ASTIER**, 45, rue du  
 D<sup>r</sup> Blanche, Paris.  
**BLANCHOT**, 15, avenue  
 Montsouris, Paris.  
 12, rue Castiglione, Paris.

## R

**Radjunal Chevrier**  
**Rami-pouttes**

21, faub. Montmartre, Paris.  
**FOUGERAT**, 41, rue Chaptal,  
 Levallois-Perret.

**Reconstituant Moyné**  
**Rectoline**

82, rue d'Hauteville, Paris.  
**CRESTEY**, 164, rue Saint-  
 Honoré, Paris.

**Rectopaniline**  
**Rzetosol**

à Annonay (Ardèche).  
**CRESTEY**, 164, rue Saint-  
 Honoré, Paris.

\* **Régénérateur pulmo-**  
**naire du D<sup>r</sup> Bouyer**  
**Rein-Endocrisines**  
**Fournier**

**BARTHELEMY**, 5, rue Du-  
 gommier, à Nantes.  
 26, boul. de l'Hôpital, Paris.

**Remède d'Abyssinie**  
**Exibard**

**RLOTTIÈRE**, 6, rue Dom-  
 basle, Paris.

\* **Résyl Ciba**

**O. ROLLAND**, 1, pl. Morand,  
 Lyon.

\* **Révulsif Boudin**

6, rue du Moulin, Vincennes  
 (Seine).

\* **Révulsior**  
**Rhéantine Lumière**  
**Rhésal-Vicario**  
**Rhine-Menthol**

**PAULIN & BARRÉ**, à Tours.  
 9, cours Liberté, Lyon.  
 17, boul. Haussmann, Paris.  
**CARTILLIER**, 48, rue de  
 Berri, Paris.

**Rhedsaïne Coutu-**  
**rieux**

18, avenue Hoche, Paris.

\* **Rhoféine**

**USINES DU RHONE**, 21, rue  
 Jean-Goujon, Paris.

\* **Rhompol Leprince**  
**Ricinopalmine**  
**Riodine Astier**  
**Roburène Debay**  
**Resamol**  
**Royérine Dupuy**

62, rue de la Tour, Paris.  
 5, boul. des Brotteaux, Lyon.  
 45, rue du D<sup>r</sup> Blanche, Paris.  
 Rue Saint-Géry, Arras.  
**L. HINGLAIS**, à Sens Yonne.  
 225, rue Saint-Martin, Paris.

## S

**Salbine du D<sup>r</sup> Fayès**  
**Salène Ciba**

3, rue du 4-Septembre, Paris.  
**O. ROLLAND**, 1, pl. Morand,  
 Lyon.

**Saliearine Viel**  
**Salicel Dussaule**

7, rue Saint-Yves, Rennes.  
 6, rue Abel, Paris.

Salicylate de lithine	20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Clin	
Salicylate de soude	Id.
Clin	
Salol	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Salubrine Phénix	60, rue Saussure, Paris.
Sangule Dubat	80, faub. Saint-Denis, Paris.
Santal Blanc	à Narbonne (Aude).
Santal Bretonneau	26, rue Saint-Claude, Paris.
Santal Clin	20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Santal Midy	VIAL, 8, rue Vivienne, Paris.
Santal Menal	6, rue Daubigny, Paris.
Santalol Montagu	49, boul. Port-Royal, Paris.
Santal P. Petit	BEYTOUT & CISTERNE, 12, boul. Saint-Martin, Paris.
Santal salolé Lacroix	31, rue Philippe-de-Girard, Paris.
Santéine Montagu	13, rue des Lombards, Paris.
Santhèse	4, rue du Roi de Sicile, Paris.
Santogénol Caubin	Pharmacie CARTERET, 9, rue des Pyramides, Paris.
Saturel	DURET & RÉMY, 5, avenue des Tilleuls, Paris.
Sauge Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Saveline	M. SAVÉ, 2, av. Parmentier, Paris.
Savon antiseptique	A. RICHELME & C <sup>e</sup> , 12, rue Jacquand, Marseille.
Lieutaud	
Savon Cuticura	3, avenue Loewendal, Paris.
Savon Mollard	6, rue de Béarn, Paris.
Savon Pérusol	VENDEL, 61, rue de Vaugrard, Paris.
Savons pharmaceutiques S. P. A.	A. RICHELME & C <sup>e</sup> , 12, rue Jacquand, Marseille.
Savon Vigier	12, boulev. Bonne-Nouvelle, Paris.
Scorogènes	CLIN, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Scurébaline	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
"	
Scurocaine	Id.
Scuroforme	Id.
Sécacervine Roche	F. HOFFMANN-LA ROCHE & C <sup>e</sup> , 21, pl. des Vosges, Paris.
Séacrine Crestey	164, rue Saint-Honoré, Paris.
Sedlitz Ch. Chanteaud	54, rue Francs-Bourgeois, Paris.
Sédobrel Roche	F. HOFFMANN-LA ROCHE & C <sup>e</sup> , 21, pl. des Vosges, Paris.

• Sédogène Sallé	Labor. BERGER, 14, rue des Pyramides, Paris.
• Sédol Buisson	157, rue de Sèvres, Paris.
Sektal Grémy	LONGUET, 50, rue des Lombards, Paris.
Sels Le Perdriel	11, rue Milton, Paris.
• Sel de Hunt	16, rue Boulainvilliers, Paris.
Sel Jolivet	140, faub. St-Honoré, Paris.
Sel de Pennès	3, rue de Latran, Paris.
• Séléniel Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.
Sels-Sodia	29, avenue Friedland, Paris.
Selvan Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.
Sel Vichy-Etat	24, boul. des Capucines, Paris.
Sénophile Foucher	BRUNEAU, 64, rue de La Rochefoucauld, Paris.
• Septicémie Cortial	125, rue de Turenne, Paris.
Séquardine Bouty	3 <sup>me</sup> , rue de Dunkerque, Paris.
Sérénel	50, rue Rennequin, Paris.
Séro-Comprimés	Lab. GAVIGNET, 4, rue Alph. Fochier, à Lyon.
Séroferrine	CHEVRETIN & LEMATTE, 6, rue Ballu, Paris.
Sérosthényl Bouty	3 <sup>me</sup> , rue de Dunkerque, Paris.
• Sérum Neurophile Thévenot	21, rue des Roses, Dijon.
Sérum Névrosthé- nique	8, rue Jasmin, Paris.
• Sérum Oliviero	87, rue Denfert-Rochereau, Paris.
Sève Masgnaux	à Arcachon (Gironde).
Siamoc Treuette	15, rue Immeubles-Indus- triels, Paris.
Sigol	Lab. du Sigol, à Saint-Fons (Rhône).
Sinapisme Rigollot	13, rue Pavée, Paris.
Sinaplasme	4, rue Brunel, Paris.
Sirodien	228, rue de Paris à Montreuil- s/-Bois.
Sirop d'Absoline	49, boul. Port-Royal, Paris.
• Blondin	
Sirop d'Aconit Ecalle	BUISSON, 157, rue de Sèvres, Paris.
Sirop antiasthmati- que Favret	BLOTTIÈRE, 6, rue Dom- basle, Paris.
• Sirop d'Aubergier	COMAR, 20, rue des Fossés- Saint-Jacques, Paris.
Sirop Berthé	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Sirop Biféduré Rogé- Cavaillès	PÉPIN, 9, r. du 4-Septembre, Paris.
• Sirop de Blaveard	64, rue La-Rochefoucauld, Paris.



<b>Sirop Briant</b>	DEGLOS, 131, rue de Vaugirard, Paris.
<b>Sirop Buel</b>	CLIN, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
<b>Sirop Clérambourg</b>	4, rue Tarbé, Paris.
<b>Sirop Crosnier</b>	6, rue Chanoinesse, Paris.
<b>Sirop Delabarre</b>	FUMOUBE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
<b>Sirop Derbecq</b>	74, bd Beaumarchais, Paris.
<b>Sirop de Digitale</b>	LABELONYE, 99, r. d'Aboukir, Paris.
<b>Sirop du Dr Bousquet</b>	140, faub. St-Honoré, Paris.
<b>Sirop du Dr Dubreuil</b>	HAUTDIDIER, 37, r. Galilée, Paris.
<b>Sirop de Dusart</b>	VIAL, 8, rue Vivienne, Paris.
<b>Sirop Famel</b>	26, rue de la Réunion, Paris.
<b>Sirop ferrug. Laroze</b>	2, rue des Lions, Paris.
<b>Sirop Fraisse</b>	8, rue Jasmin, Paris.
<b>Sirop Blottière</b>	6, rue Dombasle, Paris.
<b>Sirop Géliveau</b>	MOUSNIER, à Secaux.
<b>Sirop de Gilbert</b>	à Maisons-Laffitte (S.-&-O.).
<b>Sirop de Gille</b>	73, rue Sainte-Anne, Paris.
<b>Sirop Girard</b>	48, rue d'Alésia, Paris.
<b>Sirop Grimault</b>	VIAL, 8, rue Vivienne, Paris.
<b>Sirop Guillermond</b>	DEGLOS, 131, rue de Vaugirard, Paris.
<b>Sirop du Dr Hequet</b>	MONTAGU, 49, boul. Port-Royal, Paris.
<b>Sirop d'Hémoglobine Byla</b>	26, avenue de l'Observatoire Paris.
<b>Sirop Henry Mure</b>	71, rue Saint-Jacques, Paris.
<b>Sirop Ferré</b>	6, rue Dombasle, Paris.
<b>Sirop d'Iodure de sodium Boissy</b>	DELOUCHE, 356, rue Saint-Honoré, Paris.
<b>Sirop Jane</b>	GILBERT, 3, rue du Trésor, Paris.
<b>Sirop Jellivet</b>	140, faub. St-Honoré, Paris.
<b>Sirop de Lamouroux</b>	73, rue Sainte-Anne, Paris.
<b>Sirop du Dr Manceau</b>	GUILLON, à Château-du-Loir (Sarthe).
<b>Sirop de la Maternité</b>	LAURIN, 86, boul. Port-Royal, Paris.
<b>Sirop Neurry</b>	COMAR, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
<b>Sirop phéniqué Déclat</b>	PRUNIER, 6, rue de la Tâcherie, Paris.
<b>Sirop polyiodure Gennon</b>	14, rue Victor-Hugo, Lyon.
<b>Sirop Rabuteau</b>	COMAR, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
<b>Sirop Rami</b>	FOUGERAT, 44, rue Chaptal, Levallois-Perret.

Sirop Rébillion	13, rue des Minimes, Paris
Sirop du Dr Rein- villier	DÉGLOS, 131, rue de Vaugi- nard, Paris.
Sirop Roche au thioceol	P. HOFFMANN-LA ROCHE & C <sup>e</sup> , 21, pl. des Vosges, Paris.
Sirop de Teyssèdre	à Limoges.
Sirop Tréhyou	COMAR, 20, rue des Fossés- Saint-Jacques, Paris.
Sirop tribromuré Gigon	7, rue Coq-Héron, Paris.
Sirop tribromuré Lasniée	TROUETTE, 15, rue Immeu- bles-Industriels, Paris.
Sirop Vacheron	4, av. Valloud, à Ste-Foy, près Lyon.
Sirop VauthierMarcq	98, r. du Chemin-Vert, Paris.
Sirop des Vespes	CAZE, 68 <sup>bis</sup> , av. de Châtillon, Paris.
Sirop Zed	CLIN, 20, rue des Fossés- Saint-Jacques, Paris.
Soderseine	J. DEPRUNEAUX, 18, rue de Beaune, Paris.
Solurol	CLIN, 20, rue des Fossés- Saint-Jacques, Paris.
Solutions adranes- thésiques Clin	CLIN, 20, rue des Fossés- Saint-Jacques, Paris.
Solutions Mure	à Pont-Saint-Esprit (Gard).
Solution Pautauberge	165, r. St-Denis, Courbevoie (Seine).
Solution Scheum	6, rue Corvetto, Paris.
Serol Churchill	12, rue Castiglione, Paris.
Sparadraps Le Per- driel	11, rue Milton, Paris.
Spartéine Houdé	9, rue Dieu, Paris.
Spasma Centurieux	18, avenue Hoche, Paris.
Spasmalgine Roche	21, place des Vosges, Paris.
Spasmine Jelly	27, rue de Mazarine, Paris.
Spermine Pöchl	32, boul. Sébastopol, Paris.
Sphérulines "Mon- cœur" chela'ogues (Extrait de bile)	49, av. Victor-Hugo, Boulogne-Paris.
Sphérulines "Mon- cœur" (Extrait en- téro-pancréatique)	— — —
Sphérulines entéri- ques "Moncœur" (Extrait intestinal)	— — —
Sphérulines "Mon- cœur" (Extrait gas- trique)	— — —
Sphérulines hépati- ques "Moncœur"	— — —

*Sphérulines ovariennes "Moncour"	49, av. Victor-Hugo, Boulogne-Paris
*Sphérulines "Moncour" (Extrait pan-créatique)	— — —
*Sphérulines "Moncour" (Extrait rénal)	— — —
*Sphérulines opothé- raques "Moncour"	— — —
*Sphérulines thyroï- diennes "Moncour"	— — —
*Stanion Couturier	18, avenue Hoche, Paris.
*Stannoxyl	ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris.
*Stannylose Théve- not	21, rue des Roses, Dijon.
*Staphylase du Dr Doyen	LEBEAULT, 5, rue Bourg- l'Abbé, Paris.
*Staphyle-coccine Fraquet	Laborat. SCIENTIA, 10, rue Fromentin, Paris.
Stéarol	M. BONNET, 102, rue du 11- Novembre, Saint-Etienne.
Sténergine	BEAUGONIN, 21, rue Picpus, Paris.
Sténofér Lumière	9, cours Liberté, Lyon.
Sthénophyl Vigan	103, rue Saint-Lazare, Paris.
*Stéramine	Lab. des Antiseptiques Chlo- rés, 40, r. Thiers, Le Havre.
Stomacel Boulet	36, avenue Duquesne, Paris.
Stemophile	Lab. DORANTOWICZ, 17 <sup>bis</sup> , avenue Parmentier, Paris.
*Stovaine Billen	POULENC Frères, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Stronal Mennier	19, rue de Chartres, Neuilly- sur-Seine.
*Strophantus Catillon	3, boul. Saint-Martin, Paris.
*Strychnarsitol Robin	13, rue de Poissy, Paris.
*Strychno-Fluocodyle	Labor. LAFARGE, 6, rue de Babylone, Paris.
Styrum Chalon	à Bagé-le-Chatel (Ain).
Sublimé G. Chan- teaud	108, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Succharure Leprince	62, rue de la Tour, Paris.
Sucre Edulcor Ferré	142, boul. St-Germain, Paris.
*Sulfarène	(Laborat. du) à Agen.
*Sulfarsenol Pluchon	92, r. Michel-Ange, Paris.
Sulfate d'Atropine Clin	20, rue des Fossés-Saint- Jacques, Paris.
Sulphydral Ch. Chan- teaud	54, rue Francs-Bourgeois, Paris.

<b>Sulphydragyre</b>	4, rue Aubriot, Paris.
<b>Dausse</b>	
<b>Sulfo-Benzol</b>	VAURS, 230, faubourg Saint-Honoré, Paris.
<b>Sulfo-bore Roy</b>	81, boul. Suehet, Paris.
<b>Sulfosodol Robin</b>	13, rue de Poissy, Paris.
<b>Sulfoléine Rezet</b>	BENDERITTER à Vendôme.
<b>Sulfo-mel du Dr Fayès</b>	FOUQUET & C <sup>e</sup> , 3, rue du 4-Septembre, Paris.
<b>Sulfo-rhinol Fayès</b>	— —
<b>Sulfareux Peuillet</b>	POMPANON, 112, rue du Bac, Paris.
<b>Sulfurine du Dr Langlebert</b>	ADRIAN, 9, rue de la Perle, Paris.
<b>Sulfurien Centurieux</b>	18, avenue Hoche, Paris.
<b>Sulfuryl Menal</b>	6, rue Daubigny, Paris.
<b>Sulphaqua Pépin</b>	9, rue du 4-septembre, Paris.
<b>Sulphévine Trouette</b>	15, r. Immeubles-Industriels, Paris.
<b>Superol</b>	H. R. NAN, 33, rue de Vaugl-rard, Paris.
<b>Suppargyre du Dr Faucher</b>	Labor. TISSOT, 34, boul. de Cliehy, Paris.
<b>Suppositeires Midy</b>	9, rue Commandant-Rivière, Paris.
<b>Suppositeires Pachant</b>	130, boul. Haussmann, Paris.
<b>Suppositeires Pépet</b>	19, avenue de Villiers, Paris.
<b>Suppositeires Reyer</b>	225, rue Saint-Martin, Paris.
<b>Surrénale - Endecrisines Fournier</b>	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
<b>Surrénaline Beuty</b>	3 <sup>me</sup> , rue de Dunkerque, Paris.
<b>Syncaïne Cilm</b>	20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
<b>Synergyl Vadam</b>	29, rue Mogador, Paris.
<b>Syphilithérapie Duret</b>	DELATTRE, 8, rue de l'Arcade, Paris.

## T

<b>Tablettes du Dr Beusquet</b>	140, faubourg Saint-Honoré, Paris.
<b>Tablettes oxymen-thol Perraudin</b>	Lab. SCIENTIA, 10, rue Fromentin, Paris.
<b>Tablettes Perroud</b>	7, rue des Archers, Lyon.
<b>Tablettes de thyroïde</b>	CATILLON, 3, boulevard St-Martin, Paris.
<b>Taburel Menal</b>	6, rue Daubigny, Paris.
<b>Tænisuge Kiro</b>	DANIEL-BRUNET, 6, rue de la Source, Paris.
<b>Tamar Iodien Grillen</b>	DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, Paris.

*Tampol Roche	F. HOFFMANN-LA ROCHE & C <sup>e</sup> , 21, pl. des Vosges, Paris.
Tampovules Corbière	27, rue Desrenaudes, Paris.
Tannourgyl Dr Letanneur	8, rue de Parme, Paris.
*Taxol	Lab. de Bio-Chimie appliquée, 21, rue Théodore-de-Banville, Paris.
Teinture de Coebeux	AGUEFFANT, 36, quai Fulchiron, Lyon.
Tercinol	LEMAITRE, 158, rue Saint-Jacques, Paris.
*Terkal Monal	6, rue Daubigny, Paris.
Ternese Trouette	15, r. des Immeubles-Industriels, Paris.
Terpine Gonnou	14, rue Victor-Hugo, Lyon.
Terpine Vigier	12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris.
Terpinol Adrian	9, rue de la Perle, Paris.
Testicule - Endocrinses Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Tétralguine Reuthier	à Vierzon (Cher).
Tétranitrol Reussel	10, rue Washington, Paris.
*Thaelaxine	DURET & REMY, 5, avenue des Tilleuls, Paris.
Thapsia Le Perdriel	12, rue Milton, Paris.
Théinol Bailly	15, rue de Rome, Paris.
*Théobromine Dubat (Théisine)	80, faub. Saint-Denis, Paris.
Théobromine Guillaumin	13, r. du Cherche-Midi, Paris.
Théobromine Houdé	9, rue Dieu, Paris.
Théobromine Reusseau	à Ermont (S.-&-O.).
Théobromine Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
*Théobromose	DUMESNIL, 10, r. du Plâtre, Paris.
*Théobryl	F. HOFFMANN-LA ROCHE & C <sup>e</sup> 21, pl. des Vosges, Paris.
*Théosalvose	GUILLAUMIN, 13, rue du Cherche-Midi, Paris.
Théosol Rousseau	à Ermont (S.-&-O.).
Thé St-Germain de Pierlot	H. RIVIER, 26, rue Saint-Claude, Paris.
Thiarsol	COMAR & C <sup>e</sup> , 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
*Thiagénol Roche	F. HOFFMANN-LA ROCHE & C <sup>e</sup> , 21, place des Vosges, Paris.
*Thioeol Roche	Id
*Thionhydrol Grémy	14, rue de Clichy, Paris.

Thymus-Endocrines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Thymusine Bouty	3 <sup>11</sup> , rue de Dunkerque, Paris.
Thymusine Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
Thyratexine Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
*Thyrénine Grémy	14, rue de Cliehy, Paris.
Thyroïde-Endocrines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Thyroïdine Bouty	3 <sup>11</sup> , rue de Dunkerque, Paris.
Thyroïdine Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
Tiodine Cœnet	43, rue de Saintonge, Paris.
*Tisane St-Luc	Comte de GRAUWE, 16, rue de Roerol, Paris.
Tissus emplastiques Le Perdriel	11, rue Milton, Paris.
*Tœchlorine	Etabl. POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
*Tenikéine Chevretin	5, rue Ballu, Paris.
Tenilécithine Rogier	19, avenue de Villiers, Paris.
Tonique Gonnou	14, rue Victor-Hugo, Lyon.
Toni-sérum Fres-singe	6, rue Abel, Paris.
Topiques Chaumal	FUMOUE, 78, boul. Saint-Denis, Paris.
Tribromure Gigon	7, rue Coq-Héron, Paris.
*Tricalcine	Laborat. SCIENTIA, 10, rue Fromentin, Paris.
Tridigestine Dalloz	13, boul. de la Chapelle, Paris.
*Triféryl	HAUTIDIER, 37, r. Galilée, Paris.
Trinitrine Reussel	10, rue Washington, Paris.
Trinitrine Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Triphosphétal Ren-gniz	56, rue de Passy, Paris.
Trisodine Terna	78, boulev. des Batignolles, Paris.
Tritonine	64, rue des Tournelles, Paris.
Trixyl Fraudin	4, avenue Desfieux, Boulogne-sur-Seine (Seine)
*Tubérol Reccatel	BROCADET, 89, rue du Commerce, Paris.
Tubes Bayard	BEYTOUT & CISTERNE, 12, boul. Saint-Martin, Paris.
Tubes Levasseur	23, rue de la Monnaie, Paris.
*Tuberculine C. L.	POULENC Frères, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Tubes stérilisés Clin (tous médicaments)	20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Tulle gras Lumière	cours de la Liberté, Lyon.

## U

- **Ulcérine Berger** 90, rue du Bac, à La Varenne-Saint-Hilaire (Seine).
- Ulmairé Gmet** 27, faub. Montmartre, Paris.
- Ulmarene Gigon** 7, rue Coq-Héron, Paris.
- Ultrargent Leclerc** 10, rue Vignon, Paris.
- Uralysol** Lab. Thérapie bio-chimique, 159, av. de Wagram, Paris.
- **Uraseptine Rogier** 19, avenue de Villiers, Paris.
- **Urazine** USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- Uréol Ch. Chanteaud** 54, rue des Francs-Bourgeois, Paris.
- Urisanine Coussinet** 20, rue des Martyrs, Paris.
- Urodol Clérambourg** 4, rue Tarbé, Paris.
- Urodonal Chatelain** 3, r. de Valenciennes, Paris.
- **Urofermine Gebey** BEYTOUT & CISTERNE, 12, boul. Saint-Martin, Paris.
- **Uremétine Lamblotte Frères** 3, rue d'Edimbourg, Paris.
- Urophile Bailly** 15, rue de Rome, Paris.
- Urotrepine Vicario** 17, boul. Haussmann, Paris.
- **Uretrypsine Demasles** à Vienne (Isère).

## V

- Vaccin antigencocccique** OLIVIERO, 87, rue Denfert-Rochereau, Paris.
- Vaccin antituberculeux Bessan** Lab. des Industries Biologiques, 25, rue Royale, Paris.
- **Vaccins atoxiques stabilisés** POULENC Frères, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
- Vaccins atoxiques Cépède** Institut de Biologie appliquée, 39, av. Reille, Paris.
- Vaccins I. O. D.** Lab. Médical de Biochimie, rue Lafon, à Marseille.
- **Vaccins microbiens curatifs** GRÉMY, 14, rue de Clichy, Paris.
- **Valbernine Rogier** 19, avenue de Villiers, Paris.
- **Valéral Puy** à Grenoble (Isère).
- Valéramyl** FOULON & C<sup>e</sup>, 188, faubourg Saint-Martin, Paris.
- Valérianate Gabail** 3, rue de l'Estrapade, Paris.
- **Valérianate Grignon** 2, rue Duphot, Paris.
- Valérianate Laboureur** 245, rue de Vaugirard, Paris.
- Valérianate Paebaut** 139, boul. Haussmann, Paris.
- **Valérianate Pierlot** 26, rue Saint-Claude, Paris.
- Valériade Byla** 26, avenue de l'Observatoire, Paris.

Valériane Dausse	4, rue Aubriot, Paris.
Valériane Ginet	27, faub. Montmartre, Paris.
Valérianose Gigon	7, rue Coq-Héron, Paris.
Valérobromine Le-grand	DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, Paris.
Valéromenthol	Pharmacie Internationale, 71, faub. St Honoré, Paris.
Valéronal	Lab. BERGER, 14, rue des Pyramides, Paris.
Valéronal Genevrier	2, rue du Débarcadère, Paris.
Valyl Midy	9, rue Commandant-Rivière, Paris.
Vanadarsine Gull-laumin	13, r. du Cherche-Midi, Paris.
Vanadine Chevrier	21, faub. Montmartre, Paris.
Varleine Béraud	12, rue Cadet, Paris.
Varieure Marek	G. MONNIER, 19, rue de Chartres, Neuilly-s-Seine.
Varilaxine	CRESTEY, 164, rue Saint-Honoré, Paris.
Vasogènes	PEARSON, 43, rue Pinel, Saint-Denis (Seine).
Vaselaxine	FOURNIER Frères, 26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Végétaline Dubois	7, rue Jadin, Paris.
Veinosine	LEBEAULT & C <sup>e</sup> , 5, rue Bourg-l'Abbé, Paris.
Véronal Bousquet	140, faub. St-Honoré, Paris.
Véronal Vicarie	17, boul. Haussmann, Paris.
Véronidia Buisson	157, rue de Sèvres, Paris.
Vésientolres	FUMOUBE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
Viburnum Ginet	27, faub. Montmartre, Paris.
Vinaigre de Peonès	3, rue de Latran, Paris.
Vin d'Anduran	MOUSNIER, à Sceaux (Seine).
Vin Aroud	6, rue Dombasle, Paris.
Vin Bagnols St-Jean	2, rue du Petit-Château, Charenton (Seine).
Vin de Baudon	12, rue Charles-V, Paris.
Vin de Bellini	DETHAN, 11, rue Alphonse-de-Neuville, Paris.
Vin Bravais	3, rue Mogador, Paris.
Vin de Bugeaud	LEBEAULT, 5, rue Bourg-l'Abbé, Paris.
Vin de Chassainé	G. PRUNIER & C <sup>e</sup> , 6, rue de la Tacherie, Paris.
Vin de Coca-Kola	CHEVRIER, 21, faub. Montmartre, Paris.
Vin Désjles	18, rue des Arts, Levallois-Perret (Seine).
Vin d'Extrait de Foie de Merue	CHEVRIER, 21, faub. Montmartre, Paris.



- Vin Girard**  
**Vin de Kela Midy**  
**Vin de Laveix**  
**Vin du Dr Legendre**  
**Vin Mariani**  
**Vin de Meride**  
**Vin Nourry**  
**Vin de Paehaut**  
**Vin de Séguin**  
**Vin Urané Pesqui**  
**Vin de Vial**  
**Vin Vequet**  
**Vieforme Ciba**  
**Viscalbine Roussel**  
**Voltargel Robin**  
**Vulcase**
- 48, rue d'Alésia, Paris.  
 9, rue Commandant-Rivière,  
 Paris.  
 5, avenue Victoria, Paris.  
 38, rue des Lices, Angers.  
 41, boul. Haussmann, Paris.  
 LANDRIN, 20, rue de La  
 Rochefoucauld, Paris.  
 COMAR, 20, rue des Fossés-  
 Saint-Jacques, Paris.  
 130, boul. Haussmann, Paris.  
 165, rue Saint-Honoré, Paris.  
 au Bouscat-Bordeaux.  
 36, place Bellecour, Lyon.  
 DÉFRANCE, 5, rue Eugène-  
 Delacroix, Paris.  
 O. ROLLAND, 1, pl. Morand,  
 Lyon.  
 10, rue Washington, Paris.  
 13, rue de Poissy, Paris.  
 Lab. BRISSON & C<sup>e</sup>, 111, rue  
 Mont-Cenis, Paris.

## X

- Xémaderm**
- GILLOT, 50, r. Châteaudun,  
 Paris.

## Y

- Yoghourt Karlos**  
**Yoghourt Lagnei**  
**Ycheurth Carrier**  
**Yehimbine Gilbert**  
**Ysc**  
**Ystaline**
- Lab. Biologique, à Lécuse  
 (Nord).  
 7, rue de la Pépinière, Paris.  
 54, faub. St-Honoré, Paris.  
 3, rue du Trésor, Paris.  
 Lab. de l'Yse, 62, rue Louis-  
 Blanc, Paris.  
 A. CEDARD, 2, pl. du Théâtre-  
 Français, Paris.

## Z

- Zédene**  
**Zedae**  
**Zehel**  
**Zemel**  
**Zymastase Courier**  
**Zymatine Lescène**
- ROBERT & CARRIERE, 37,  
 rue de Bourgogne, Paris.  
 Moulins de Puteaux (Seine).  
 Labor. de Bio-Chimie appli-  
 quée, 21, rue Théodore-de-  
 Banville, Paris.  
 VIAL, 8, rue Vivienne, Paris.  
 à Beauvais (Oise).  
 à Livarot (Eure).




2<sup>e</sup> Partie

---

**D I C T I O N N A I R E  
D E S P É C I A L I T É S  
P H A R M A C E U T I Q U E S**

---



## ACÉSINE GUILLAUMIN

**Composition.** — L'Acésine est une pommade à base d'extrait de capsules surrénales, de chlorétone et de stovaine.

**Propriétés.** — Agent analgésique et vasoconstricteur dont les propriétés peuvent être utilement mises à profit, en particulier, dans le cas d'hémorroïdes externes ou internes.

**Indications.** — Hémorroïdes, fissures et prurit de l'anus, démangeaisons de la même région, engelures, gerçures.

**Mode d'emploi.** — L'Acésine se présente en tubes d'étain. On applique gros comme un pois de la pommade sur les hémorroïdes externes; quand les hémorroïdes sont internes, visser sur le tube la canule qui l'accompagne et introduire la pommade dans le rectum. Renouveler les applications trois ou quatre fois par jour.

**Laboratoires André GUILLAUMIN**

13, Rue du Cherche-Midi — PARIS

## ADRÉNALINE CLIN

Principe actif vaso-constricteur  
des glandes surrénales

**Formes.** — *Solution d'Adrénaline Clin* au 1000<sup>e</sup>, fl. de 5 et 30 cm<sup>3</sup>.

2<sup>e</sup> *Collyre d'Adrénaline Clin* au 15000<sup>e</sup> et au 1/1000<sup>e</sup>, en ampoules compte-gouttes de 10 cm<sup>3</sup>. — Associations : Collyres Clin, Adrénaline-Esrène, Adrénaline-Cocaine en ampoules compte-gouttes de 10 cm<sup>3</sup>.

3<sup>e</sup> *Graisses d'Adrénaline Clin*, dosés à 1/4 de mgr.

4<sup>e</sup> *Suppositoires d'Adrénaline Clin* à 1/2 mgr.

5<sup>e</sup> *Tubes stérilisés d'Adrénaline Clin*, en boîtes de 6 tubes; en solution titrée à 1/10 de mgr. par cm<sup>3</sup>, en solution titrée à 1/4 de mgr., en solution titrée à 1/2 mgr., en solution titrée à 1 mgr. Associations : Tubes stérilisés Clin à l'Adrénaline-Cocaine, Adrénaline-Stovaine et Adrénaline-Syncaïne, en boîtes de 6 et de 12 ampoules.

**Doses.** — Localement selon les nécessités. Voies stomacale ou rectale : 5 à 10 gouttes par dose (solution à 1/1000<sup>e</sup>), 30 gouttes en 24 heures. Voie hypodermique : 1 mgr. d'Adrénaline par jour en 2 fois.

**Laboratoires CLIN**

20, rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

## ÆTHONE

*Antispasmodique, sédatif de la Coqueluche  
et de la Toux*

**Doses.** — Pour les enfants : administrer.

5 à 6 fois par jour	}	de 1 mois à 1 an : Une goutte par mois d'âge. de 1 à 2 ans : 12 à 20 gouttes. de 2 à 5 ans : 20 à 25 gouttes. de 5 à 10 ans : 25 à 30 gouttes. de 10 à 15 ans : 30 à 35 gouttes. et plus s'il est nécessaire.
------------------------	---	--

2° Pour les adultes : administrer. — 5 à 6 fois par jour : 50 à 60 gouttes dans une quantité suffisante d'eau sucrée ou sirop de tolu additionné d'eau. La dose totale pour les adultes peut être portée à 400 gouttes par 24 heures, s'il est nécessaire. L'Æthone doit être administré 1/2 heure avant, ou 2 heures après le repas.

**FALCOZ & C<sup>e</sup>**

9, Rue Boissonade — PARIS

## AIROL " ROCHE "

Combinaison basique de bismuth oxyiodée  
donnant au contact des plaies de l'*Iode*  
à l'état naissant.

**AIROL " Roche "**, en poudre.

**Prop. thérap.** — Antiseptique puissant, désinfectant, cicatrisant, kératoplastique, sans odeur, inaltérable à la lumière; toxicité moindre que celle de l'iodoforme (dont l'AIrol " Roche " est le seul succédané pratique).

**Indic. thér.** — Toutes celles de l'iodoforme.

Bien spécifier la marque " Roche ".

### Produits

**F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**

21, Place des Vosges, PARIS

# ALGATAN

(Corps nouveau)

*Combinaison colloïdale destinée d'iode,  
d'Anhydride sulfureux et de Tanin  
en milieu Sulfo Calcique Fluoré.*

Iode et tous dérivés complètement indécélabiles.

**Forme.** — Cachets.

**Compos.** — Chaque cachet (1 gr.) contient :

Iode bi-sublimé...	0,033	} Combinaison
Bi-sulfite de Na.....	0,033	
Tannate de Na.....	0,198	
Fluorure de Na. ....	0,020	} Milieu
Carbonate de Ca O.....	0,333	
Soufre colloïdal. ....	0,333	
Matières amylacées . . .	q. s.	

et agit thérapeutiquement comme :

XX gouttes de teinture d'iode au 1/10<sup>e</sup> et  
comme environ 0 gr. 20 d'iodures alcalins.

**Rémarque.** — Ces comparaisons ne sont que  
purement indicatives puisque l'iode n'est  
pas libre et qu'il se trouve « *engagé comp-  
lètement dans un système colloïdal direc-  
tement complexe d'où il ne peut être libéré  
par les réactifs usuels* ».

**Indications thérapeutique.** — Tuberculose,  
Scrofulose, Lymphatisme, Anémie, Affec-  
tions cardio-vasculaires, Asthme, Catarrhe  
bronchique, Kératites interstitielles et  
strumeuses, Pleurésie, Pneumonie, Pré-  
tuberculose et toutes indications de l'iode  
et des iodures.

Toujours au milieu ou à la fin des repas  
principaux.

**Posologie.** — *Adultes*, 2 à 6 cachets par jour.

*Enfants*, 3 à 5 ans, 1/2 cachets; 5 à 10 ans,  
1 cachet; 10 à 15 ans, 2 cachets.

Pour enfants au-dessous de 3 ans ou nou-  
veau-nés ouvrir le cachet et mélanger la  
dose prescrite avec du miel.

Prix la boîte de 30 cachets 6 fr. 60 (impôt compris)

**Société de l'Aniodol**

40, Rue Condorcet — PARIS

## ALGOCRATINE

(Citrato de Phénylamidoxanthine)

**Forme.** — En cachets de 0 gr. 75.

**Indic. thé.** — Migraines, névralgies, sciaticques. En général toute douleur d'origine nerveuse. Recommandée particulièrement dans les cas de *règles douloureuses*.

**Posologie.** — Un cachet dès les premiers symptômes de douleurs et un autre une heure après si nécessaire. Trois cachets par 24 heures.

**Pharmacie LANCOSME**

71, Avenue Victor-Emmanuel III, 71  
PARIS (8<sup>e</sup>)

---

## ALGOLANE

Médicament antiseptique et analgésique puissamment actif, sans odeur désagréable, non irritant, exempt de tous les inconvénients des préparations salicylées destinées à l'usage externe.

**Indications.** — S'emploie avec succès contre le rhumatisme aigu, suraigu ou chronique; les névralgies de toute nature; les douleurs musculaires (lumbago, torticolis), les douleurs de la colique hépatique; le prurit.

**Mode d'emploi.** — Verser quelques gouttes d'Algolane sur la région douloureuse, les étaler par une friction légère, recouvrir d'un imperméable et d'un pansement ouaté.

Littérature et échantillons sur demande.

**Etablissements POULENC Frères**

92, rue Vieille-du-Temple — PARIS



# AMPOULES CHURCHILL

## INDOLORES

à base d'Hypophosphites

Agents les plus actifs de la médication reconstituante par le Phosphore

*Ampoules indolores de Poffol Churchill* : 0,10 d'Hypophosphites composées dans la proportion des bases minérales de l'organisme, avec addition de Méthylarsinate de Strychnine : 1 mgr. — Indiquées dans la Neurasthénie et dans tous les cas exigeant un reconstituant énergétique.

*Ampoules indolores d'Irol Churchill*, à base d'Hypophosphite de fer : 0,002 dans 1 cm<sup>3</sup>. — Indiquées dans Anémie, Chlorose, Aménorrhée, Dysménorrhée, lèlère hémolytique.

*Ampoules indolores de Limol Churchill*, à base d'Hypophosphite de chaux : 0,10 dans 1 cm<sup>3</sup>. — Indiquées dans Phosphaturie, Tuberculose, Asthénie, Diabète, Rachitisme, Dentition, Bronchites.

*Ampoules indolores de Sorol Churchill*, à base d'Hypophosphite de soude : 0,10 dans 1 cm<sup>3</sup>. — Mêmes indications mais en cas d'Hypertension artérielle et d'âge avancé.

*Et de tous autres Hypophosphites* : Manganèse, Quinine, etc.  
8 fr. la boîte de 10 ampoules (Prix réglementé)

PHARMACIE SWANN

12, Rue Castiglione, 12 — PARIS

# AMPOULES DE DIGALÈNE

## " ROCHE "

(Digitale injectable)

Tous les principes actifs de la macération de feuilles fraîches de digitale solubilisés et injectables.

1 cc. = 0,15 ctg. poudre de feuilles fraîches de digitale.

Dose moyenne. — 1 à 4 ampoules et plus par 24 heures.

Prop. thér. — Solubilité parfaite, dosage rigoureux. — Action très rapide, tolérance absolue, effets constants aux mêmes doses, pas d'accumulation. (Voir Digalène " Roche ").

injections. — Hypodermiques, intra-veineuses, intra-musculaires (indolores).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>

21, Place des Vosges — PARIS

## AMPOULES DE PANTOPON " ROCHE "

(opium total injectable)

1 amp. de 1 cc. = 0,02 cgt. de Pantopon " Roche "

**Doses et mode d'emploi.** — Adultes : 1 à 3 amp. par 24 heures et plus. Enfants 1/4 à 1/2 amp. par année d'âge et par 24 heures.

**Indic. thér.** — Toutes celles de l'opium, de la morphine et de leurs dérivés.

Le PANTOPON " ROCHE " représente tous les alcaloïdes de l'opium sous forme de chlorhydrates solubles et injectables.

0,01 cgt. de Pantopon " Roche ",  
= 0,50 cgt. de teinture d'opium,  
= 0,025 mgr. d'extrait d'opium,  
= 0,005 mgr. de morphine.

Boîtes de 3, 6 et 12 Ampoules

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**

21, place des Vosges, PARIS

---

## AMPOULES de SÉCACORNINE " ROCHE "

(Tous les principes actifs de l'ergot de seigle)  
(Voir page spéciale Sécacornine " Roche ")

**Indic. thér.** — Hémorragies de toute nature, myocardites, congestion des poumons et de l'encéphale, atonie utérine avant, pendant et après les accouchements.

**Doses et mode d'emploi.** — 1 ampoule de 1 cc. de Sécacornine " Roche " agit comme 4 grammes de seigle ergoté.

Doses moyennes : 1/2 à 1 ampoule par jour.

Dose d'urgence : 2 ampoules et plus par 24 h.

(Voie hypodermique ou intramusculaire).

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**

21, Place des Vosges — PARIS (3<sup>e</sup>)

# AMPOULES de SPASMALGINE

## " ROCHE "

(Antispasmodique vrai)

**Composition.** — Chaque ampoule contient :

Un centigramme Pantopon " Roche ".

Deux centigrammes Papavérine " Roche ".

Un milligramme Atrinal " Roche ".

(Voir page spéciale Spasmalgine " Roche ").

**Indications thérapeutiques.** — *Tous les états spasmodiques* et notamment coliques hépatiques et néphrétiques, spasmes du larynx, de l'estomac, de l'intestin, coliques, sueurs, diarrhées des tuberculeux, dysménorrhée, angine de poitrine, hoquet épidémique, excitation anté et post-opératoire, accouchements difficiles, tous états d'hyperexcitabilité, etc.

**Doses et mode d'emploi.** — Dose moyenne : 1 à 2 ampoules par jour. Dose forte : 2 à 4 ampoules par jour (par voie hypodermique ou intramusculaire).

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co**

21, Place des Vosges — PARIS (3<sup>e</sup>)

# AMPOULES DE THÉOBRYL

## " ROCHE "

(Théobromine injectable)

**Indications.** — Toutes les fois que la Théobromine n'a rien donné, qu'il y a intolérance gastrique ou susceptibilité des malades ou chaque fois qu'il faut agir vite et imposer un traitement intensif.

**Doses et mode d'emploi.** — Chaque ampoule = 2 cc.

**Dose moyenne utile :** Adultes, 2 ampoules par jour.

Enfants, 1/2 ampoule par jour.

**Dose forte ...** Adultes, 3 à 4 ampoules par jour.

Enfants, 1 ampoule par jour.

(Par voie intramusculaire indolore).

**Dose d'urgence** ... Adultes, 3 à 4 amp. par j. en 1 ou 2 fois.

Enfants, 1 à 2 amp. par j. en 1 ou 2 fois.

(Par voie endoveineuse ou intramusculaire).

**Nota.** — Les injections intramusculaires sont indolores ; il faut les faire à la face externe de la partie fessière de la cuisse — (Voir thèse du Dr Jouisse, Paris 1920 et les travaux des Prof. Pouchet, Rémond, Duhol, des Drs Richard St-Yves, Vigouroux, Ségard, Bénéch, etc.)

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co**

21, Place des Vosges — PARIS (3<sup>e</sup>)

## AMYLODIASTASE THÉPÉNIER

Phosphates, Diastases et vitamines de  
de croissance des Céréales germées

**Forme.** — Comprimés et Sirop.

**Indic. Thér.** — Entérite et Dyspepsie (salivaire et pancréatique) Tuberculose, Rachitisme, Palpitations (d'origine digestive). Maladies par carence, digestion des féculents

**Mode d'emploi.** — Deux comprimés ou deux cuill. à café de sirop, après les repas. Préparation des bouillies : Délayer un ou 2 comprimés écrasés d'amylodiastase dans une bouillie ne dépassant pas 60°.

Laboratoire des Ferments

A. THÉPÉNIER

12, Rue Clapeyron — PARIS

## ANAQUINTINE LESCÈNE

**Composition.** — Aldéhydes benzylocinnamique, thymol-cuéalypsol.

**Forme.** — Liquide légèrement rosé, entièrement miscible à l'eau.

**Propriétés.** — Puissant antiseptique diffusible. En applications sur la gorge et la poitrine, elle agit comme antispasmodique et réalise l'antisepsie des voies respiratoires.

**Indications.** — Traitement externe de la Coqueluche, des toux spasmodiques, asthme, laryngites, coryza.

Associée au *Balsamol*, elle constitue le traitement conjugué des toux spasmodiques donnant des résultats remarquables particulièrement dans la *Coqueluche*.

**Mode d'emploi.** — La diluer de 4 parties d'eau chaude pour compresses sur la gorge et la poitrine, recouvrir de taffetas gommé et d'une bonne couche d'ouate, laisser en place toute la nuit.

En inhalations et en aspersions, l'employer pure.

Laboratoires LESCÈNE

à LIVAROT (Calvados)

## ANIODOL

Combinaison de Triméthanal avec un dérivé allylique dans une glycérine spécialement distillée.

**Formes.** — Solution d'Aniodol, à 1 % ; Poudre d'Aniodol ; Aniodol interne (avec compte-gouttes) ; Savon à l'Aniodol à 2 %, boîte de 3 pains.

**Mode d'emploi et dose.** — Usage externe : Injections, Lavages, etc., 1 à 2 cuil. à bouche de solution d'Aniodol 1 %, par litre d'eau. La poudre *insoluble*, s'emploie aux lieu et place de l'iodoforme, seule ou incorporée à une pommade appropriée.

**Société de l'ANIODOL**

40, rue Condorcet — PARIS

---

## ANTACIDOL

**Compos.** — Carbonate de bismuth chimiquement pur, sucre et cacao.

**Action.** — Agit comme saturant des acides de l'estomac et en revêtant la muqueuse d'une fine couche de bismuth.

**Indications.** — Calme les douleurs des hyperchlorhydriques : est spécialement indiqué dans les cas d'Ulcère de l'estomac et les Gastrorrhagies.

**Forme pharmaceutique.** — Tablettes comprimées.

**Dose.** — Un comprimé toutes les 5 minutes jusqu'à soulagement. (Ces comprimés, même à doses élevées, ne constipent pas).

**Laboratoires DURET & RÉMY**

5, Avenue des Tilleuls — PARIS (18<sup>e</sup>)

## ANTHEMA

Sérum sérique antihémorrhagique  
des docteurs Dufour et Le Hello.

Médication antihémorrhagique basée sur un principe entièrement nouveau. Les propriétés coagulantes de ce sérum proviennent de réactions anaphylactiques provoquées à dessein chez l'animal qui le fournit. L'anaphylaxie passive ainsi réalisée est sans inconvénient pour le malade.

**Principales indications.** — Etats hémorrhagiques, hémophilie, toutes les hémorrhagies inaccessibles à l'action chirurgicale et ou rebelles aux moyens hémostatiques habituels, Epistaxis, Hémoptysies, Hémorrhagies intestinales, etc.  
Préventif antihémorrhagique avant l'intervention chirurgicale.

**Mode d'emploi.** — Injection sous-cutanée ou intra-musculaire à la dose de 10<sup>cc</sup> (une ampoule). On peut, en cas de besoin, répéter les injections au bout de quelques heures ou les jours suivants.

Pas de contre-indication.

Littérature sur demande

**Etablissements POULENC Frères**

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS (2<sup>e</sup>)

## ANTIALGOS CHRISTIAENS

Solution d'iodo-salicylate de colchicine en solution salicylée donnant à l'analyse élémentaire:

Acide salicylique.....	3 gr. 50
Colchicine.....	0 gr. 005
Iode (ce qui peut se combiner).....	1 gr. environ
Excipient Q s. p <sup>r</sup> 100 cm <sup>3</sup> .	

**Dose et mode d'emploi.** — *Acute* : Par 24 heures, 6 cuill. à soupe pleines (100 gr. environ), puis à doses décroissantes. — *Forme chronique* : Une à trois cuill. à soupe suivant les cas.

**Indic. thér.** — Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Lumbago, Sciatique, Névralgie rhumatismale, etc.  
(Expérimenté à l'Institut Physiologique de Nancy et reconnu sans action sur le cœur, les reins et l'estomac).

Le flacon, 20 francs

Le demi-flacon, 12 francs

**LABORATOIRES DE LA PHARMACIE DE LA  
PLACE ROYALE, 74, Boul. Lundy, REIMS**

Compte Postal 23433

## ANTIASTHME BENGALAIS

Poudre fumigatoire à base de  
Solanées nitrées et Menthol

**Mode d'emploi** — En faire brûler une petite  
pincée sur une soucoupe et, fermant les  
yeux, respirer doucement la fumée par les  
narines.

**Indications.** — Remède d'urgence dans les ac-  
cès d'*Asthme*, *Emphysème*; *Coryza*, *Asthme*  
des foins, *Bronchites chroniques*, etc.

La boîte : 5 fr.

## CIGARETTES SCHULZÉ-BENGALAIS

aux mêmes principes

La boîte : 3 fr.

Echantillons gratuits au Corps Médical et aux Ma-  
lades sur recommandation du médecin traitant.

**Laboratoires FAGARD**

44, Rue d'Aguesseau. — BOULOGNE-sur-MER  
Téléphone 705

---

## ANTIGRIPPINE MIDY

(Acéto-Phényl-Salétidine, poudre de  
Gelsemium et poudre de Dower)

Ni Quinine — Ni Antipyrine

*Cachets* dosés à 0,65 egr.

**Dose et mode d'emploi.** — 1 cachet à  
distance des repas, de préférence le  
soir au coucher, dans un grog chaud;  
renouveler au besoin une heure après.

**Prop. thér.** — Antithermique, Analgé-  
sique, Bactéricide.

**Indications.** — Grippe, Influenza, Rhume,  
*Coryza*, Maux de tête, Courbature,  
Névralgies.

Détail : 140, Faubourg St-Honoré, PARIS

**Laboratoires MIDY**

9, rue du Commandant-Rivière, PARIS (8<sup>e</sup>)

## ANTODYNE

(Phenoxypropanediol)

Analgésique sédatif. Sans action  
antithermique.

**Emploi comme analgésique dans :**

Névralgies, migraines, céphalées, douleurs  
rhumatismales, manifestations doulou-  
reuses des fièvres infectieuses, etc.

**Emploi comme sédatif dans :**

Chorée, asthme, coqueluche, etc.

Se prescrit en cachets de 0,50 au nombre de  
1 à 6 par jour (prescription magistrale) ou  
sous forme de cachets d'Antodyne Billon  
à 0 gr 50.

Littérature et échantillons sur demande.

**Etablissements POULENC Frères**

92, rue Vieille-du-Temple — PARIS

---

## APALUDOL

Médication Quino-Arsénicale

Mangano-Strychnique

**Doses et mode d'emploi :**

Adultes : 8 pilules par jour pendant 5 jours

4 » » 10 »

Jeunes gens : 4 » » 10 »

2 » » 20 »

Comme préventif et pendant la conva-  
lescence 2 pilules le soir pendant 20 jours  
par mois, autant qu'il est nécessaire.

**Prop. thér.** — Spécifique du paludisme,  
Fièvres intermittentes, Grippe.

**F. AUCLAIR**, Docteur ès-sciences

Aigurande (Indre)



## ARHEOL

**Formule.** —  $C^{15} H^{26} O$ .

**Composition.** — Principe actif de l'essence de santal.

**Forme.** — Fl. de 40 capsules contenant chacune 0 gr. 20 environ de produit.

**Prop. Thér.** — Balsamique; antiseptique et analgésique puissant dans toutes les affections des voies urinaires. Produit chimiquement pur n'occasionnant aucune des douleurs provoquées par l'essence de Santal.

**Indications.** — Blennorrhagie et blennorrhée, cystites, urétrites, pyélites, pyélo-néphrites.

**Dose.** — 10, 12 capsules par jour, en 3 fois : le matin, à midi et le soir, une demi-heure avant les repas.

Prix : 6 fr. 50

**Laboratoires P. ASTIER**

45, rue du Docteur-Blanche, PARIS (16<sup>e</sup>)

## ARHINE LAMBIOTTE FRÈRES

Poudre rougeâtre, insipide, inodore, non caustique, non toxique, sèche, contenant 48 % de gaulthéol, 48 % de tannin, 4 % d'aldéhyde formique.

**Mode d'emploi.** — *Contre ozène.* — Matin et soir laver soigneusement l'intérieur du nez à l'eau tiède, bouillie ou boriquée pour enlever croûtes et sécrétions; quatre ou six fois par jour introduire l'Arhine dans les narines en prenant ou mieux à l'aide d'une poire en caoutchouc pour insuffler les poudres.

*Contre Coryza et maux de gorge.* — Désinfecter le nez et la gorge par les méthodes habituelles et faire priser de l'Arhine 2 ou 3 fois dans la journée et le soir au moment de se coucher. L'écoulement dans le coryza, tarit rapidement sans laisser aucune trace.

**Indication.** — Ozène, coryza et maux de gorge.

Littérature et échantillons :

**Produits LAMBIOTTE Frères**

3, Rue d'Edimbourg — PARIS (8<sup>e</sup>)

Téléphone Wagram 14-73

## ARQUÉRITOL LESURE

Huile injectable d'amalgame d'argent  
à 40 % de mercure

**Mode d'emploi.** — Identique à celui de l'huile grise : une injection intramusculaire par semaine, correspondant à 8 ou 9 centigr. Hg.

**Indications.** — Toutes manifestations syphilitiques.

**Avantages.** — Injection non douloureuse; absence de nodosités; tolérance parfaite grâce à l'action propre de l'argent, et à son effet favorable sur l'assimilation du mercure.

Flacon de 5 gr. : 11 fr.

**Pharmacie VIGIER-LESURE**

70, Rue du Bac — PARIS

---

## ARSENIODE BURIAT

**Forme.** — Solution de tri-iodure d'arsenic à 1% préparée à l'aide d'un procédé spécial qui la rend stable, à l'inverse des préparations ordinaires de ce produit qui se décomposent.

**Indications.** — Toutes les manifestations du lymphatisme : adénopathies, végétations adénoïdes, ganglions, trachéobronchiques, impetigo, blépharites, catarrhe naso-pharyngien, bronchites à répétition, etc., nutrition ralentie, faiblesse générale, asthme.

**Mode d'emploi.** — Chez les petits : 4 à 10 gouttes, 2 fois par jour aux repas. Chez les plus grands : 10 à 15 gouttes, 2 fois par jour aux repas. Chez les adultes : 15 à 30 gouttes, 2 fois par jour aux repas.

Prix : 5 fr. 60 le flacon

**BURIAT, Pharmacien**

30, Rue Pergolèse — PARIS

## ARSENOBENZOL

Diehlorhydrate  
de dioxydiamidoarsenobenzol

**Indications.** — *SYPHILIS* à toutes ses périodes, Pian ou framboesia, typhus récurrent, paludisme, leucémie, angine de Vincent, etc.

On l'emploie en injections intraveineuses à doses progressives de 0 gr. 10 à 0 gr. 60 en *ayant soin d'alcaliniser la solution*.

Peut également s'administrer en lavements ou comme topique local.

Littérature sur demande.

**Etablissements POULENC Frères**

92, rue Vieille-du-Temple. — PARIS

---

## ARSYCODILE

Cacodylate de Soude pur

**Indic. théér.** — Accélérateur de la nutrition générale, ramenant l'appétit, etc.

Tout spécialement désigné pour l'usage sous-eutané.

**Dose et mode d'emploi.** — Ampoules dosées à 0,05. Une injection par jour pendant huit jours, repos un temps égal, reprise en alternant jusqu'à guérison.

**Docteur M. LEPRINCE**

62, Rue de la Tour — PARIS (16<sup>e</sup>)

## ARTHRI-SEL

Traitement hydro-minéral de régime de toutes les affections arthritiques. Diurétique léger n'occasionnant jamais d'irritation rénale.

**Indications.** — Rhumatisme chronique, Goutte, Gravelle, Cystite, Lithiase hépatique ou rénale. Insuffisance urinaire.

**Composition.** — Citrate de lithine, Citrate de soude, Sulfate de soude.

**Dose et mode d'emploi.** — Un paquet chaque jour, dissous dans un litre d'eau. Se prend comme une eau minérale.

Chaque boîte contient 20 sachets.

**J. BOILLOT & Co**

9, rue Saint-Paul — PARIS

## ARTHRITOSE

Médicament-type de l'Arthritisme

**Composition et propriétés.** — Fluorure de sodium (*excite la nutrition ralentie*) Benzoate de lithine (*active les sécrétions biliaires et urinaires*) Urotropine (*aseptise les conduits excréteurs*) Lysaric B. carb. sodique benzoaté (*alcalinise l'hyperacidité organique des arthritiques*).

**Indications.** — Manifestations de l'arthritisme et des états acidosiques.

**Forme.** — Granulé soluble dans l'eau sans effervescence, sans dégagement d'acide carbonique, sans formation de tartres qui occasionnent toujours une augmentation de l'acidité organique contraire à la cure de désintoxication.

**Mode d'Emploi et Doses.** — Une cuillerée à café dans un peu d'eau ordinaire, d'Evian, de Vichy, de Vittel, etc. ou dans une infusion. Matin à jeun et soir en se couchant. — En cas de crise : 3 ou 4 cuillerées à café par jour. Une cuillerée à café dans un litre d'eau de table comme boisson ordinaire des arthritiques.

Prix réglementé : 7 fr. le flacon  
(impôt : 0,80 en plus)

Remise sur commandes médicales : 40 %, franco de port et d'emballage.

**Laboratoires "LA BIOMARINE"**

DIEPPE (Seine-Inférieure)

## ASCIATINE

Trigémine des **" Usines du Rhône "**

Analgésique (douleurs dentaires)

Hypnotique (insomnies dues à la fièvre,  
à la douleur, etc.)

Antinévralgique (névralgies faciales,  
stomacales, intercostales, sciatiques).

Comprimés dosés à 0 gr. 25 (de 1 à 3  
comprimés).

**Laboratoires des Produits**

**" USINES DU RHONE "**

21, Rue Jean-Goujon — PARIS (8<sup>e</sup>)

---

## ASCOLÉINE RIVIER

Il a été démontré par l'analyse chimique qu'une cuillerée à café ou cinq comprimés (doses moyennes) d'ASCOLÉINE RIVIER équivalent à un demi litre de la meilleure huile de foie de morue.

Il a été démontré également que " L'ASCOLÉINE RIVIER " contient les Vitamines A et B.

" L'ASCOLÉINE RIVIER " se présente sous trois formes : en "huile" (sans goût désagréable) pour les adultes en comprimés (véritables bonbons) pour les enfants en ampoules injectables (action très rapide). Elle remplace l'huile de foie de morue dans tous les cas.

Toutes Pharmacies ou à défaut chez

**Henri RIVIER, Pharmacien**

26-28, rue Saint-Claude — PARIS

## ATONOS

(Eugénate d'Hexaméthyl, éthyl-tétramine)

**Forme.** — Cachets de 0gr.50 centigrammes.

**Indications.** — Toutes Pyohémies, surtout affections à gonocoques et staphylocoques (blennorrhagies, blennorrhées, cystites purulentes, prostatites purulentes, orchites gonococciques).

**Dose.** — Trois à quatre cachets par jour.

**Durée du traitement.** — De trois à six jours selon les cas.

Littérature et échantillons gratuits  
au Corps médical.

**Raymond CUISINE, Pharmacien**

1, Rue de Strasbourg — ASNIÈRES

---

## ATOPHAN CRUET

Acide phénylquinolique<sup>3</sup>, — carbonique<sup>4</sup>  
Produit chimique pur. N'est pas un mélange  
de médicaments.

**Forme.** — Cachets dosés à 0,50.

**Prop. Thér.** — Goutte et rhumatismes articulaires. Manifestations arthritiques.

**Dose.** — 1 à 4 gr. par 24 heures dans les cas aigus. 1 gr. par 24 heures pendant 20 jours, dans les cas chroniques.

**Mode d'emploi.** — Pendant les repas, si le malade se nourrit, et à intervalles réguliers. Accompagner l'emploi du médicament de boissons abondantes et alcalines.

**Robert CRUET, Docteur en Médecine**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe

13, rue des Minimes — PARIS

## ATURAL

Produit physiologique antiprésurant, inoffensif, évite la fatigue due au travail mécanique de l'estomac, en empêchant la formation du caillot de caséine ; facilite, pour le nourrisson, comme pour l'adulte, la digestion du lait de vache qu'il "maternise".

Ne communique aucun goût au lait.

**Dose.** — 1 mesure pour 100 grammes de lait, (1 tasse) froid ou légèrement tiède.

Littérature sur demande.

**Etablissements POULENC Frères**

92, rue Vieille-du-Temple. — PARIS

---

## AZUFROL

**Description.** — 1° Capsules kératinisées contenant 0 gr. 10 de soufre colloïdal sec, en flacons de 60 capsules ; 2° Pommade à 1/15 avec, comme excipients vaseline et lanoline, en tubes d'étain de 45 grammes (usage externe).

**Action Thérapeutique.** — Permet l'absorption du soufre colloïdal sous forme agréable, en évitant l'altération du soufre par le milieu acide de l'estomac, à des doses exactes et de conservation indéfinie.

**Indications.** — 1° Capsules : 4 à 12 par jour contre le rhumatisme chronique, les arthrites, l'aené, la séborrhée, la bronchite chronique, le saturnisme. Pour le traitement intensif, y adjoindre les injections de sulfuration (voir plus loin).

2° Pommade : Toutes affections cutanées justifiables du soufre.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**

18, Avenue Hoche. — PARIS

## BACTIOXYNE

(Manganate double de calcium et de potassium)

### Traitement de la Tuberculose

La *Bactioxyne* est une solution saline de Manganèse, de Calcium et de Potassium.

Chacun de ces composants fait partie intégrante de l'organisme humain.

La *Bactioxyne* agit en tant que :

- 1<sup>o</sup> Oxydant catalytique,
- 2<sup>o</sup> Réminéralisateur énergétique,
- 3<sup>o</sup> Agent bactériolytique.

### Indications :

La *Bactioxyne* s'emploie en :

#### INSTILLATIONS RECTALES.

En moyenne : 3 séries de 20 instillations.

Repos 20 jours entre deux séries.

La technique des instillations est très simple (goutte à goutte), les résultats sont plus lents mais aussi sûrs que par la voie veineuse.

La voie rectale est la voie de choix pour les enfants, les tuberculeux graves, les malades à système veineux superficiel peu développé.

#### INJECTIONS INTRAVEINEUSES.

Traitement 40 à 50 injections en 3 séries de 15, repos de 20 jours entre chaque série.

#### INJECTIONS INTRATRACHÉALES.

1 ampoule de *Bactioxyne* intraveineuse dans 10 cc. d'huile d'amande douce.

Littérature et échantillons sur demande.

**Laboratoire des  
USINES CHIMIQUES DU PECQ  
39, Rue Cambon — PARIS**



## BALSAMOL LESCÈNE

**Composition.** — Drosera Scillitine-Chloro-cinnamates.

**Forme.** — Plus fluide et moins sucré qu'un sirop.

**Propriétés.** — Plus calmant, plus antispasmodique que le BROMOFORME, les composés forméniques et les narcotiques.

Antiseptique des voies respiratoires.

**Indications.** — COQUELUCHE, toux spasmodiques, laryngées, toux émétisante des tuberculeux, asthme.

**Doses.** — *Enfants* de plus de 6 mois : 3 à 10 cuillerées à café par jour selon l'âge.

*Adultes* : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour.

**Laboratoires L. LESCÈNE**

à LIVAROT (Calvados)

## BAUME DURET

Dermatothérapie

Créé et employé à l'Hôpital Saint-Louis de Paris

**Formule.** — Goudron de norvège, huile de cade vraie, soufre dissous, borate de soude, résorcine, gaiacol, menthol, en combinaison avec le camphre et en dissolution dans l'acétone.

**Propriétés.** — Antiseptiques, vaso-constrictives, analgésiques et antiprurigineuses.

**Mode d'emploi.** — Enduire les parties malades au moyen d'un tampon d'ouate hydrophile dans le cas de lésions; autrement, frictions avec le doigt deux ou trois fois par jour. Le **Baume Duret** est le spécifique des affections cutanées en général et spécialement des PRURITS.

Il n'est ni irritant ni toxique.

**Laboratoire de Dermatologie E. VENDEL**

61, rue de Vaugirard — PARIS

## BEATOL

**Prop. Thér.** — Sédatif nerveux, Hypnotique.

**Indications.** — Insomnies, Affections aiguës et chroniques, Intoxications, Maladies nerveuses ou mentales.

1<sup>re</sup> Forme : Ampoules.

**Composition :**

Diéthylmalonylurée .....	0 gr. 25
Bromhydrate de scopolamine .....	1/4 de mgr.
Soluté de valériane .....	2 cm <sup>3</sup>

**Mode d'emploi.** — Le contenu d'une ampoule injecté sous la peau.

2<sup>re</sup> Forme : Liquide.

**Composition :**

Diéthylmalonylurée .....	0 gr. 18
Valériane stabilisée Q. P. ....	5 cm <sup>3</sup>
Extrait de jusquiame .....	0 gr. 015

**Mode d'emploi.** — 1 à 4 cuill. à café dans de l'eau sucrée après le repas du soir, une heure avant le coucher.

3<sup>re</sup> Forme : Comprimés.

**Composition :**

Diéthylmalonylurée .....	0 gr. 18
Extrait de valériane .....	0 gr. 10
Extrait de jusquiame .....	0 gr. 02

**Mode d'emploi.** — 1 à 3 comprimés pris avec de l'eau ou une infusion chaude dans l'intervalle des repas.

**Laboratoire de Bio-Chimie Appliquée**

21, rue Théodore-de-Banville, 21

PARIS (17<sup>e</sup>)

## BETUL-OL MIDY

(Méthyl oléo salicylate comp.)

*Liniment* pour l'usage externe, parfaitement absorbé par la peau.

**Compos.** — Menthol et chloral en solution dans de l'essence de Bétula-Lenta obtenue par fermentation et distillation (salicylate de méthyle naturel).

**Mode d'emploi.** — Imprégner largement un morceau de flanelle, l'appliquer sur la partie douloureuse, recouvrir de taffetas gommé. Renouveler l'application plusieurs fois par jour.

L'absorption du *Betul-Ol* se fait si rapidement par la peau, que dix minutes après on peut déceler dans l'urine la présence de l'acide salicylique.

**Prop. Thér.** — Calme rapidement les douleurs aiguës de la goutte et du rhumatisme.

**Indications.** — Lumbago, sciatiqnes, douleurs des articulations, névralgies.

Détail : 140, Faub. Saint-Honoré. — PARIS

**Laboratoires MIDY**

9, Rue du Commandant-Rivière. — PARIS (8<sup>e</sup>)

## BI-IODURAL NOVAT

Iodure de potassium 0,25, bi-iodure de mercure 0,005 et alcalin pour neutraliser q. s.

**Forme.** — Comprimés, très discrets, bien tolérés, sans iodisme, ni pyrosis, car les acides iodiques et iodhydriques sont neutralisés dès leur formation.

**Ind. Thér.** — Syphilis. Toutes maladies de la peau.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 par jour à la fin des repas.

**Laboratoires L. NOVAT**

à MACON (Saône - & - Loire)

# BI-IODURE DE MERCURE MIDY

## INDOLORE

Selon la formule présentée à la *Société de Thérapeutique*, le 8 Novembre 1905.

Ampoules de 2 cm<sup>3</sup> de solution aqueuse de Hg I<sup>2</sup> à 1 % ; chaque cm<sup>3</sup> = 0, 1 egr. de Hg I<sup>2</sup>.

### Composition :

Hg I <sup>2</sup> ...	0,01
Na I.....	0,01
Subcutine.....	0,005
Eau stérilisée.....	1 cm <sup>3</sup>

Cette solution anesthésique ne précipite pas le sérum, ne coagule pas les albuminoïdes, supprime les indurations.

**Doses.** — Chez l'adulte, série de 10 à 20 injections de 1 ou 2 egr.; chez l'enfant, 1 ou 2 mgr. par année d'âge (série de 5).

**Mode d'emploi.** — Injections profondément intramusculaires dans le tiers supérieur de la fesse, le malade étant étendu.

Détail : 140, Faub. Saint-Honoré. — PARIS (8<sup>e</sup>)

### Laboratoires MIDY

9, Rue du Commandant-Rivière. -- PARIS (8<sup>e</sup>)

# BI-IODURE SOUFFRON

Iodure de potassium et Bi-iodure de mercure  
KI + Hg. I<sup>2</sup>. — Chimiquement purs. — Titrés. — Inaltérables.

## Pas d'iodisme

Solution (Iodure de potassium, 1 gr. + Bi-iodure de mercure 0,01) par cuil. à potage.

Dragées (Iodure de potassium 0 gr. 25 + Bi-iodure de mercure 0,0025) chaque.

Gouttes Bi-iodurées (simples), une goutte contient 1 mgr. Hg I<sup>2</sup>.

Ampoules Bi-iodurées aqueuses ou huileuses, 0,004 mgr., 0,01 et 0,02 Hg I<sup>2</sup>.

Ampoules rigoureusement titrées et stérilisées.

Indic. thér. — Maladies de la peau, syphilis.

## Etablissements Albert BUISSON

157, rue de Sèvres — PARIS

## BILEYL FOURNIER

Sels biliaires

(extraits de la bile de bœuf)

**Forme.** — Globules glutinisés (digestion intestinale).

**Dose.** — 4 à 8 globules par jour, à prendre vers la fin du repas, par 2 ou 3.

**Indications.** — 1<sup>o</sup> Les causes d'arrêt d'excrétion : lithiase, compressions, ictères subaigus et chroniques par rétention.

2<sup>o</sup> Les cas d'insuffisance biliaire : cholémie familiale, entérocolite muco-membraneuse.

Le flacon de 60 globules : 6 fr.

**Laboratoires FOURNIER Frères**

26, Boulevard de l'Hôpital — PARIS

---

## BIOCALCOSE CHEVRETIN

Granulé organo-calcaïque

Granulé brun, soluble dans l'eau. Outre une grande quantité de chaux, contient encore du phosphore, de la potasse, de la soude, de la magnésie, du fluor, de la silice, etc., dans les proportions de l'organisme sain.

**Prop. thér.** — Recalcification de l'organisme.

**Indications.** — Tuberculose, croissance, rachitisme, neurasthénie, dentition, diabète, grossesse.

**Dose et Mode d'emploi.** — 1 à 2 cuill. à café jusqu'à 8 ans, 3 à 4 au-dessus de cet âge et chez les adultes. À prendre dans un peu d'eau sucrée au milieu des repas.

**Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE**

5, rue Ballu — PARIS — Tél. Central 45-56

## **BIOLACTYL FOURNIER**

Symbiose de deux ferments lactiques  
orientaux sélectionnés

### **Usage médical :**

1° Culture en bouillon :

En boîtes de 10 fl., pour adultes.

La boîte : 16 fr.

En boîtes de 2 fl., pour nourrissons.

La boîte : 4 fr.

En boîtes de 6 tubes (pour le caillage  
du lait).

La boîte : 4 fr.

2° Culture sèche; boîtes de 60 comprimés (4 à 6 par jour).

La boîte : 6 fr.

**Indications.** — Traitement des putréfactions intestinales et de l'auto-intoxication digestive.

### **Usage chirurgical :**

1° Culture liquide, en boîtes de 6 tubes.

La boîte : 4 fr.

2° Culture sèche en poudre.

La boîte : 4 fr.

**Indications.** — Pansements des plaies infectées, escharres, vaginites, cystite tuberculeuse, affections nasales et laryngées, pyorrhée alvéolo-dentaire.

**Laboratoires FOURNIER Frères**

26, boulevard de l'Hôpital — PARIS

## BIOGÉNOL DEMASLES

A base de glycéroarséniate de chaux, nouveau sel, absolument assimilable, donnant des résultats lorsque les anciens sels d'arsenic (méthylarsinates, cacodylates, liqueur de Fowler, etc.) ont échoué.

**GRANULÉ** contenant par cuillerée à café :

Glycéroarséniate de chaux .....	0,01
— phosphate — .....	0,50

1 cuillerée à café avant les deux repas.

**LIQUIDE**: même composition que le granulé, mais indiqué particulièrement pour combattre l'apathie nerveuse des neurasthéniques.

1 verre à liqueur avant les deux repas.

**RELÈVEMENT RAPIDE DES MOYENS  
DE DÉFENSE DE L'ORGANISME**

**Laboratoire DEMASLES**  
VIENNE (Isère)

## BIONÉOL

Reconstituant d'ordre général

Composition :	Par cachet ou cuillerée à soupe
Strychnine.....	1/2 milligr.
Acide nucléinique..	6 centigr.
Arrhéнал.....	3 centigr.
Glycérophosphates.....	15 centigr.

**Prop. therap.** — Reconstituant d'ordre général.

**Indic. therap.** — Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Scrofule, Tuberculose, Neurasthénie, Paludisme, Troubles de la nutrition, Croissance et Puberté.

**Posologie.** — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe ou 1 cachet après les deux principaux repas.

*Enfants* : Selon l'âge 2 à 6 cuillerées à soupe par jour, prises après les repas.

Echantillons et littérature, sur demande.

**Laboratoire du BIONÉOL**

Emile FUSADE, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe

Ex-interne des Hôpitaux de Paris

30, Rue de la Loi — LIMOGES (Téléph. 7-88)

## BIOPHORINE GIRARD

Kola Glycéro-Phosphatée

*Granulé* à base de Kola, Glycérophosphate de chaux, Quinquina et Cacao vanillé.

**Dose et mode d'emploi.** — 2 à 3 cuill. à café par jour que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

**Prop. Thér.** — *Tonique du système nerveux, facilite l'effort musculaire.*

**Indications.** — Surmenage, Vertiges, Anémie cérébrale, Névralgies rebelles, Névroses.

6 fr. le flacon

**A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia — PARIS**

---

## BISMUTH DESLEAUX

**Composition.** — Carbonate de bismuth chimiquement pur, amorphe, obtenu par un procédé de fabrication spécial assurant son adhérence parfaite à la muqueuse. Sucre et aromatisé.

**Action.** — Pansement bismuthé idéal de la muqueuse gastro-intestinale, le bismuth étant avant tout dans les affections de l'estomac le médicament de la douleur (Prof. Hayem). — Met à l'abri des accidents provoqués par le sous-nitrate (nitrites). Supérieur aux produits de substitution (kaolin, talc), goût agréable, facilement absorbé par les malades les plus difficiles.

**Indications.** — Ulcères, Gastropathies, Hyperchlorhydries, Sténoses pyloriques, gastro-entérites, Oxyuriose, etc.

**Posologie.** — (Chaque flacon porte un couvercle-mesure dont le contenu correspond à environ 10 gr. de carbonate de bismuth chimiquement pur.) — 10 à 30 gr. par jour suivant les cas, soit le matin à jeun, soit fractionnés 1/2 heure avant chaque repas, dans eau, lait ou tisane — Oxyures : Adultes, 20 gr. par jour, en 2 fois, à jeun. Enfants, 4 à 8 gr. par jour, en 2 fois, à jeun, selon l'âge, dans un verre d'eau tiède. — Une cure de 3 jours suffit habituellement, une deuxième cure peut paraître utile, une troisième est rarement nécessaire.

Fournisseur des Hôpitaux de Paris et Province

**Pharmacie LANCOSME**

71, Avenue Victor-Hugues III — PARIS (8<sup>e</sup>)



# BLÉDINE JACQUEMAIRE

**Composition.** — Aliment rigoureusement complet, tant par sa teneur en albuminoïdes, graisses et hydrates de carbone, que par les éléments minéraux et *facteurs de croissance* (vitamines) extraits de la périphérie du grain de blé (recherches expérimentales effectuées sous la direction de MM. les Prof. Morel et Mouriquant au Lab. de Chimie organique et de tox. de la Faculté de Lyon, de mai 1919 à juillet 1920).

**Propriétés.** — Entièrement digestible et assimilable par les enfants dès le premier âge. Complément nécessaire du lait dans l'allaitement artificiel.

**Indications.** — Facilite la digestion du lait. Favorise la croissance et la dentition (*Rachitisme*). Prépare et facilite le sevrage. Régularise d'une façon remarquable les fonctions digestives (*Diarrhées, Constipation, Gastro-entérites*); désodorise les selles en modifiant rapidement la flore intestinale.

**Particularités.** — Ni cacaotée, ni lactée, ni maltée, ni torrifiée, ni étuvée et sans addition d'aucun produit pharmaceutique, la Blédine se conserve d'une façon parfaite, en boîte de fer-blanc hermétiques, sans modification de goût, ni d'odeur, ni de composition.

**Doses.** — Du 1<sup>er</sup> au 4<sup>me</sup> mois : 1/2 à 1 cuillerée à café par biberon. Du 5<sup>me</sup> au 6<sup>me</sup> mois : 1 1/2 à 2 cuillerées à café par biberon. A partir du 7<sup>me</sup> mois : 1 cuillerée à soupe par repas ; 1 1/2 à 2 pour les adultes.

**Nota.** — La Blédine peut se préparer à l'eau. Dans ce cas, doubler les quantités ci-dessus.

Etablissements JACQUEMAIRE

M. MIGUET, Docteur en Pharmacie  
VILLEFRANCHE (Rhône)

## BOLDO GMET

Extrait total du " Boldo Fragrans "

Préparation liquide, *sans Alcool* correspondant à 2 gr. de plante par cuill. à café.

**Doses et Mode d'emploi.** — *Adultes* : 1 à 4 cuill. à café par jour. *Enfants* : 1/2 dose, à prendre par cuill. à café dans un peu d'eau ou de tisane après chacun des principaux repas.

**Prop. Thér.** — Cholagogue. Laxatif.

**Indications.** — Jaunisse, Collaque hépatique, Cirrhoses, Insuffisance biliaire, Cholécystites et toutes les affections hépatiques.

Littérature et échantillons sur demande faite au service médical des

### Produits GMET

27, Rue du Faub. Montmartre — PARIS (9<sup>e</sup>)

Tél. Bergère 43.10

---

## BOLEASE MONAL

**Forme.** — Globules glutinisées.

**Comp.** — Bile et boldo, extraits complets et inaltérables.

**Dose.** — 4 à 6 globules par jour.

**Action.** — Cholagogue, toni-hépatique, anti-toxique et sédative.

**Indications.** — Troubles biliaires et hépatiques. *Affections hépatiques* : lithiasse, ictères, congestions, cholémie, cirrhoses. *Affections intestinales* : entérites muco-membraneuses, constipation, auto-intoxications.

**Laboratoires MONAL & C<sup>ie</sup>**

6, rue Daubigny, PARIS

# BROMÉINE MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

**Propriétés.** — Action sédative et analgésique, particulièrement puissante, sans brutalité par suite de l'union des qualités calmantes du Brome et de la Codéine.

Très efficace contre l'élément douleur, sans accoutumance et moins toxique que la plupart des sédatifs.

**Indications.** — Insomnies, Névralgies, Névrites, Toux nerveuses.

**Formes Pharmaceutiques.** — *Ampones* dosées à 0,02 egr. — *Pilules* : 0,01 egr. par pilule. Dose : 2 à 8 pilules par jour. — *Sirop* : 0,03 par cuill. à soupe. Dose : 1 à 3 cuill. par jour. — *Gouttes* : X gouttes = 0,01 de Broméine crist. Dose : X à XXX gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée.

## Laboratoire MONTAGU

49, Boulevard de Port-Royal — PARIS

# BROMIASE

**Description.** — Capsules kératinisées contenant :

Bromure de potassium.....	0 gr. 30
Bromure d'ammonium.....	0 gr. 20
Levurine extractive.....	0 gr. 10

en fl. de 50 capsules.

**Action thérapeutique.** — La même que celle des bromures, mais sans bromisme grâce à l'action spécifique de la levurine et à l'enrobage de kératine qui ne libère les bromures que dans le milieu alcalin de l'intestin. Préparation de dosage rigoureux, de conservation indéfinie, et ne répugnant pas au malade.

**Indications.** — 2 à 12 capsules par jour dans l'épilepsie, la chorée, l'hystérie, les névroses, les vomissements de la grossesse.

## Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS

## BROMOGÉNOL PÉPIN

Peptone bromée spéciale  
(Voir l'étude sur l'Iodogénol)

**Forme.** — Gouttes.

**Dose et mode d'emploi.** — 20 gouttes de Bromogénol Pépin = 0 gr. 50 de Bromures métalliques, à prendre dans un peu d'eau ou d'infusion aromatique. Renouveler plusieurs fois.

**Prop. thér.** — Médication bromurée très énergique avec un faible poids de brome. Goût agréable. Tolérance parfaite. Préférable aux sirops bromurés et polybromurés.

**Indications.** — Toutes celles des Bromures métalliques : affections du système nerveux, insomnie, hystérie, convulsions, épilepsie, névralgies, etc.

**PÉPIN & LÉBOUCQ**

à COURBÉVOIE (Seine)

## BROMONE ROBIN

Combinaison physiologique de Brome et de peptone de viande de bœuf.

Gouttes dont 40 = 1 gr. de bromure de potassium.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 20 à 50 gouttes. *Enfants* : 10 à 20 gouttes.

A prendre en deux fois aux principaux repas dans un peu de boisson.

**Prop. thér.** — Non toxique, très assimilable. Ne fatigue pas le tube digestif. Pas de bromisme. Tolérance parfaite. Aucun mauvais goût.

**Indications.** — Excitabilité nerveuse, troubles de la femme, fatigues cérébrales, insomnie des vieillards, convulsions des enfants, hystérie, épilepsie.

**Laboratoires M. ROBIN**

12, rue de Poissy — PARIS

# BROMURE DE CAMPHRE CLIN

Camphre monobromé

**Compos.** — Camphre monobromé  $C_{10}H_{15}BrO$ . Contient 34, 80 % de brome à l'état dissimulé. Le procédé de fabrication industrielle, dû au Dr Clin, donne un produit pur et bien cristallisé. (Académie des Sciences, août 1875).

**Formes.** — 1<sup>re</sup> *Capsules du Dr Clin au bromure de camphre*, enrobées au gluten, à 0 gr. 20 par capsule,

2<sup>re</sup> *Dragées du Dr Clin au bromure de camphre* à 0 gr. 10 par dragée.

3<sup>re</sup> *Tubes stérilisés Clin au bromure de camphre*, dosés à 0 gr. 05 et 0 gr. 10 par cm<sup>2</sup>.

**Doses.** — Commencer par 2 capsules ou 4 dragées par jour en augmentant progressivement jusqu'à 5 capsules ou 10 dragées. Diminuer ensuite jusqu'à la dose initiale. Interruption de 8 jours et reprise du même traitement. On peut donner le bromure de camphre jusqu'à 4-gr. par jour chez l'adulte. Par voie hypodermique : 5 à 10 mgr. par jour.

**Laboratoires CLIN**

20, rue des Fossés-St-Jacques — PARIS

## BROMURES SOUFFRON

Bromure de Potassium (KBr) - Bromure de Sodium (NaBr)

Chimiquement purs - Titrés et inaltérables

Pas de Bromisme

**Solution** à 2/15. Une cuill. à potage contient 2 gr. KBr ou NaBr.

**Sirop** à 2/20. Une cuill. à potage contient 2 gr. KBr ou NaBr.

**Dose et mode d'emploi.** — De 0 gr. 25 egr. à 4 gr. par jour et plus.

**Prop. Thér.** — Antinervin.

**Indications.** — Affections nerveuses, insomnie, chorée, épilepsie, hystérie, névrose.

**Etablissements Albert BUISSON**

157, Rue de Sèvres — PARIS

## BULGARINE THÉPÉNIER

Culture pure de Ferments lactiques bulgares  
sur milieu végétal

**Forme.** — Bouillon, comprimés et poudre

**Indic. Thér.** — Entérite muco-membraneuse, gastro-entérite (des nourrissons et de l'adulte); Diathèse goutteuse, Constipation, Diarrhée, Entérite tuberculeuse, Infections hépatiques (d'origine intestinale), Dysenterie, Dermatoses, Furunculoses, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde et du choléra.  
*Poudre* Rhinites, ozènes, stomatites, pansement des plaies.

**Modes d'emploi.** — Adultes : Sucrer deux comprimés ou boire un verre à moitié de Bouillon, une demi-heure avant le repas.  
Enfants : Demi-dose.

Saupoudrer, insuffler ou priser la Poudre.

Laboratoire des Ferments A. THÉPÉNIER  
12, Rue Clapeyron — PARIS

## CACHETS " ROCHE "

### DE THIOCOL

1 Cachet " Roche " de Thiocol = 0,50 egr. Thiocol " Roche ".

1 gr. Thiocol " Roche " = 0,52 egr. gaïacol cristallisé.

**Doses et mode d'emploi.** — 2 à 6 par jour et plus.

**Prop. Thér.** — Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène, Eupeptique et Orexique.

**Indic. Thér.** — Toutes les affections broncho-pulmonaires, Rhumes, Bronchites, Grippe, Tuberculose, Coqueluche, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites, etc.

**Avis très important.** — Pour éviter toute substitution inactive ou même toxique, bien spécifier toujours :

CACHETS " ROCHE " de Thiocol

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>  
21, Place des Vosges — PARIS

## CACODYLO-PHOSPHATE VITAL DE JACQUEMAIRE

Association synergique de cacodylates et glycérophosphates très purs (voir *Phosphate vital*), dont la tolérance est toujours parfaite et l'efficacité maximum.

**Formes et Doses.** — (En boîtes de 10 ampoules pour injections hypodermiques) :

Cacodylo-Phosphate vital de chaux  
Cacodylo-Phosphate vital de soude  
ou Cacodylo-Phosphate vital de fer,

1 à 2 injections de 1 cme par jour.

**Propriétés.** — Le Cacodylo-Phosphate vital à base de chaux ou à base de soude constitue un puissant arsenico-tonique — Le Cacodylo-Phosphate vital de fer réalise la médication hématogène par excellence (réunion de l'arsenic cytogène, du fer hémoglobino-gène, et du Phosphate vital, stimulant de la nutrition et des échanges physiologiques).

**Indications.** — Contre toutes les formes de la faiblesse et de l'épuisement.

**Établissements JACQUEMAIRE**  
**M. MIGUET, Docteur en Pharmacie**  
**VILLEFRANCHE (Rhône)**

## CALCÉOSE

**Traitement de Recalcification (Méthode de Ferrier).** La Calcéose est le seul produit recalcifiant préparé suivant les indications de Ferrier.

**Indications.** — Tuberculose, Grossesse, Allaitement, Croissance, Rachitisme, Neurasthénie.

**Composition.** — Sels de chaux combinés au Maltose. Cette combinaison est reconnue comme le plus assimilable des sels de chaux.

**Dose et mode d'emploi.** — 6 comprimés par jour (ou 6 mesures de poudre). Pour les enfants, 4 comprimés ou 4 mesures.

Chaque boîte contient 100 comprimés

**J. BOILLOT & C<sup>ie</sup>**  
9, Rue Saint-Paul — PARIS

## CALCILINE

Formule : Ph. de Chaux tri... ..	0,35
Carbonate de Chaux .....	0,07
Fl. de Calcium .....	0,005

**Forme unique.** — Comprimé à désagrégation immédiate dans l'eau.

**Dose.** — 2 comprimés avant chaque repas. Enfants demi-dose.

**Propriétés.** — Recalcifiant type en raison de sa composition : Phosphate, Carbonate, Fluorure de Calcium.

**Indications.** — Anémie, Scrofule, Chlorose, Lymphatisme, Tuberculose pulmonaire, osseuse, ganglionnaire, Croissance, Adénites, Maladies des Os, Diabète, Grossesse, Carie Dentaire. Convalescence.

Aucune contre indication.

Laboratoire de la "CALCILINE"

ODINOT, Pharmacien

25, Rue Vaneau — PARIS

## CAPSULES DARTOIS

Composées de créosote de hêtre véritable, titrée en Galacol, à la dose de 0,05 egr. dissoute dans 0,20 egr. d'huile de foie de morue garantie d'origine.

**Dose.** — Commencer par une ou deux capsules pour arriver progressivement à la dose moyenne et généralement suffisante de 3 à 4 à chaque repas ou matin et soir dans une tasse de lait ou de tisane.

**Propriétés.** — Se dissolvant lentement dans l'intestin, répandent le produit actif sur une grande surface, divisent la créosote à l'infini et multiplient son action antiseptique sans jamais amener de troubles digestifs.

**Indications.** — Toux, Catarrhes, Bronchites chroniques, Tuberculose, etc.

Laboratoire FREYSSINGE

6, Rue Abel — PARIS



## CAPSULES DE MORRHUÏNE PUY

à l'extract complet d'Huile de Foie de Morue  
supériodé

Dosées à 2 milligr. d'Iode combiné par capsule

Elles représentent chacune 5 grammes d'huile de foie de morue débarrassée de l'oléine et margarine indigestes.

L'extract complet d'huile de foie de morue obtenu dans nos laboratoires par un procédé spécial breveté, contient réellement tous les acides gras, le brome, l'iode, le phosphore, la lécithine, principes actifs de l'huile de foie de morue.

Maladies du système lymphatique, Ralentissement des fonctions lymphoïdes, Scrofule, Engorgements ganglionnaires, Adénopathie, Arthritisme, Scléroses, Cachexie, Rachitisme.

Doses. — Enfants de 6 à 17 ans 2 à 6 capsules; Adultes 18 ans et au-dessus 6 à 10 capsules, avant manger.

**Laboratoire PUY**  
à GRENOBLE (Isère)

## CATHIODE

Iode fixé par le charbon par phénomène  
d'adsorption

**Forme.** — Comprimés représentant thérapeutiquement 0,20 d'iodure de potassium sans phénomènes d'iodisme et d'intolérance.

**Prop. thérap.** — Métal ferment, aseptise l'intestin, active la circulation du sang, régularise les fonctions vitales des cellules. Maladies diathésiques, rhumatismes, goutte, obésité, artério sclérose, varices, troubles de la circulation, asthme, emphysème, lymphatisme, syphilis.

**Mode d'emploi.** — 2 à 5 comprimés avant chaque repas.

**Laboratoires Pierre BRISSON & C<sup>ie</sup>**  
118, rue du Mont-Cenis — PARIS

# CASCARA LIQUIDE ALEXANDRE

(Elixir laxatif contre la constipation)

**Propriétés théráp.** — Excitant modéré du péristaltisme intestinal. Ni drastique, ni cathartique. N'irrite pas et ne donne aucune colique. Elle jouit d'un pouvoir émollogue considérable et cette action est d'autant plus utile pour combattre la constipation que la bile est un excitant du péristaltisme intestinal. Elle possède aussi l'heureuse propriété de réveiller la contractilité de la fibre musculaire intestinale sous l'exagérer, amenant ainsi une évacuation quasi physiologique des matières. Toutes ces qualités réunies recommandent tout particulièrement la précieuse écorce (écorce sucrée), car, pour nombreux que soient les laxatifs, il n'en est aucun qui, comme la Cascara, présente un ensemble aussi complet de qualités sans aucun des inconvénients des purgatifs ordinaires.

**Possologie** — La dose habituelle est de 1 petite cuillerée à café pour les enfants, au dîner et au coucher, et de 1 à 2 cuillerées à café pour les grandes personnes. Dans les constipations rebelles, on peut aller jusqu'à la cuillerée à soupe.

**Pharmacie ALEXANDRE**  
41, rue de Rome — PARIS

## CASCARA MIDY

à base de Cascara Sagrada naturel, complet et épuré, mais non dénaturé par des manipulations chimiques.

*Pilules dosées à :*

- 1- 0,12 mgr. d'extrait hydro-alcoolique de Cascara Sagrada contenant les dérivés oxyméthyl-anthraquinoniques, à l'exclusion des résines drastiques et de l'huile essentielle.
- 2- 0,10 mgr. de poudre sélectionnée de *Rhamnus purshianus*.

**Dose et mode d'emploi.** — 2 à 3 pilules le soir au dîner, après 15 jours espacer les doses.

**Prop. Thér.** - Laxatif doux et à effet constant, ni irritant, ni drastique.

**Indications.** — Constipation habituelle et ses troubles, peut être prescrite aux femmes enceintes et aux nourrices.

Détail : 140, Faub. Saint-Honoré, PARIS

**Laboratoires MIDY**

9, Rue du Commandant Rivière — PARIS (8<sup>e</sup>)

## CASCARINE LEPRINCE

$C^{12} H^{10} O^5$

**Indic. thér.** — Constipation habituelle, Affections du foie, Constipation dans la grossesse, l'allaitement, etc.

Cholagogue puis Copragogue de tout premier ordre.

**Doses et mode d'emploi.** — Pilules à 0,10 : 1 ou 2 Pilules le soir au coucher, ou aux repas si la constipation est d'origine digestive.

**Docteur M. LEPRINCE**

62, Rue de la Tour — PARIS (16<sup>e</sup>)

---

## CHARBON TISSOT

(Grains anisés de)

**Forme.** — Charbon de peuplier aggloméré au gluten mucogène, aromatisé à l'anis, très légèrement additionné de benzo-naphtol. Le mode d'agglomération en gros grains glutinisés en fait la meilleure forme d'administration du charbon de peuplier en même temps que la plus agréable.

**Indication.** — Dyspepsie, Gastralgie, Flatulence, Digestions difficiles, Nausées, Hoquet, Renvoi, Embarras et Fermentation intestinales.

**Dose.** — 1 cuill. à café soit après chaque repas, soit le soir en se couchant ce qui suffit habituellement.

**Nota.** — Avaler comme des graines de lin avec une gorgée d'eau, si possible.

**Laboratoire du Docteur TISSOT**

34, Boulevard de Clichy — PARIS

## CHELOÏDINE

Pommade résolutive et calmante  
à base de Thiosinanine, salicylate de  
soude et stovaine.

Dépourvu de toute toxicité.

**Indic. thérap.** — Traitement du rhumatisme chronique, des cicatrices vicieuses et douloureuses, des scléroses.

**Mode d'emploi.** — Deux fois par jour, appliquer, gros comme une noisette, sur la surface malade et faire suivre d'un massage léger.

**Laboratoire A.-P. BROCADET**

89, Rue du Commerce — PARIS

Téléph. Saxe 52-47

---

## CHLORAMINE

Sodium-paratoluène-sulfo-chloramine

**Forme.** — Pilules.

**Compos.** — Chloramine T 0 gr. 05,  
Charbon de peuplier pulvérisé 0 gr. 10,  
Enrobage de gluten recouvert d'un  
enduit inattaquable par le suc gastrique.

**Indic. Thér.** — Toutes infections de l'intestin : Dysenteries, Entérites, Paratyphoïdes, etc.

**Posologie.** — 2 à 6 pilules par jour au commencement des principaux repas.

**Laboratoire FREYSSINGE**

6, Rue Abel — PARIS

## CHLOROBYL

### Composition :

Tochlorine.....	0 gr. 05
Bile purifiée.....	0 gr. 10
Charbon.....	0 gr. 10

**Forme.** — En comprimés de 0 gr. 25.

**Prop. Thér.** — Désinfection intestinale.

**Indications.** — Entérite, Dysenterie, Affections cutanées.

**Mode d'emploi.** — 2 à 6 comprimés par jour avant les repas.

**Laboratoire de Bio-Chimie Appliquée**

21, rue Théodore-de-Banville, 21

PARIS (17<sup>e</sup>)

---

Si le "DICTIONNAIRE DE SPÉ-  
CIALITÉS PHARMACEUTIQUES"  
vous rend des services, engagez les  
Pharmaciens Spécialistes à y souscrire,  
ce qui nous permettra de le perfec-  
tionner et d'en augmenter le tirage.

## CHLORO-CALCION

**Forme :**

Gouttes.

**Composition :**

Solution titrée de *Chlorure de calcium* chimiquement pur, stabilisé. 40 gouttes = 1 gr.  $\text{Ca Cl}^2$ .

**Dose :**

20 à 40 gouttes matin et soir dans de l'eau sucrée.

**Action :**

*Chloro-Calcion* est le *récalcifiant* physiologique type. La solution de  $\text{Ca Cl}^2$ , directement assimilable, n'utilise pas l'H Cl du suc gastrique trop souvent déficitaire chez les tuberculeux. Il ménage donc la puissance digestive de l'estomac.

La présence en quantité suffisante de calcium dans le sang est un des facteurs essentiels de la coagulation (Carnot).

*Chloro-Calcion* apporte au sérum la chaux qui lui manque. C'est l'*Hémostatique de choix*.

**Indications :**

*Récalcifiant.* Lymphatisme, Prétuberculose, Croissance, Rachitisme, Carie dentaire, Allaitement, Fractures.

*Hémostatique.* Toutes hémorragies, hémophilie, maladies du sang, anémies et chlorose.

**MICHELS**, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe  
22, Rue des Bernardins — PARIS

# CHLOROFORME

**LAMBIOTTE Frères**

## ANESTHÉSIQUE

### Forme :

Ampoules de 30 et 50 gr.

La fabrication du chloroforme est des plus complexes et doit fixer d'une façon toute spéciale l'attention du fabricant.

Toutes les observations des Maîtres ont été scrupuleusement observées dans la préparation du *Chloroforme Lambiotte Frères*.

Il est chimiquement pur, dans les meilleures conditions de conservation parce qu'il répond aux quatre conditions suivantes :

- 1<sup>o</sup> Un bon procédé de fabrication ;
- 2<sup>o</sup> Une rectification par des appareils perfectionnés ;
- 3<sup>o</sup> Une purification conforme au Codex ;
- 4<sup>o</sup> Un conditionnement irréprochable.

**Laboratoires LAMBIOTTE Frères**

3, Rue d'Edimbourg, 3

PARIS

## CHOLÉINE CAMUS

Extrait inaltérable de fiel de bœuf,  
dosées à 0 gr. 20

**Dose et mode d'emploi.** — 4 à 6 capsules  
par jour, deux à la fin de chaque  
repas.

**Prop. théér.** — Opothérapie biliaire.

**Indications.** - Lithiase Biliaire, Coliques  
Hépatiques, Ictère, Cholémic, Cons-  
tipation, Entéro-Colites, Dyspepsie,  
Auto-Intoxication.

### CHOLÉINE CAMUS

13, rue Pavée — PARIS (4<sup>e</sup>)

---

## CHOLÉITOIRES BYLA

Suppositoires de glycérine solidifiée  
à base d'extrait de bile.

**Dose et mode d'emploi :**

Un suppositoire en cas de besoin.

**Propriétés thérapeutiques :**

Exonérant d'action douce et certaine  
par excitation du péristaltisme intes-  
tinal.

**Indications :**

Constipation des enfants, des malades  
alités (accouchées, opérés). Constipa-  
tion chronique.

**Les Etablissements BYLA**

26, Avenue de l'Observatoire — PARIS



## CHOLÉLYSE

A base d'acide oléique chimiquement pur

Spécifique et préventif de la Colique hépatique et de la Lithiase biliaire.

**Forme.** — Capsules contenant 50 cgr. d'acide oléique chimiquement pur.

**Mode d'emploi.** — La Cholélyse en capsules exactement dosées à 0 gr. 50 d'Acide oléique, se prend le matin à jeun, pendant 10 jours par mois par mesure préventive dans les cas de coliques mensuelles, ou pendant 20 jours aux grands changements de saison.

En cas de crise, on prend deux ou trois capsules d'un coup, dose qu'on peut renouveler un peu plus tard.

**L. CARBOU**, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe  
8, rue Jean-du-Bellay — PARIS

## CHOLÉOBOLDINE THEVENOT

**Compos.** — Pilules (enrobées au gluten) à base d'extract de boldo et d'extract de fiel de bœuf purifié et concentré dans le vide.

**Propriétés.** — Cholagogue très puissant légèrement laxatif, légèrement antiseptique.

**Indications.** — Retension biliaire, coliques hépatiques, congestion du foie, insuffisance hépatique. Ce sont là des indications qui découlent immédiatement de la composition de la *Choléoboldine*. En dehors de ces cas, on la prescrit avec succès dans certains cas de constipation opiniâtre, de dermatoses liées à des troubles hépatiques.

**Dose.** — 2 à 3 pilules à chacun des grands repas.

Produit fabriqué

par la Société des Produits Pharmaceutiques THEVENOT - Dijon

**PRIX :** le flacon de 50 pilules 5 fr.

Echantillons sur demande.

## CHOLÉOKINASE

Extrait spécial de fiel de bœuf et de kinase  
Dragées ovoïdes kératinisées dosées  
à 0 gr. 25 d'extrait

**Doses et mode d'emploi.** — 6 à 12-ovoïdes par jour en 3 doses égales : à la fin du déjeuner, à la fin du dîner, le soir en se couchant. Ces doses peuvent même être doublées au début du traitement.

**Prop. Thér.** — Active les sécrétions biliaire et pancréatique, améliore la digestion duodénale.

**Indications.** — Spécifique de l'entérocolite muco-membraneuse.

**Laboratoires DURET & RÉMY**

5, Avenue des Tilleuls — PARIS (18<sup>e</sup>)

## CHOLÉO-LACTOL

Formule du D<sup>r</sup> L.-G. Mary

Extrait biliaires totaux.....	0,65
Ferments lactiques amylacés.....	0,10
Pancréatine.....	0,05
pour un comprimé chocolaté	

**Dose et mode d'emploi.** — 1<sup>o</sup> Affections gastro-intestinales : Adultes : 6 à 8 par jour, entre les repas. Enfants : 2 à 4 par jour.

2<sup>o</sup> Affections hépatiques : 12 à 16 comprimés par jour.

**Prop. Thér.** — Antitoxique de l'Intestin, Régulateur de la sécrétion biliaire.

**Indications.** — Toutes infections intestinales et auto-intoxications consécutives. — Diarrhées infantiles et estivales. — Affections hépatiques provenant de l'insuffisance biliaire.

**Contre-indications.** — Néant.

**Etablissements DAGUIN**

SAINT-MAUR (Seine)

## CHOLERGINE

Médication Antitoxique, Colloïdes et Lipoides

Principes définis du foie et de la bile de taureau dissous dans l'huile végétale.

*Société de Thérapeutique (Janvier 1911)*

*Académie de Médecine (Avril 1911)*

*Académie des Sciences (Juin 1911)*

**Forme.** — Ampoules injectables de 2 cm<sup>3</sup>.

**Mode d'emploi.** — Injections dans la fosse retro-trochantérienne. Enfoncer l'aiguille à 3/4 de profondeur et injecter très lentement. Piqûre indolore, 20 à 30 injections avec arrêt de 5 à 10 jours entre chaque dizaine. Léger massage après piqûre.

**Prop.** — Antitoxique, antibacillaire et dynamogénique. — Tuberculose, Insuffisance hépatique. — Convalescence des maladies infectieuses.

Préparation sans similaires ni équivalents, employée journellement dans les hôpitaux.

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**

8, rue de la Source, PARIS (16<sup>e</sup>)

Téléph. : Aut. 06.02

## CIGARETTES ESPIC

**Compos.** — A base de belladone, stramoine, jusquiame et phellandrie.

**Mode d'emploi.** — Allumer une cigarette dès le début d'une crise d'oppression et en aspirer profondément la fumée.

## POUDRE ESPIC

**Compos.** — A base de belladone, stramoine, jusquiame, phellandrie, eucalyptus et sels minéraux.

**Mode d'emploi.** — En faire un petit cône dans une soucoupe, allumer et aspirer la fumée.

**ROUTIER, Pharmacien**

20, rue Saint-Lazare — PARIS

## CLONAZONE DAUFRESNE

Antiseptique organique chloré  
non toxique

Généralisation de la méthode **Carrel-Dakin**

### Composition :

Comprimés dosés à 0 gr. 25 de chlora-  
mine sodique pure et stable.

### Indications :

Gynécologie et toutes infections locales :  
angines, abcès, plaies infectées, ... et  
comme agent prophylactique en temps  
d'épidémie : grippe, fièvre typhoïde...

### Posologie :

*UN comprimé par verre d'eau* : pour  
gargarismes, pansements humides des  
plaies, lavages dans les affections de  
la gorge, du nez, des oreilles, ...

*DEUX comprimés par litre d'eau* : pour  
lavages de la vessie et dans toutes les  
affections de l'appareil génito-urinaire  
de l'homme et de la femme.

### Avantages :

Action antiseptique puissante (*100 fois  
plus actif que le formol*), absence de  
causticité, innocuité absolue.

Flacon de 60 comprimés : 6 fr.

Tube de poche : 2 fr.

Echantillons médicaux sur demande

Laboratoire des ANTISEPTIQUES CHLORÉS

40, Rue Thiers — LE HAVRE

## COCAÏNE MIDY

(Chloroborates)

Chaque pastille contient :

0,002 mgr. de Chlorhydrate de Cocaïne.

0,05 egr. de Chlorure de Potasse.

0,05 egr. de Biborate de Soude.

**Dose et mode d'emploi.** — Laisser fondre dans la bouche 10 à 12 pastilles par jour, 4 à 8 aux enfants selon l'âge.

**Prop. Thér.** — Anesthésique local, antiseptique modificateur.

**Indications.** — Affections de la bouche, gorge, larynx ; Pharyngites, Laryngites aiguës et chroniques, Granulations, Angines, Amygdalites, Toux nerveuses, Picotements et Chatouillements de la gorge.

Détail : 140, Faub. Saint-Honoré, PARIS

**Laboratoires MIDY**

9, Rue du Commandant-Rivière — PARIS (8<sup>e</sup>)

## COCCIDAL GRÉMY

Nouvel agent antigonococcique

En tubes d'étain de 3 c. c. pour injections uréthrales. — En ampoules de 10 c. c. pour instillations uréthrales. — En ampoules de 30 c. c. pour lavages de la vessie.

**Mode d'emploi.** — Injections uréthrales : injecter, une seule fois par jour, le contenu d'un tube en étain (l'injection se fait en introduisant directement dans le canal l'extrémité effilée du tube, percée préalablement à l'aide d'une épingle). — Instillations uréthrales : puiser le liquide directement dans l'ampoule, sans le diluer. — Lavages de la vessie : diluer le contenu de l'ampoule dans un litre d'eau *distillée*.

**Prop. thér.** — Antigonococcique puissant, non irritant, à action extrêmement rapide.

**Indications.** — Blennorrhagie aiguë : préventif, abortif, curatif à la période d'état. — Gonococcies ascendantes : remplace avec avantage le nitrate d'argent pour les instillations et les lavages de la vessie.

14, Rue de Clichy — PARIS (9<sup>e</sup>)



C

## CODOFORME

**Compos.** — Nouveau sel bromoformique solide défini et stable, ce qui permet de le présenter en comprimés dosimétriques. Ceux-ci étant enrobés libèrent lentement dans l'intestin une quantité rigoureusement constante de bromoforme chimiquement pur. Combiné à la codéine avec du benzoate de soude terpiné comme excipient le Codoforme constitue une association synergique qui permet d'obtenir, sans la moindre crainte d'accident, vu les faibles doses utilisées : (*0 gr. 01 de codéine et 3 gouttes de bromoforme par comprimé*), une action sédative puissante sur les centres tussigènes, avec analgésie des muqueuses des voies respiratoires et fluidification des sécrétions bronchiques.

**Avantages.** — En plus de la sécurité et la certitude d'action de ce mode d'emploi original du bromoforme, médicalement trop méconnu parce qu'il ne pouvait être utilisé jusqu'alors qu'en préparations liquides dangereuses ou irritantes, les comprimés de Codoforme sont agréables, faciles à prendre et sans effet nauséeux. Ne se dissolvant que dans l'intestin, ils ne provoquent sur l'estomac ni intolérance, ni fatigue, ni perte d'appétit.

**Indications.** — Toutes les Toux rebelles, spasmodiques, coqueluchoides. Action tout à fait spéciale sur la toux des tuberculeux dans ses différentes modalités, auxquels il permet repos et sommeil, sans fatigue stomacale : Toux d'habitude, Toux émétissante, Toux spasmodique laryngée. Trachéo-Bronchite, Toux catarrhale et emphysemateuse, Toux des diabétiques (médicament sans sucre).

**Doses.** — Enfants de 2 à 10 ans : 2 comprimés fractionnés, au-dessus de 10 ans : 3 à 5 comprimés par 24 heures. — Adultes : Dose initiale de début, 5 comprimés : 1 avant chacun des 3 repas et 2 en se couchant. Dans les toux rebelles et anciennes : 5 comprimés dans la journée, 2 ou 3 dans la nuit.

Ces comprimés étant en dragées lenticulaires seront pris comme une pilule sans sucer ni croquer dans une gorgée de liquide ou une ingestion de lait et autant que possible avant les repas. Pour les enfants difficiles, broyer le comprimé dans du miel, de la confiture ou du lait.

Prix du flacon de 20 comprimés 8 fr., impôt compris

**Laboratoires du NÉOL**

**H. BOTTU Directeur**

**9, Rue Dupuytren — PARIS (6<sup>e</sup>)**

(Téléph. Fleurus 13-12)

## COLCHI-SAL MIDY

(Colchicine — Ess. de Wintergreen)

Chaque capsule contient :

1<sup>o</sup> de mgr. colchicine pure dissoute dans 0,20 egr. Salicylate de Méthyle naturel (Ess. de Wintergreen) obtenu par fermentation et distillation et équivalent à 0,23 egr. Salicylate de Soude.

**Dose.** — 4 à 16 capsules par jour par prises fractionnées.

**Prop. Thér. de l'Ess. de Wintergreen**

1<sup>o</sup> Augmente l'élimination de l'acide urique et des autres éléments solides de l'urine. — 2<sup>o</sup> Calme la douleur. — 3<sup>o</sup> Liquéfie et augmente la sécrétion biliaire. — 4<sup>o</sup> Légèrement diurétique. — 5<sup>o</sup> Diaphorétique. — 6<sup>o</sup> Diminue la fièvre. — 7<sup>o</sup> Combat la congestion et facilite la résolution des inflammations (G. Sée). — 8<sup>o</sup> Action antiseptique sur le sang.

**de la Colchicine**

1<sup>o</sup> Diminue la production d'acide urique. — 2<sup>o</sup> Augmente rapidement l'élimination de tous les produits brûlés et pousse à l'oxydation. — 3<sup>o</sup> Soulage la douleur. — 4<sup>o</sup> Augmente la sécrétion biliaire. — 5<sup>o</sup> Légèrement diurétique. — 6<sup>o</sup> Diaphorétique. — 7<sup>o</sup> Purgatif.

Détail : 140, Faubourg Saint-Honoré — PARIS

**Laboratoires MIDY**

9, Rue du Commandant-Rivière — PARIS (8<sup>e</sup>)

## COLLOTHIOL

**Composition.** — Soufre colloïdal chimique, se présentant sous l'aspect d'un liquide jaunâtre, à diachisme plus ou moins accentué selon la concentration du liquide.

Le Collothiol contient le soufre à l'état pur, c'est-à-dire soigneusement débarrassé de toutes traces de composés sulfurés et de gaz sulfhydrique. Il montre à l'ultramicroscopie un très grand nombre de grains fins réguliers extrêmement mobiles.

**Formes.** — 1<sup>o</sup> Elixir au Collothiol, dosé à 0 gr. 20 de soufre colloïdal pur par cuill. à soupe. — 2<sup>o</sup> Ampoules de Collothiol de 2 cc. dosées à 1 pour 1000. — 3<sup>o</sup> Pommade au Collothiol dosée à 5 gr. pour 100.

**Propriétés.** — Le Collothiol permet d'administrer le soufre à son plus grand état de division dans les affections suivantes : 1<sup>o</sup> Dans les maladies des voies respiratoires ; 2<sup>o</sup> Dans les affections cutanées ; 3<sup>o</sup> Dans le rhumatisme chronique ; et en général dans les indications habituelles de la médication sulfurée.

**Doses.** — 1<sup>o</sup> Elixir : 2 cuill. à café à 2 cuill. à soupe par jour prises au début du repas et augmentant progressivement les doses ; 2<sup>o</sup> Ampoules : Une injection quotidienne pendant plusieurs jours en séries coupées de quelques intervalles de repos ; 3<sup>o</sup> Pommade : Onctions de 10 à 20 gr. chaque jour à la surface des lésions.

**Laboratoires CLIN**

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

## COLLOÏDES

Les Laboratoires Clin préparent un certain nombre de corps à l'état colloïdal utilisés en thérapeutique. Les principaux de ces Colloïdes sont : l'**Electrargol** (argent), l'**Electrauror** (or), l'**Electroplatinol** (platine), l'**Electropalladiol** (palladium), l'**Electrorhodiol** (rhodium), l'**Electriridiol** (iridium), l'**Electr-Hg** (mercure), l'**Electromartiol** (fer), l'**Electrocuprol** (cuivre), l'**Electrosélénium** (sélénium), l'**Electromanganol** (manganèse), le **Collothiol** (soufre), l'**Ioglysol** (complexe d'iode-glycogène), l'**Arrhénomartiol** (complexe de fer colloïdal et d'arsenic organique), etc., etc.

Ces colloïdes sont à grains idéalement fins. Leur titre en métal ou métalloïde est le plus élevé que comporte chaque préparation. Ils sont stériles, stables, de conservation indéfinie, et soigneusement rendus isotoniques.

Les métaux colloïdaux possèdent des propriétés générales qui leur sont communes; leur injection produit une suractivité des échanges nutritifs, une importante réaction phagocytaire, une stimulation des fonctions hématopoïétiques. Ils ont le pouvoir d'exalter les moyens de défense naturels de l'organisme et favorisent la destruction et l'élimination des toxines microbiennes.

Quelques-uns ont en outre des applications particulières: l'**Electr-Hg** est employé dans les manifestations syphilitiques; l'**Electromartiol**, dans le syndrome anémique; l'**Electrocuprol** et l'**Electrosélénium** dans les tumeurs cancéreuses; le **Collothiol** dans le rhumatisme et certaines affections des voies respiratoires, etc.

**Nota.** — Pour l'action particulière de chacun de ces colloïdes voir leur fiche spéciale.

**Laboratoires CLIN**

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS



## COLLUBORINE DUPUY

Traitements des affections de la Cavité  
Buccale et des maladies de la gorge

**Forme.** — Collutoire stérilisé et gargarisme aseptique renfermés dans un tube.

**Composition.** — Borate de soude neutre per-oxygéné-Résorcine et chlorate de potasse.

**Avantages.** — Préparation de conservation indéfinie. Remplit le double rôle de Collutoire et de Gargarisme. Efficacité constante, toujours aseptique étant à l'abri de l'air, des poussières, de la lumière. *Ne peut pas être contaminé par le pinceau* comme le sont habituellement les Collutoires. Amène en trois jours la chute de la fièvre et la disparition des symptômes douloureux.

**Indications.** — Stomatites diverses : Erytémateuse, Aphteuse, Muguet, Mercurielle. — Angines aiguës : Catarrhale, Phlegmoneuse, Herpétique, etc. — Amygdalites : Pharyngite chronique, Syphilis bucco-pharyngée.

**Mode d'emploi.** — A. En pressant sur le tube, imprégner de Colluborine le coton fixé à l'extrémité d'un porte tampon et badigeonner la gorge comme avec un Collutoire.

B. En pressant sur le tube, une cuill. à café dissoute dans un verre d'eau chaude donne instantanément un Gargarisme.

Laboratoire de Thérapeutique des Voies Digestives

J. LAUMONIER, Pharmacien-Directeur

225, Rue Saint-Martin — PARIS

## COMPOSÉ GMET

Extrait total de Kola, Coca, Quinquina  
Préparation liquide *sans Alcool*

**Doses et mode d'emploi.** — 1 à 10 cuill.  
à café par jour (dans les cas graves  
1 cuill. à café toutes les 2 heures) dans  
eau, vin, bière, etc. avant ou entre  
les repas.

**Prop. Thér.** — Toni-stimulant à effet  
*durable. Ne constipe pas.*

**Indications.** — Anémie, Surmenage,  
Grossesses, Convalescences, Gripes,  
Neurasthénie, Mélancolie.

Littérature et échantillons sur demande au

**Service Médical des Produits GMET**

27, Faubourg Montmartre — PARIS (9<sup>e</sup>)

Tél. Bergère 43.10

## COMPRIMÉS GUILLAUMIN

à l'oxyeyanure d'hydrargyre

**Composition.** — Comprimés d'oxyeyanure d'hy-  
drargyre dosés à 0 gr. 50.

**Propriétés.** — Ces comprimés sont très solubles  
dans l'eau avec laquelle ils donnent une solu-  
tion très limpide, d'un pouvoir antiseptique  
élevé, très bien tolérée par les mains et les  
muqueuses et n'attaquent pas les instruments.

**Indications.** — S'emploient avec succès en gyné-  
cologie et en obstétrique, dans les maladies des  
voies génito-urinaires (métrite, fluxus blanches,  
vaginite, urétrite, blennorrhagie), dans le pan-  
sement des plaies, enfin comme antiseptique  
en général.

**Mode d'emploi.** — Faire dissoudre un comprimé  
dans un ou deux litres d'eau. La dissolution  
s'effectue en quelques secondes si on a soin  
d'écraser le comprimé dans l'eau entre les doigts.

**Laboratoires André GUILLAUMIN**

13, Rue du Cherche-Midi — PARIS

## COMPRIMÉS " ROCHE "

### DE THIOCOL

1 comprimé " Roche " de Thiocol = 0,50 egr. Thiocol " Roche ".

1 gr. Thiocol " Roche " = 0,52 egr. galacol cristallisé.

**Doses et mode d'emploi.** — 2 à 6 par jour et plus.

**Prop. Thér.** — Antiseptique pulmonaire, Phagoeytogène, Eupeptique et Orexique.

**Indic. Thér.** — Toutes les affections broncho-pulmonaires, rhumes, bronchites, grippe, tuberculose, coqueluche, rachitisme, dyspepsies, entérites, etc.

**Avis très important.** — Pour éviter toute substitution inactive ou même toxique, bien spécifier toujours :

*Comprimés " Roche " de Thiocol*

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**  
21, Place des Vosges — PARIS

## CONDURANGO GMET

Extrait total de Condurango Gonolobus

Préparation liquide sans Alcool correspondant à 2 gr. de plante par cuill. à café.

**Doses et Mode d'emploi.** — 1 à 4 et 6 cuill. à café par jour dans un peu d'eau, avant ou entre les repas.

**Prop. Thér.** — Sédatif viscéral, Tonique amer.

**Indications.** — Gastralgies, Ulcères, Douleurs des cancéreux ou des syphilitiques.

Littérature et échantillons sur demande au

**Service Médical des Produits GMET**  
27, Faubourg Montmartre — PARIS (9<sup>e</sup>)

Tél. Bergère 43.10

## CORÉINE

Mucilage rigoureusement pur, sans l'adjonction d'aucune substance laxative.

Produit exclusivement végétal.

(Procédé Taillandier)

La Coréine n'est pas de l'agar-agar.

La Coréine n'est pas de la gélose.

C'est du mucilage pur.

**Propriété unique.** — Absorbe et retient 40 à 50 fois son poids d'eau.

**Indications.** — Constipation simple Colite muqueuse, Colite muco-membraneuse

La Coréine constitue un traitement remarquable, souvent le seul, de la constipation et de certaines formes diarrhéiques.

**Forme.** — Granulé et Paillettes.

**Bibliographie.** — Pathologie gastro-intestinale, A. Mathieu et J.-C. Roux, etc.

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**

8, Rue de la Source. — PARIS (16<sup>e</sup>)

Téléphone : Aut. 06-02

## COSMARGYRE THÉVENOT

**Compos.** — Combinaison d'oxyde mercurique avec une matière organique iodée. Le médicament est présenté sous forme de comprimés dénués de saveur métallique et renfermant 0.03 de cosmargyre.

**Equivalence therap.** — Le Cosmargyre renferme sensiblement 1/6 de son poids d'iodure mercurique (allié à un excès d'iode négligeable au point de vue thérapeutique).

**Dose.** — D'après son équivalence en iodure mercurique, chaque comprimé de cosmargyre équivaut lui-même à une demi-cuillerée à bouche de sirop de Gibert. Le praticien se basera donc sur cette indication très simple pour prescrire le médicament.

**Avantages.** — Le mercure est parfaitement dissimulé dans le Cosmargyre Thévenot. L'intolérance gastrique est supprimée. On peut donc faire bénéficier de la médication spécifique les malades peu tolérants ou bien soumettre à une cure intensive un malade quelconque en ne lui imposant que le minimum d'inconvénients.

Prix du flacon de 60 comprimés 9.00, impôt compris.

Envoi d'échantillons sur demande

Fabrique par la

**Société des Produits Pharmaceutiques Thévenot**  
DIJON

## CRÉOSOFORME LAMBIOTTE Frères

Poudre jaune verdâtre, inodore, insipide, non toxique, contenant 96 % de créosote, 4 % d'aldéhyde formique.

**Dose et Mode d'emploi.** — *A l'extérieur* : S'emploie comme l'iodoforme mais étant donné son innocuité, on peut en user à très fortes doses. — *A l'intérieur* : Adultes : 3 à 5 gr. par jour; enfants : 1 à 2 gr. par jour. Prescrire en cachets, dans du lait, de la viande, etc.

**Prop. Thé.** — Au contact des cellules vivantes, il se décompose graduellement en créosote et aldéhyde formique à l'état naissant qui déterminent l'asepsie complète des plaies et leur rapide cicatrisation, c'est un puissant antiseptique intestinal.

**Indications.** — Tuberculoses chirurgicales, ulcères, brûlures, engelures, lupus, lèpre, infections intestinales.

Littérature et échantillons :

**Produits LAMBIOTTE Frères**

3, Rue d'Edimbourg — PARIS (8<sup>e</sup>)

Téléphone Wagram 14-73

---

Nous vous serons reconnaissants de nous faire connaître les modifications que vous jugerez utiles d'apporter à cet ouvrage.

## CURATOXINE VENDEL

Saccharolé soluble <sup>®</sup>

Dépuratif-iodé, Antiurique,

Antoxémique

Antisceptique général interne

**Formule.** — Iodo-tormentille glycérophosphatée, Sucs végétaux dépuratifs, Urotrolithine (Héxaméthylène tétramine benzo-lithinée).

**Action.** — Neutralise chimiquement les poisons de l'organisme.

Stimule l'activité rénale, hépatique et intestinale. Dissout l'acide urique.

Arrête les fermentations putrides.

Régularise l'élimination des déchets morbides et Toxines endogènes.

Et décharge ainsi la peau d'une fonction émonctoriale anormale et nocive.

**Applications.** — La Curatoxine Vendel constitue la véritable cure de Désintoxication et le traitement interne et général des Dermatoses d'origine infectieuse : Eczémas, Impétigo, Acnès, Erythème toxique, Furunculose, Folliculites, Urticaires, etc.

**Posologie.** — Une cuillerée à dessert matin et soir dans un verre d'eau.

Laboratoire de Dermatologie

E. VENDEL

61, Rue de Vaugirard — PARIS

# DERMO-PLASTOL DUMESNIL

(Plastols Dumesnil)

Formé avec le *Zébo-Plastol* et le *Crémo-Plastol*, le groupe des Plastols Dumesnil, pâtes poreuses composées, très homogènes et destinées à être appliquées sur la peau à la manière des pommades dans toutes les dermatoses d'origine digestive et dont le type est l'eczéma sous toutes ses formes.

**Propriétés.** — Le Dermo-Plastol calme immédiatement les démangeaisons et assure la réparation intégrale des tissus malades.

**Indications.** — *Les Plastols* peuvent être appliqués sur toutes les parties du corps ou des membres : eczémas de la vulve ou du rectum, psoriasis, parakératoses psoriasiformes de Brocq, eczémas séborrhéiques de Unna, prurits avec lichenification et eczématisation, pityriasis, impetigo, prurigo, etc.

**Laboratoires DUMESNIL**

10, Rue du Plâtre — PARIS

---

## DIABÉTIFUGE

Spécialité synthétique antidiabétique  
à base de bioxyde de manganèse,  
de bicarbonate de soude,  
de chlorhydro-méthylarsinate de lithine,  
d'antipyrine, de nitrate d'urane  
et de santoline.

**Doses.** — 1 cachet, le matin et l'après-midi, avec un demi-verre d'eau minérale, Pougues de préférence. Continuer pendant 10 jours; diminuer s'il y a lieu, après analyse du sucre; cesser au bout de 20 jours. Repos de 20 jours et reprendre.

**Laboratoire des Produits SCIENTIA**

10, Rue Fromentin — PARIS

## DIAL CIBA

### Hypnotique anti-nerveux

**Comp. et Prop.** — Le Dial (diallylmalonylurée), hypnotique du groupe véronal, est doué d'une grande activité (doses faibles), rapidement éliminé, d'où réveil normal, non suivi d'hébétéude. Il est sans action sur le rein, et procure un sommeil calme et réparateur.

**Indic.** — Insomnie nerveuse en général. Insomnie des neurasthéniques, des agités, des émotifs. Psychonévroses convulsives.

Cure de l'alcoolisme et de la morphinomanie. Tétanos. Etats démentiels avec agitation.

**Posologie et Formes pharm.** — 0 gr. 10 à 0 gr. 20 à prendre 15 ou 20 minutes avant le moment présumé de l'insomnie; au coucher pour les insomnies du soir, au réveil pour celles du cours de la nuit.

Comprimés dosés à 0 gr. 10

Prix :

Le tube de 12 comprimés, 3 fr.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**

1, Place Morand — LYON



## DIALACETINE CIBA

Sédatif, Antipyrétique, Analgésique

**Compos. et propr.** — Diallylmalonylurée plus éther allylique du paracétaminophénol. Action sédative, analgésique et antipyrétique permettant d'instituer une thérapeutique efficace et sûre dans l'ensemble des cas où l'irritabilité nerveuse compte parmi les symptômes dominants.

**Indications.** — Agitation et délire au cours des maladies aiguës. Epilepsie, hystérie. Névroses diverses. Névralgies, lumbago, etc.

**Posologie et formes pharm.** — Dose sédative antipyrétique : 1 à 3 comprimés par 24 heures, par 1/2 ou 1 comprimé, avec intervalle de 2 à 5 heures. Dose hypnotique et analgésique : 1/2 à 1 comprimé au maximum.

Comprimés dosés à 0 gr. 35.

Prix : le tube de 15 comprimés 5 fr.

---

## DIALYL

Dissolvant urique

Spécialement préparé par le Laboratoire Alph. Brunot dont il est la propriété exclusive.

**Indications.** — Médicament-type de l'arthritique et du rhumatisant. Diathèse urique : Rhumatismes, Goutte, Sciatique, Névralgies, Migraines, Lumbago, Gravelle, Calculs, Urines rouges, Coliques néphrétiques, Dermatoses, Surmenage physique ou intellectuel.

**Forme.** — Granulé.

**Posologie.** — Deux cuillerées à café par jour, chaque cuillerée dans un peu d'eau, entre les principaux repas. — Dans les crises aiguës, 4 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix au public : 7 fr. le flacon.

**Laboratoire Alph. BRUNOT**

16, rue de Boulainvilliers — PARIS

(Téléphone : Auteuil 20-21)

## DIASTÉNINE GRÉMY

Principes actifs totaux de la glande  
interstitielle du testicule

Pilules. — Gouttes. — Ampoules.

**Doses et mode d'emploi.** — 5 ou 6 pilules  
par jour aux repas. — 30 à 40 gouttes, deux  
fois par jour aux repas, dans un peu de  
vin rouge. — Une injection intramusculaire  
tous les deux ou trois jours.

**Prop. thér.** — Invigoration générale de  
l'organisme.

**Indications.** — Insuffisance testiculaire,  
faiblesse musculaire et nerveuse, neuras-  
thénic, troubles de croissance, sénilité  
précoce. Lorsqu'aux signes d'insuffisance  
testiculaire s'ajoutent ceux du neuro-  
arthritisme, il est indiqué d'associer la  
*Diasténine* et la *Thyrénine*.

14, Rue de Clichy — PARIS (9<sup>e</sup>)

---

## DIDIAL CIBA

Hypnotique analgésique

**Comp. et Propr.** — Obtenu par combinaison de  
la diallylmalonylurée (Dial) avec l'éthyl-  
morphine, le Didial joint à une action sopori-  
fique une action analgésique marquée.

**Indications.** — Toutes les insomnies relevant de  
la douleur : névralgies, traumatismes, tabés,  
cancers, etc. Agitation maniaque, excitation  
psychique. calmant pré et post-anesthésique.

**Posologie et formes pharm.** — 1 à 3 comprimés  
à 0 gr. 10 par jour, à prendre le soir dans les  
cas d'insomnie dus à la douleur ; par doses  
refractées, aux repas dans les autres cas.

Comprimés dosés à 0 gr. 10.

Prix : le tube de 15 comprimés, 5 fr.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, place Morand — LYON

## DIGALÈNE " ROCHE "

Digitale injectable

Tous les principes actifs de la macération de feuilles fraîches de digitale solubilisés et injectables.

**Posologie et Mode d'emploi :**

Ampoules, Solution, Comprimés.

1 cc., ou XXX gouttes, ou 2 comprimés  
= 0,15 mgr. poudre feuilles de digitale.

Doses très faibles ou d'entretien cardiotonique.

Adultes : XX gouttes. — Enfants : 1 à X gouttes (voies buccale ou rectale).

Doses faibles ou sédatives.

Adultes : XXX à LX gouttes (voies buccale ou rectale); 2 à 4 comprimés (voie buccale); 1 à 2 cc. (voie intramusculaire indolore. — Enfants : V à XV gouttes, selon l'âge.

Doses fortes ou antiasystoliques.

Adultes : XC à CLXXX gouttes (voies buccale ou rectale); 3 à 6 cc. (voies intramusculaire ou *endoveineuse*). — Enfants : V à XX gouttes et même 1 à 2 cc. (*cas désespérés*).

**Prop. Thér.** — Action très rapide, tolérance parfaite, pas d'accumulation.

**Indic. Thér.** — Chaque fois que le cœur faiblit.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**

21, Place des Vosges — PARIS

## DIGIFOLINE CIBA

### Préparation digitalique totale

**Composition.** — Contient sous une forme optima, l'ensemble des glucosides cardio-actifs de la feuille de digitale. Elle est stable, d'action constante, toujours bien tolérée, rigoureusement dosée.

**Indications.** — Celles de la digitaline et de la digitale, par voie buccale, hypodermique et intraveineuse.

Plus spécialement lorsque le foie est gros (ampoules), lorsqu'il y a lieu de stimuler la diurèse, et lorsque l'on redoute l'accumulation.

**Posologie.** — Celle de la poudre de feuille de digitale à laquelle elle correspond poids pour poids.

**Formes pharmaceutiques.** — Comprimés de 0 gr. 10 = 0 gr. 10 poudre de feuille. — Ampoules de 1 cm<sup>3</sup> = 0 gr. 10 poudre de feuille.

Prix :

Le tube de 25 comprimés. 5 fr.

La boîte de 5 ampoules. 6 fr.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**

1, Place Morand — LYON

## DIGITALINE CRISTALLISÉE NATIVELLE

Prix Orfila de 6000 fr. — Prix Desportes  
Décernés par l'Académie de Médecine de Paris.  
La Digitaline Nativelle agit plus sûrement  
que toutes les autres préparations de  
Digitale. Elle est employée dans tous les  
Hôpitaux de Paris.

**Indications.** — 1<sup>o</sup> Asystolie; 2<sup>o</sup> Insuffisance car-  
diaque; 3<sup>o</sup> Troubles du rythme cardiaque.

**Formes.** — *Granules* au 1/10 et au 1/4 de  
mill., le fl. 6 fr. 25. — *Solution* au 1/1000 le  
fl. 6 fr. 25. — *Ampoules* au 1/10 et au 1/4 de  
mill., la boîte 7 fr. 50.

Spécifier sur les ordonnances : **Nativelle**

Echantillons :

**Laboratoire NATIVELLE**

49, Boulevard de Port-Royal — PARIS

---

## DIGITALINE CRISTALLISÉE DE PETIT-MIALHE

Titrage chimique rigoureux :

1 c/c = 50 gouttes = 0,001 digitaline cristallisée

Effets thérapeutiques toujours identiques à  
eux-mêmes. — Effets physiologiques constans et contrôlés.

**Doses.** — Cardiotonique : 3 à 4 gouttes par  
jour. — Sédatif : 5 à 10 gouttes par jour. —  
Anti-asystolique : 50 gouttes par jour.

**Mode d'emploi.** — Dans une tasse de tisane  
en une seule fois, le matin à jeun. Le trai-  
tement est continué 2 ou 3 jours, puis sus-  
pendu pendant une durée égale et repris  
dans les mêmes conditions suivant l'effet  
obtenu.

**Pharmacie du Docteur MIALHE**

8, rue Favart — PARIS

## DIOSÉINE PRUNIER

(Comprimés Fluo-Nitrités renfermant les Glycérophosphate et Formiate Sodiques associés à la Caféine).

**Mode de Présentation.** — Présentée sous forme de pastilles comprimées pesant chacune 0,25 egr.

**Mode d'Action.** — La "Dioséine Prunier" diminue la tension artérielle et régularise la circulation du sang.

**Indications.** — Artériosclérose, Dilatations veineuses, Menstruations difficiles, Troubles de la ménopause.

**Posologie.** — 2 à 4 comprimés par jour, à prendre en deux fois, matin et soir, en les accompagnant d'une gorgée de liquide.

**G. PRUNIER & C<sup>ie</sup> (Maison Chassaing)**  
6, Rue de la Tâcherie — PARIS

---

## DIURÈNE

(Extrait total d'adonis vernalis)

**Formes.** — Liquide. — Pilules.

**Prop. Thér.** — Tonique cardiaque et diurétique azoturique. Succédané inoffensif de la digitale, agit rapidement sans accumulation et sans augmenter la tension artérielle.

**Indications.** — Indiqué dans tous les cas d'arythmie, d'asystolie, d'œdème, dans toutes les affections du foie, néphrites, artério-sclérose.

**Posologie.** — 2 à 6 cuill. à café ou 4 à 12 pilules par 24 heures.

**M. CARTERET**

15, Rue d'Argenteuil — PARIS

## DMEGON

(Vaccin antigonococcique curatif)

S'emploie en injections sous-cutanées ou intramusculaires pratiquées tous les deux jours, à toutes les périodes de la blennorrhagie; se montre efficace contre tous les accidents dus au gonocoque : orchites, rhumatisme blennorrhagique, conjonctivite purulente, vulvo-vaginite des petites filles, *affections gynécologiques*, localisations viscérales. (Voir vaccins atoxiques stabilisés).

Littérature et échantillons sur demande.

**Etablissements POULENC Frères**

92, rue Vieille-du-Temple — PARIS

---

## DMESTA

(Vaccin antistaphylococcique curatif)

Utilisé avec succès dans toutes les affections dues au staphylocoque; furoncles, anthrax, acné, sycosis, ostéomyélite, etc.

S'emploie en injections sous-cutanées ou intramusculaires, tous les deux jours.

Aucune contre-indication; ne provoque pas de réaction,

(Voir vaccins atoxiques stabilisés)

Littérature et échantillons sur demande

**Etablissements POULENC Frères**

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

## DMETYS

(Vaccin curatif de la coqueluche préparé au moyen de cultures du bacille de Bordet.)

Résultats très favorables, tant sur les quintes que sur l'état général; ne provoque aucune réaction.

S'emploie en injections sous-cutanées ou intramusculaires, tous les jours ou tous les deux jours.

(Voir vaccins atoxiques stabilisés)

**Etablissements POULENC Frères**

92, Rue Vicille-du-Temple — PARIS

---

## DRAGÉES HECQUET

(Sesqui-Bromure de Fer)

**Propriétés.** — Associent les qualités antispasmodiques du brome et l'action hématopoiétique du fer sous la forme d'un sel très assimilable ne produisant jamais de troubles digestifs ou intestinaux. Le seul ferrugineux qui réponde à cette indication :

Calmer sans affaiblir,

Reconstituer sans exciter.

**Indications.** — Chloro-Anémie, Nervosisme.

**Dose** — 4 à 6 dragées par jour.

(Se fait également sous forme de "Sirop").

**Laboratoire MONTAGU**

49, Boulevard de Port-Royal — PARIS



# DOLOMA

*Carbone fluo-phosphate Magnésien,  
Mangano-Calciqne*

Méthode des Professeurs

DUBARD & VOISENET, de Dijon.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiacide ; Antidyspeptique ; Reconstituant puissant des réserves minérales ; Névrosthénique idéal sous forme injectable, sans aucun toxique. (*Voir fiche CENOPHOS*).

**Indications.** — Dyspepsies, Entérites chroniques et tous Etats déminéralisants ; **Cancers et Tuberculoses.**

**Doses et Mode d'emploi.**

**A :** *Cure antidyspeptique* (entre et loin des repas).

Doloma	{	2 à 4 sachets de <i>Poudre</i> .
		ou
		3 à 5 cuill. à café de <b>Granulé</b> .

**B :** *Cure reminéralisante* (prendre dans la même journée) :

1<sup>o</sup> à chacun des 2 repas **Cenophos** 1 cuillerée à soupe d'*Elixir* ou 2 cuillerées à café de **Granulé**.

(*Voir fiche Cenophos fixateur.*)

2<sup>o</sup> entre et loin des repas **Doloma** 1 sachet de **Poudre** ou 1 cuill. à café de **Granulé**.

3<sup>o</sup> dans la journée **DOLOMA** injectable : Une injection par jour.

*10 jours de cure ; puis s'arrêter pendant 10 jours et reprendre.*

**Poudre** : la boîte 12 fr. (impôt compris)

**Granulé** : 14 fr. le flacon (impôt compris)

**Ampoules**, la boîte de 10 de 2 cc. : 12 fr.  
(impôt compris)

**L. GUICHARD, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe**  
2, Rue de l'Hôpital St-Louis — PARIS (10<sup>e</sup>)  
Téléphone : Nord 84-19

*Communication à l'Académie de Médecine, avril 1918.*  
*2 Communications à l'Association Française pour l'Etude du Cancer, Juin 1919 - Décembre 1920.*

# DRAGEES NÉVROSTHÉNIQUES " YSE "

à base de Phosphure Zn - Nux vomica - Kola - Guarana

Traitement scientifique des Affections nerveuses  
Puissant reconstituant de l'Élat général

Les *Dragées névrosthéniques " Yse "* constituent le traitement scientifique le plus efficace des affections du système nerveux. Ce produit est le spécifique, par excellence, de la Neurasthénie, de l'Hypochondrie, du Surmenage intellectuel, de la dépression physique et cérébrale, Amnésie, des états adynamiques et asthéniques. En tonifiant le système nerveux, les *Dragées névrosthéniques " Yse "* font disparaître rapidement les différents troubles si pénibles de la névrose : Céphalée, indécision, crainte, sensation de fatigue et d'abattement, insomnie, angoisse... En résumé, les *Dragées névrosthéniques " Yse "* fournissent au cerveau fatigué le régénérateur qui permettra d'accomplir le travail cérébral même intensif. Dès lors le malade recouvre santé et confiance en lui.

Mode d'emploi (sauf avis du médecin). — 6 dragées par jour, 2 avant chacun des 3 principaux repas.

Laboratoire " YSE "

65, rue Louis-Blanc — PARIS (X<sup>e</sup>)

## EAU DE SAINT-COLOMBAN BAINS-LES-BAINS (Vosges)

**Compos.** — Eau alcaline, sodique, silicatée, très légèrement minéralisée.

**Analyse.** —

Sulfate de soude .....	0 gr. 16
Chlorure de sodium. ....	0 gr. 163
Carbonate de chaux. ....	0 gr. 035
Carbonate de soude.....	0 gr. 013
Brome.....	0 gr. 0005
Silice.....	0 gr. 121
Oxyde de fer.....	0 gr. 002
Arsenic.....(traces très sensibles)	

0 gr. 4945

Les eaux minérales de Bains-les-Bains ont été classées au troisième rang des eaux les plus radio-actives connues (Curie et Laborde) Leur radio-activité calculée en minutes milligrammes est de 1,76.

**Action.** — Drainage rénal. Eau hypotonique, provoque l'élimination des déchets organiques et toxiques.

**Indications.** — Eau de table et de régime pour la cure de diurèse : arthritisme, artério-sclérose.

**Particularité.** — Eau légère, sans saveur marquée, agréable à boire et d'une limpidité remarquable.

## ÉLATINE BOUIN

Dérivé du sapin de Norwège (Gemme et Goudron)  
Liquide limpide et de conservation indéfinie.

**Doses et mode d'emploi.** — Se prend mélangée à du lait chaud ou tisane pectorale ou diurétique, à la dose de 2 cuill. à soupe par tasse, plusieurs fois par jour. — 1 à 2 cuill. à café pour les enfants.

**A titre préventif.** — En temps d'épidémie, et chez les sujets prédisposés aux inflammations trachéo-bronchiques, l'*Elatine* peut être prise additionnée à la boisson habituelle aux repas, à raison d'une cuill. à dessert par verre de liquide.

**Indic. thér.** — Affections des bronches (toux rebelles, catarrhes, emphysème, asthme); de la vessie et des reins (cystites, pyélites, gravelle).

Le flacon : 5 fr. 50

### Laboratoires FAGARD

44, Rue d'Aguesseau — BOULOGNE-PARIS

## ELBON CIBA

Antipyrétique pour bacillaires

**Composition et Propriétés.** — Combinaison chimique de l'acide cinnamique avec l'oxyphénylurée, corps insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et les huiles, indifférent vis à vis des réactifs acides et alcalins étendus.

C'est un antithermique doux, sans action modificatrice sur le sang, ne provoquant ni sueurs, ni collapsus.

**Indications.** — Toutes les formes de tuberculose fébrile, ouvertes ou fermées, et surtout les affections tuberculeuses à début fébrile des glandes du parenchyme et des bronches, chez l'enfant et chez l'adulte.

**Posologie et Formes pharmaceutiques.** — Comprimés de 1 gr. *Adultes* : 3 à 7 par jour. *Enfants* : 1 à 3 par jour.

Prix : Le tube de 20 comprimés, 5 fr.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**

1, Place Morand — LYON

# ELECTRARGOL

**Composition.** — Argent colloïdal électrique à petits grains, stable, d'une pureté et d'une activité supérieures à celles de l'argent colloïdal chimique.

**Applications.** — L'*Electrargol* est employé dans toutes les maladies infectieuses sans spécificité pour l'agent pathogène :

*Pneumonies, Bronchopneumonies, Tuberculose pulmonaire, Bronchites capillaires, Angines* : Injection intra-musculaire ou intra-veineuse. *Pleurésie paratuberculeuse* : Injection intra-pleurale, après ponction, de 20 à 30 cc. d'*Electrargol* et plus.

*Grippe, Rhumatismes, Endocardite, Erysipèle, Fièvre typhoïde, Typhus exanthématique, Scarlatine, Variole, Tétanos* : Injection intra-musculaire ou intra-veineuse. *Septicémie puerpérale* : Injection intra-veineuse et lavages locaux. *Choléra, Fièvre de Malte, Pemphigus aigu*, etc.

*Infections chirurgicales* : Injection intra-musculaire ou intra-veineuse. *Abscès du sein* : Injection de 5 à 10 cc. d'*Electrargol* et plus dans la cavité de l'abcès après ponction. *Arthrites suppurées* : Injections intra-articulaires, après ponction, de 5 à 20 cc. *Furoncles, Abscès, Panaris*, etc.

*Epididymites blennorrhagiques ou tuberculeuses, Cystites et Urétrites, Bubons* : Injections locales.

*Mastoidites, Otites et Otorrhées* : Injections intra-musculaires ou intra-veineuses pour traitement général. *Affections rhino-pharyngées* : Injection locale et badigeonnages.

*Conjonctivites catarrhale, blennorrhagique, trachomatique, Ophtalmie parasitaire, Ulcère infectieux de la cornée, Kératite phlycténulaire, Dacryocystites*.

**Formes.** — Ampoules de 5 cm<sup>3</sup>. — Ampoules de 10 cm<sup>3</sup>. Flacons stérilisés de 50 et 100 cm<sup>3</sup>. (Permettre spéciale.) Ampoules compte-gouttes de 10 cm<sup>3</sup> pour collyres.

**Nota.** — Pour l'*Electrargol* en ampoules, la solution qui détermine l'isotonie n'est mélangée au colloïde qu'au moment de l'empiquet.

**Doses et mode d'emploi :**

Injection intramusculaire .....	10 à 20 cc. et plus
— intraveineuse .....	5 à 15 cc. —
— intrarachidienne .....	5 à 10 cc. —
— intrapleurale .....	20 à 30 cc. —
— loco dolenti .....	ad libitum
chez l'enfant en bas-âge .....	3 à 5 cc.

**Remarque.** — D'une manière générale on se rend compte facilement que la dose administrée est suffisante lorsque l'injection provoque un abaissement de la température prévue ou non d'une réaction thermique avec frissons; cette réaction peut être violente, mais elle est de courte durée et ne doit pas alarmer. Poursuivre le traitement au delà de l'apyrexie désirée afin d'éviter une reprise de la température.

**Laboratoires CLIN**

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

## ELECTR-Hg

**Compos.** — L'Electr-Hg est un mercure colloïdal électrique à petits grains, stable, isotonique et stérile. Il se présente sous l'aspect d'un liquide gris, dichroïque, possédant à la fois les propriétés générales des colloïdes et les propriétés spécifiques du mercure.

L'Electr-Hg titre 1 pour 1000 de métal.

**Formes.** — Ampoules de 5 cc.

**Prop. Thér.** — L'Electr-Hg est employé dans tous les accidents de la syphilis. Grâce à l'état colloïdal, il est doué d'une très faible toxicité. Ses propriétés spécifiques sont notablement augmentées et mises en valeur par les propriétés dynamiques dues à l'état colloïdal.

**Doses.** — On administre l'Electr-Hg à la dose quotidienne de une à deux ampoules de 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveineuses et par voie intrarachidienne à la dose mensuelle de 1 à 3 cc.

### Laboratoires CLIN

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

---

## ELECTROCUPROL

**Compos.** — Oxyde de cuivre colloïdal à petits grains, obtenu par pulvérisation électrique. L'Electrocuprol se présente sous l'aspect d'un liquide brun clair, dichroïque, possédant toutes les propriétés générales des métaux colloïdaux, savoir : pouvoir fermentaire, catalytique, etc.

**Formes.** — Ampoules de 5 et 10 cm<sup>3</sup>.

**Applications thérapeutiques.** — L'Electrocuprol est employé dans le cancer, dans la tuberculose et dans les maladies infectieuses.

**Dose et mode d'administration.** — L'Electrocuprol est délivré en ampoules de 5 cm<sup>3</sup> et de 10 cm<sup>3</sup>. L'isotonie de la solution est assurée au moment même de l'usage. On l'injecte dans les muscles, à la dose de 5 ou 10 cm<sup>3</sup> tous les jours ou tous les deux jours, dans les veines à la dose quotidienne de 5 à 20 cm<sup>3</sup> selon l'urgence, la gravité de l'affection et la résistance du malade.

### Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

## ELECTROMARTIOL

**Compos.** — Fer colloïdal à grains très fins et uniformes obtenu par voie électrique. Se présente sous l'aspect d'un liquide brun ambré, légèrement diélectrique, titrant 1 gr. de fer p. 1000.

**Formes.** — Boîtes de 12 ampoules de 2 cm<sup>3</sup>; 6 ampoules de 5 cm<sup>3</sup>.

**Applications thérapeutiques et posologie.** — Permet de réaliser une médication ferrugineuse hypodermique ou intra-veineuse modérée. Unit aux propriétés spécifiques du fer les propriétés générales des métaux colloïdaux. Injection complètement indolore et ne déterminant jamais de nodosité. Relève rapidement le chiffre des globules rouges et la valeur globulaire; améliore la nutrition générale. Formellement indiqué dans tous les cas de syndrome anémique: anémie essentielle, chlorose (injection quotidienne de 2 cm<sup>3</sup>), anémies post-hémorragiques, anémies toxiques et anémies infectieuses (5 à 10 cm<sup>3</sup> en injection intra-veineuse tous les jours ou tous les deux jours).

**Laboratoires CLIN**

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

## ELECTROSÉLÉNIUM

**Compos.** — Sélénium colloïdal à grains ultra-microscopiques extrêmement fins et uniformes, obtenu par la voie électrique. Se présente sous l'aspect d'un liquide rouge corail, transparent, fortement trouble par réflexion.

**Formes.** — Ampoules de 5 cm<sup>3</sup>.

**Applications thérapeutiques.** — Affections cancéreuses. L'Electrosélénium a été substitué au sélénium simple à cause de sa très faible toxicité, liée à une activité remarquable. Les travaux de Cade et Girard, Girard, Bougeant et Galliot, Blumenthal, Trinkler, Szecsi, etc., ont montré que, sous l'action des injections d'Electrosélénium chez les cancéreux, on observait régulièrement la diminution, puis la disparition des douleurs, le relèvement du poids, l'amélioration de l'état général, le ramollissement des tumeurs ganglionnaires, la régression des lésions néoplasiques, et parfois leur cicatrisation, ou tout au moins la suppression des sécrétions fétides et des hémorragies.

**Posologie et mode d'administration.** — L'Electrosélénium s'administre à la dose moyenne de 5 cm<sup>3</sup> à la fois, tous les deux jours ou tous les jours suivant les cas. On peut doubler cette dose. Pour retirer du traitement tout le bénéfice possible il faut administrer le sélénium, de préférence par voie intra-veineuse.

**Laboratoires CLIN**

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

## ELIXIR DÉRET

Iodure double de Tanin et de Mercure

Solution vineuse titrée d'Iodure de Tanin et de Mercure en combinaison stable. Teneur en Iode 0 gr. 025 et en mercure 0 gr. 006 par cuillerée à soupe. Dépourvu d'arrière-goût métallique.

**Prop. Thér.** — Antisypilitique. — 1<sup>re</sup> Absence d'accidents d'hydrargyrisme, grâce à l'action spéciale du tanin. — 2<sup>e</sup> Innocuité sur les voies digestives (jamais de diarrhée). Des faits cliniques montrent l'Elixir Déret souvent toléré par des malades qui ne pouvaient antérieurement supporter un autre traitement mercuriel.

**Dosés.** — Adultes : 1 cuill. à soupe; Enfants : 1/2 à 1 cuill. à café; à prendre 2 fois par jour dans un verre gradué pour éviter le contact du médicament avec le métal de la cuillère. Ces doses peuvent être doublées.

**Nota.** — Aucune indication de la nature mercurielle de la préparation n'est faite sur l'étiquette ni sur l'enveloppe. L'Elixir Déret peut donc être pris aussi discrètement qu'on le désire.

**Laboratoires CLIN**

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

## ELIXIR DUCHAMP

Extrait de foie de morue, Quinquina,  
Cacao et Vanille

D'un goût exquis, remplace avantageusement l'huile de foie de morue. Excite l'appétit.

**Dose.** — 1 verre à liqueur (enfants, 1 cuill. à soupe), un quart d'heure avant les repas. Pur ou avec de l'eau.

**Indications.** — Toutes les affections des bronches et de la poitrine.

Prix : 10 fr. le flacon

**Comte René de GRAUWE**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe

16, Rue de Rocroy — PARIS

## ELIXIR DU D<sup>r</sup> MIALHE

A l'extrait complet de glandes Pepsiques

### Préparation :

Exclusivement avec des estomacs frais de porcs par un procédé particulier qui conserve au ferment toute son activité.

### Indication Thérapeutique :

Dans tous les cas où le suc gastrique fait défaut. Dyspepsies, douleurs nerveuses, digestions lentes et difficiles.

### Mode d'emploi :

Une cuillère à bouche *immédiatement* avant ou après les repas, 1/2 dose pour les enfants.

**Pharmacie du D<sup>r</sup> MIALHE**

8, Rue Favart — PARIS

---

## EMBRYONINE BARRÉ

Poudre d'embryons de froment

Aliment - Remède idéal, d'une richesse exceptionnelle en principes minéraux et en vitamines de céréales.

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire, mal de Pott, tumeurs blanches, etc.; anémies rebelles; rachitisme et toutes maladies par carence.

**Doses et mode d'emploi.** — Adultes : 3 fortes cuillerées à café, 3 fois par jour.

Enfants : 1 forte cuillerée à café par année d'âge et par jour.

Délayer dans lait, thé, tilleul, café, etc.

Notice et échantillon franco sur demande à

**Usine EMBRYONINE BARRÉ**

à ARGENTAN (Orne)



# ÉMULSION MARCHAIS

Phospho-Créosotée

Contenant par cuill. à café :

Créosote de hêtre.....	0,10 egr.
Baume de tolu.....	0,20 »
Glycophosphate de chaux..	0,20 »

**Dose.** — 3 à 6 cuill. à café, dans un peu de lait ou de tisane tièdes et sucrés.

**Indications.** — Toutes celles de l'Huile de Foie de Morue qu'elle remplace avantageusement.

Prix : 4 fr. le flacon

Laboratoire de A. MARCHAIS, Ph<sup>ien</sup>  
à LA ROCHELLE

## ÉNERGÉTÈNE DE VALÉRIANE BYLA

Suc pur et inaltérable de Valériane fraîche stabilisé et dosé physiologiquement. Contient les éthers formique, acétique, propionique et valérianique du terpinol, du valérol et du bornéol, de l'essence de Valériane ainsi que l'alcaloïde volatil et le glucoside de la plante. 36 gouttes ou 1 gr. correspondent à 1 gr. de Valériane fraîche.

**Doses et Mode d'emploi.** — 1 à 3 cuillerées à café par jour.

**Prop. thérap.** — Antispasmodique. Sédatif du système nerveux. Tonicardiaque.

**Indications.** — Névroses. Hystérie. Epilepsie, Insomnies nerveuses, Neurasthénie, Migraines.

Les Etablissements BYLA

26, Avenue de l'Observatoire, — PARIS

## ENDOCRISINES FOURNIER

Extraits opothérapiques totaux préparés  
à froid dans le vide  
(voir art. *opothérapie*)

Extraits de tous organes sous les formes  
cachets et ampoules

Endocrisines (voir ce mot). — Tous  
organes : Thyroïde, ovaire, hypo-  
physe, glande mammaire, surrénale,  
foie, rein, thymus, testicule, pancréas,  
placenta, etc.

**Forme.** — 1° *Cachets* à toutes doses (sur  
demande médicale).

**Doses** usuelles toutes préparées. — Thy-  
roïdine, 0,025 mgr., 0,10 cgr.; ovarine,  
0,10 cgr.; orchitine, 0,20 cgr.; surré-  
nale, 0,10 cgr.; hypophyse, 0,10 cgr.;  
foie 0,50 cgr.; rein, 0,25 cgr.

Prix : La boîte, 8 fr.; 10 fr.; 12 fr.  
selon dosage

*Cachets pluri glandulaires*

M, sexe masculin.

F, sexe féminin.

Trouble de croissance, infantilisme,  
arriération.

2° *Ampoules* :

Thyroïde. Ovaire. Surrénale. Hypo-  
physe. Orchitine. Rate. — Association  
hypo-surrénale. Asthme. — Hypo-  
physe lobe-postérieur, usage obsté-  
trical.

Formules : Endocrisines, glande injec-  
table Fournier.

Prix : 8 fr. 50

**Laboratoires FOURNIER Frères**  
26, Boulevard de l'Hôpital — PARIS

## ENÉSOL

**Compos.** — Salicylarsinate de mercure, a arsenic et mercure dissimulés. Renferme 38, 46 % de Hg métal, et 14, 4 % de As sous forme dissimulée. Les solutions sont incolores et ne coagulent pas l'albumine.

**Formes.** — Ampoules de 2 cm<sup>3</sup> et de 5 cm<sup>3</sup> contenant 9 gr. 03 de salicylarsinate de mercure par cm<sup>3</sup> correspondant à 0,0115 de Hg. métal et à 0,0043 de As métalloïde par cm<sup>3</sup>.

**Prop. Thér.** — Agent antisymphilitique (agissant à la fois par son arsenic et par son mercure). Action analeptique par l'arsenic.

**Doses et mode d'emploi.** — Dose moyenne : Injection intra-musculaire d'une ampoule (2 cm<sup>3</sup>) par jour. Dose massive : Injection intra-musculaire ou intra-veineuse de 4 à 8 cm<sup>3</sup> tous les 2 ou 3 jours.

### Laboratoires CLIN

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

## ENIODE LEFEBVRE

**Composition.** — Iode en combinaison stable avec une albumine d'origine animale.

**Forme.** — Comprimés kératinisés contenant chacun *Un Centigramme* en combinaison organique.

**Prop. thérap.** — L'*Eniode* possède toutes les propriétés de l'iode, sans les inconvénients de l'iodisme.

**Doses et mode d'emploi.** — *Enfants* : 1 à 2 comprimés par jour; *Adultes* : 2 à 8 comprimés par jour, avant les repas.

### Pharmacie GRIGNON

2, Rue Duphot — PARIS

## ENTEROSEPTYL CLERAMBOURG

Composition :



Forme. — Comprimés.

Propriétés. — Poudre blanche, cristalline, inodore et sans saveur, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther, fondant à 108°-110°.

Indic. therap. — Toutes les fois que l'intestin est le siège de fermentations, qu'il s'agisse de *Diarrhée* ou de *Constipation*. Entérocolite muco-membraneuse. Entérites, Colite, Dyspepsie gastro-intestinales. — Disparition des divers troubles provoqués par les auto-intoxications : Ictère, Albuminurie hépatique, Eczéma et Dermatoses diverses. — Antiseptique de choix dans les localisations intestinales des diverses *Maladies infectieuses* : Fièvre typhoïde, Affections cholériformes.

Mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés par jour, à jeun ou 1 heure avant les repas.

Laboratoire CLÉRAMBOURG-DELONDRE

Fondé en 1898

4, Rue Turbé — PARIS (17<sup>e</sup>)

## ENTÉROZONE

(Peroxydine) Voie buccale

Solution hydro-alcoolique (45<sup>e</sup> d'alcool) ; d'ozone stable à la température ordinaire (1/10 en vol.) à réaction très acide — Couleur ambrée — Saveur agréable.

Prop. thér. — Oxygène actif à l'état naissant. Double pouvoir : d'une part, Antiseptique intestinal et, partant, Antithermique; d'autre part, Oxydant et Régénérateur des globules du sang.

Indic. ther. — Antisepsie des Voies digestives et des Voies respiratoires. Tous les états infectieux fébriles. Reconstituant. Régénération des globules sanguins.

Posologie et dose. — Adultes : 4 à 6 cuill. à café prises 2 par 2 dans un demi-verre d'eau sucrée, à température ordinaire, une demi-heure avant les repas. — Enfants : 1 à 3 cuill., suivant l'âge dans les mêmes conditions.

L. BORSON

137, rue de Rome — PARIS

# ERANOL

Iode colloïdal.

**Compos.** — En suspension aqueuse et à l'état libre.

L'Eranol ne saurait être comparé aux composés iodo-organiques, aux iodures alcalins, aux peptones iodées, à l'albumine iodée, à la caséine iodée, à l'huile iodée, etc. Il est formé non d'une nouvelle combinaison iodée mais d'iode à l'état colloïdal, d'iode libre non caustique ni toxique aux doses thérapeutiques.

**Prop. thér.** — Réunit aux propriétés et aux indications de l'iode celles des colloïdes métalliques. — L'Eranol est un iode vitalisé présentant l'action empêchante antitoxinique et le pouvoir catalytique et hypothermique de tous les colloïdes chimiques de sa classe. Sa teneur en iode colloïdal est considérable, comparativement aux autres colloïdes (argent, or, etc.). Examiné à l'ultra-microscope les granules colloïdaux d'iode apparaissent très agités et très lumineux sur fond obscur (mouvement brownien très accentué).

**Posologie et Formes.** — 1° Liquide pour les usages interne et externe (à 10 pour 1000 d'iode colloïdal) ;

2° Ampoules de 1 cc. pour injections hypodermiques ou intraveineuses (à 5 pour 1000).

**Modes d'emploi et Doses.** — Usage interne : Au milieu des repas ou immédiatement après dans un liquide quelconque.

Adultes : 10 à 20 gouttes jusqu'à 30 progressivement, 2 fois par jour.

Enfants : 5 à 15 gouttes, 1 ou 2 fois par jour suivant l'âge.

**Usage externe.** — Appliquer directement ou avec un pinceau ou un pulvérisateur.

**Ampoules** (Isotoniques et non douloureuses) Une injection hypodermique quotidienne pendant 12 jours et repos de 8 jours ou une tous les deux jours seulement.

**Laboratoire RATIÉ**

45, Rue de l'Échiquier — PARIS

## ERGOTINE BONJEAN

Extrait hydro-alcoolique d'Ergot de seigle.

Préparé selon la véritable formule  
de BONJEAN.

**Forme.** — 1. Extrait mou.

Flacons de 30 gr. Ne se vendent pas au public.

Tubes de 2 gr.

2. DRAGÉES dosées à 15 centigr. d'ergotine :

Flacons de 30 dragées.

1/2 — de 15 —

3. Solution stérilisée. (XV gouttes représentent 15 centigr. d'ergotine) : Flacons de 30 gr. contenant 3 gr. d'ergotine.

4. Ampoules de 3 cc., pour injections :

Boîtes de 2 ampoules.

**Propriétés.** — Action constrictive sur les fibres musculaires lisses : Utérus, vaisseaux, tube digestif, muscles de Reissessen.

**Indications.** — Inertie, hémorragies et fibrome de l'utérus. Retard dans l'expulsion du placenta. Congestion utérine et leucorrhée. Hémorragies diverses (hémoptysies, hématomèses, hémorroïdes, etc.).

**Dose et mode d'emploi.** — 0,60 à 1 gr. 20 par 24 heures. Dose maxima : 3 gr.

DRAGÉES : 4 par jour (2 avant chaque repas).

Extrait. Prescrire :

### POTION

Ergotine BONJEAN .. . . . . .	1 à 4 gr.
Vin cordial .. . . . . .	100 gr.
Sirop d'écorce. orang. amères .. . . .	20 gr.

### SUPPOSITOIRES

Ergotine BONJEAN .. . . . . .	0 gr. 50
Beurre de Cacao .. . . . . .	5 gr.

### LAVEMENTS

Ergotine BONJEAN .. . . . . .	2 gr.
Eau .. . . . . .	100 gr.

**LABÉLONYE & C<sup>ie</sup>**

99, Rue d'Aboukir — PARIS

## EUMICTINE

**Indic. Thér. :**

Antigonococcique, diurétique, antiseptique, etc.

Affections des voies urinaires :

Blennorrhagie, Urétrite, Cystite, Pyélite, Catarrhe, etc.

**Doses et Mode d'emploi :**

Capsules enrobées au gluten pur, contenant chacune 0,20 Santalol, 0,05 Salol et 0,05 Hexaméthylène — Tétramine; 8 à 12 par jour aux repas.

**Dr M. LEPRINCE**

62, Rue de la Tour — PARIS (16<sup>e</sup>)

---

## EXTRAIT DE MALT FRANÇAIS DÉJARDIN

Bière de santé extrêmement concentrée additionnée de glycérophosphates.

**Indic.** — Les nourrices défaillantes, les dyspeptiques, les anémiques et les chlorotiques. Aliment des faibles, des délicats, des épuisés. Remède des arthritiques, scrofuleux et lymphatiques.

**Posologie.** — *Pour les adultes :* Pur, un verre à Bordeaux un quart d'heure avant les repas et mélangé comme boisson, en mangeant, dans la proportion de 1 pour 3, à une eau naturelle très légèrement alcaline.

*Pour les enfants :* Le quart ou la moitié de ces doses.

**Etablissements DÉJARDIN**

109, Boulevard Haussmann — PARIS (9<sup>e</sup>)

## FARINE LACTÉE SALVY

**Composition.** — *Produit français*, préparé en Normandie, le pays du bon lait, et contenant de la farine de céréales, du sucre et du lait.

**Dose.** — La dose moyenne pour un bébé de neuf mois est d'une cuillerée à soupe par tasse à café d'eau ou de lait.

**Propriétés.** — Préparé spécialement pour les enfants. Facilement digestible et assimilable, même par les bébés les plus délicats.

**Indications.** — Alimentation parfaite des enfants pendant et après le sevrage. Également excellent aliment pour les malades, les convalescents et les vieillards.

**Particularité.** — Renfermée dans des boîtes scellées, mais faciles à ouvrir, la farine lactée SALVY conserve indéfiniment toutes ses qualités.

**SALVY & C<sup>ie</sup>**

6, Rue Daubigny — PARIS

## FAVOLYSINE THEVENOT

**Compos.** — Liquide à base de xylol iodé et d'huile de vaseline.

**Indications.** — Traitement des teignes et pelades de la barbe et du cuir chevelu. Phtiriasse pubienne.

Il suffit de badigeonner la lésion (ainsi qu'une zone de 1 centimètre l'environnant) deux fois par jour pendant deux ou trois jours.

Ce liquide n'est pas irritant.

Echantillon sur demande

Prix du flacon : 5 fr. 50, impôt compris

Produit fabriqué par la Société des  
**Produits Pharmaceutiques THEVENOT**  
DIJON



## FER BRAVAIS

en gouttes concentrées

**Prop. thér.** — Attaqué par les acides du suc gastrique, passe dans le sang où il s'unit aux albuminoïdes pour former l'hémoglobine *naturelle* (véhicule de l'oxygène, ce grand nourricier de tous les tissus).

**Dose.** — X à XX gouttes (une goutte par année d'âge), à chaque repas, dans de l'eau, boire avec un chalumeau, ou sur un morceau de sucre.

**Indications.** — Appauvrissement du sang avec toutes ses conséquences : Anémie, chlorose, débilité, etc.

Prix : 9 fr. le grand flacon (1 mois environ).

6 fr. le 1/2 flacon (15 jours environ).

**Comte René de GRAUWE**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe

16, Rue de Rocroy — PARIS

---

## FER RABUTEAU

(Protochlorure de fer cristallisé)

**Formes.** — 1<sup>re</sup> Dragées de Fer du Dr Rabuteau à 0 gr. 025 de Fe Cl<sup>3</sup>.

2<sup>e</sup> Elixir du Dr Rabuteau à 0 gr. 10 de Fe Cl<sup>3</sup> par cuillerée à café.

3<sup>e</sup> Sirop du Dr Rabuteau à gr. 05 par cuillerée à dessert.

**Propriétés thérapeutiques.** — Le plus assimilable des ferrugineux. Elève à la fois le nombre des globules rouges et leur teneur en hémoglobine.

**Dose.** — 4 à 8 dragées par jour; 1 à 2 cuillerées à café d'Elixir.

**Nota.** — L'altérabilité naturelle du protochlorure de fer est évitée par les formules du Dr Rabuteau.

**Laboratoires CLIN**

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

## FERMENTEROL MILAN

Combinaison particulière  
de saccharures et de féculés  
sélectionnées.

**Prop. thér.** — Modificateur biologique  
du milieu intestinal sans addition  
d'aucun ferment.

**Indications.** — Constipation. Entérites.  
Colites.

**Posologie.** — 6 à 9 comprimés par jour.  
6 fr. le flacon.

**M. CARTERET**

15, Rue d'Argenteuil — PARIS

---

## FEROXAL BUISSON

Granulé de protoxalate de fer  
(0 gr. 10 par cuillerée à café)  
combiné à des phosphates alealins.

**Prop. thér.** — Hyperglobulise et minéralise.  
Tolérance absolue par le tube digestif.  
Action rapide et non constipante.

**Indications.** — Celles des ferrugineux et des  
phosphates : Anémies diverses, Pré tuber-  
culose, Chlorose, Anémie des jeunes en-  
fants, Grossesse, Allaitement, conva-  
lescence.

**Dose.** — Une à deux cuillerées à café à cha-  
que repas.

**Etablissements Albert BUISSON**

157, Rue de Sèvres — PARIS

## FERROCODILE ET FERRICODILE

Caeodylate Ferreux - Caeodylate Ferrique

**Indic. therap.** — Spécifiques de l'Anémie et de la Chlorose, Malaria, Anémie palustre, etc... Tous les avantages des sels ferreux et ceux de l'arsenic organique: Le Caeodylate Ferrique est le seul sel de fer agissant très bien en injections hypodermiques.

**Doses et Mode d'emploi.** — *Ferrocodile* : Pilules à 0.025. 4 par jour aux repas.

*Ferricodile* : Ampoules à 0.05. 1 injection par jour pendant huit jours repos un temps égal, reprise en alternant jusqu'à guérison.

**Docteur M. LEPRINCE**

62, rue de la Tour. — PARIS (14<sup>e</sup>)

## FERROPHYTINE CIBA

Phosphaté de fer colloïdal

**Comp. et Prop.** — Sel ferrique neutre de l'acide inosito-phosphorique, contenant 7,50 % de fer et 6 % de phosphore, ces deux éléments sous forme très assimilable. — Stimulant de l'hématopoïèse et excitant des fonctions cellulaires, la *Ferrophytine* est le médicament type des états anémiques et chloro-anémiques accompagnés de dénutrition.

**Posologie et Formes pharm.** — Cachets (0 gr. 50); granulés (0 gr. 50 par cuillerée à café).

**Indic.** — Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Séro-fulose, Croissance defectueuse. Médicament toujours bien toléré.

**Doses.** — Adultes : 1 gr. 50 par jour. Enfants : 0 gr. 25 à 1 gr. par jour.

Prix : La boîte de 30 cachets : 5 fr. 50

— Le flacon de granulé : 7 fr.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**

1, Place Morand — LYON

## FERRYGÈNE CARRAU

*Arsi-peptonate de fer et manganèse,*  
(Arsenic fer et manganèse organiques.)

**Forme.** — Sous forme de liqueur agréable représente le reconstituant le plus énergique et le plus actif. Pas de constipation, son action est rapide, la recoloration des tissus est immédiate.

**Indic.** — Toutes les *Anémies, Fatigue, Faiblesse* quelle que soit leur origine.

**Dose.** — De 1 cuillère à café à un verre à liqueur après les repas, suivant l'âge et les cas.

**Laboratoires du Dr TISSOT**

34, Boulevard de Clichy — PARIS

## FORTOSSAN CIBA

Phytine spéciale pour les nourrissons:

**Comp. et Prop.** — Sel sodique neutre de l'acide inosito-diphosphorique (principe phospho-organique végétal). Médicament phosphoré très assimilable, spécialement préparé pour la pratique infantile.

**Indicat.** — Rachitisme, ostéomalacie, retard du développement et de la dentition, scrofule et tuberculose infantile. Convalescence des maladies infectieuses, etc.

**Posologie et Forme pharmac.** — Poudre s'administrant avec le lait du biberon ou les bouillies, à la dose de 1 à 2 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

Prix : 4 fr.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND, Ph<sup>den</sup>**

1, Place Morand — LYON

# FOSFOXYL CARRON

## Nouvelle médication phosphorée

Emulsion stable d'un colloïde chimique le Phospho térébenthate sodique.  $C^{10} H^{15} PhO^2 Na^2$ , dans lequel la molécule de Phosphore se trouve à l'état d'extrême division en suspension dans une molécule organique (térébenthine) (état colloïdal). Réaction légèrement alcaline.

**Formes.** — 1° *Liquueur opaline* sans sucre, ni alcool douce d'une odeur balsamique et menthée, d'un goût résineux et menthé, légèrement amer.

2° *Sirop opalin* anisé d'un goût très agréable.

**Dosage.** — Une cuillerée à dessert de chacune de ces préparations équivaut à un centigramme de phosphore.

**Propriétés.** — Spécifique de la dépression nerveuse et mentale. Excitant et tonique du système nerveux central, excitant de l'assimilation et de l'appétit. Producteur d'énergie physique et mentale.

**Indications.** — Algies. Asthénies : Mélancolies. Adynamie, Impuissance, Epuisement nerveux, Neurasthénie. Maladies de la nutrition : Phosphaturie, Diabète, Tuberculose.

**Posologie.** — Dose moyenne, deux cuillerées à dessert, soit 90 centimètres cubes par jour, dans 4 ou 5 fois le volume d'eau, sucrée ou non avant les repas.

Prescrire soit *Fosfoxyl Carron*

soit *Sirop de Fosfoxyl Carron*.

afin d'éviter la substitution.

Laboratoires du FOSFOXYL

CARRON, ancien Ph<sup>1</sup><sup>er</sup>-Chimiste de la Marine  
40, rue Milton

## FRANGULOSE FLACH

Traitement efficace de la Constipation.

**Forme.** — Comprimés à avaler.

**Composition.** — Principes actifs totaux du *Rhamnus Frangula* (Bourdaïne).

**Indic. Thér.** — Constipation, quelle qu'en soit la cause. — Sans contre indication.

**Mode d'emploi.** — Au repas du soir.

**Dose.** — 1 à 6 comprimés par jour.

### Laboratoires FLACH

6, Rue de la Cossonnerie — PARIS

---

## FUCUS GMET

Extrait total du "*Fucus Vésiculosus*"  
Préparation liquide sans alcool  
(iode naturel)

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* :  
2 à 6 cuillerées à café par jour.

*Enfants* : 1 à 3 cuillerées.

À prendre à jeun et entre les repas  
dans un verre d'eau.

**Propriétés thérap.** — Dépuratif, Anti-strumeux.

**Indications.** — Obésité, Goîtres.

### Produits GMET

27, Faubourg Montmartre — PARIS (9<sup>e</sup>)

Téléphone : Bergère 43-10

## GAIACALCINE LATOUR

Polyphosphate Gaiaacolé Caleifiant

**Prop. Thér.** — Modification rapide des sécrétions bronchiques et des parties sécrétantes. Disparition de la toux et de l'expectoration.

**Indications.** — Toutes les affections broncho-pulmonaires aiguës ou chroniques et en particulier dans la tuberculose pulmonaire et osseuse.

**Doses et Mode d'emploi.** — Deux cachets par jour, un cachet immédiatement avant chaque principal repas. Le traitement doit être suivi pendant une période variant de 15 à 30 jours. Dans les cas chroniques l'emploi de la Gaiaacalcine doit être prolongé avec une interruption de 8 jours.

Ne se vend qu'en boîte de 30 cachets.

**Laboratoires LATOUR**

17, Place des Vosges — PARIS

---

## GARDENAL

(Phényl-Ethyl-Malonylurée)

Produit appartenant à la même famille chimique que le Véronal dont il se distingue par la présence d'un groupe phényl. Poudre blanche, insipide, très peu soluble dans l'eau.

**Indications.** — Hypnotique et sédatif de premier ordre, efficace dans tous les états d'excitation du système nerveux, trouve sa principale indication dans le traitement de l'**Epilepsie**. Action immédiate et des plus nettes sur les crises et les vertiges. Relèvement rapide de l'état psychique.

**Mode d'emploi, Posologie.** — Délivré habituellement sous forme de comprimés dosés à 0,10. Chez l'adulte : un à quatre comprimés répartis dans les 24 heures. Régler les doses chez l'enfant selon l'âge, le poids et la tolérance. Surveiller attentivement les effets. Le traitement peut être prolongé aussi longtemps qu'il est nécessaire. Éviter la suppression brusque du médicament.

Littérature et Échantillons sur demande.

**Etablissements POULENC Frères**

92, rue Vieille-du-Temple — Paris (3<sup>e</sup>)

## GASTRO-SODINE

**Formule.** — Bi-carbonate de soude 2  
 Phosphate de soude 1  
 Sulfate de soude 1/2  
 par cuillerée à café.

**Forme unique.** — Granulé soluble.

**Dose.** — 1 cuillerée à café, tous les matins à jeun dans un verre d'eau, de préférence chaude.

**Indications.** — Dyspepsie, Gastralgie, Gastrite, Hyperchlorhydrie, Brûlure d'estomac, Ptose, Ulcère, Constipation, Appendicite, Entérite muco-membraneuse, Hépatite, Maladies des pays chauds et leurs conséquences : Dermatoses, Aené, Eczéma, Furunculose, Prurit anal et génital.

Laboratoire de la GASTRO-SODINE  
 ODINOT, Ph<sup>lem</sup>, 25, rue Vaneau. — PARIS

## GAUROL

Nouveau sel de chaux en combinaison organique, soluble, colloïdal, injectable, indolore.

**Forme.** — Ampoules de 1 cc.

**Prop. thérap.** — Récalcifiant intensif, par Autofixation, dans les tissus, du phosphate tricalcique naissant et colloïdal.

**Indic. thérap.** — Tous les états morbides résultant d'une perte de chaux dans l'organisme ou d'une insuffisance de la chaux alimentaire.

**Mode d'emploi.** — Une ampoule par jour, en injections sous-cutanées ou intramusculaires.

Suspendre le traitement pendant dix jours, après chaque série de douze injections.

Laboratoires PÉPIN & LÉBOUCQ  
 COURBEVOIE (Seine)



## GÉLOBARINE

(Sulfate de Baryum crémeux  $\text{SO}^4 \text{Ba.}$ )

Produit destiné aux usages radiologiques.

S'emploie de la même manière que les sels de bismuth. Toutefois pour tenir compte de la différence d'opacité des corps, il convient d'augmenter de  $1/3$  la dose de *Gélobarine*.

L'absence absolue de toxicité de ce produit permet de l'employer en toute sécurité, soit par la méthode haute (repas ou bouillie), soit par la méthode basse (lavement).

Littérature et échantillons sur demande.

**Établissements POULENC Frères**

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

---

## GÉLOTANIN

**Nature.** — Tannate de gélatine. Poudre blanche, inodore, insipide, insoluble dans l'estomac, soluble dans l'intestin, en libérant progressivement du tanin et de la gélatine au cours de son cheminement.

**Préparation.** — Elle a fait l'objet d'une communication de M. Choay à la Société de Pharmacie de Paris (Séance du 6 juin 1917).

**Prop. thérap.** — Réunit les avantages des deux composants sans provoquer d'intolérance. (Professeur Narfan).

**Indic.** — D'une façon générale, dans tous les cas de diarrhées.

**Posologie.** — 1° *Nourrissons et jeunes enfants* : Prescrire : Paquets de *Gélotanin*, une boîte. De 3 à 6 paquets de 0 gr. 25 par jour, à répartir dans le lait ou dans aliments habituels. 2° *Adultes* : Prescrire Cachets de *Gélotanin*, une boîte. De 4 à 8 cachets de 0 gr. 50 par jour, à prendre aux repas.

**Laboratoire CHOAY**

44, Avenue du Maine — PARIS

Téléph. Fleurus 13-07

## GÉODYL

(Préparé sous le contrôle scientifique de A. Frouin)

**Compos.** — Solution à deux pour cent de sels organiques de terres rares. (Néodyme, Praséodyme, Samarium, Lanthane).

**Forme.** — Ampoules de 2" et 5" en boîtes de 10 ampoules.

**Prop. therap.** — Action spécifique sur le Bacille de Koch (attaque des corps cireux du Bacille), Leucogénèse et mononucléose intense, Action sclérosante sur les tissus, Traitement de choix des diverses tuberculoses, Reconstituant énergétique.

**Dose et Mode d'emploi.** — Injection tous les deux ou trois jours d'une ampoule de 2 ou de 5". — Faire trois séries de 15 injections avec repos de quinze jours à un mois entre chaque série.

**Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE**

37, rue de Bourgogne — PARIS

USINES: à Bourg-la-Reine; 5, rue Poliveau, Paris.

---

## GLOBULES ROMON

**Forme.** — Globules glutinisées, digestion intestinale.

**Compos.** — Extraits orchitique, prostatique et de moëlle épinière joints à la strychnine, à l'Yohimbine et au phosphore de zinc pur.

**Indications.** — Traitement le plus rationnel de l'impuissance.

**Dose.** — 4 à 6 globules par jour.

**Laboratoires MONAL & C<sup>ie</sup>**

6, Rue Daubigny, 6

PARIS

## GERMOSE

Gouttes à base de Fluoroforme stabilisé et de Bergénite. Non toxique — Goût agréable

**Indications.** — Spécifique contre la coqueluche dont elle arrête très rapidement l'évolution et évite les complications si graves.

Calme rapidement la Toux (sans en excepter la Toux sèche émétisante des tuberculeux), la Toux spasmodique, quinteuse, les crises d'asthme, les Toux opiniâtres.

Hâte la guérison des affections des voies respiratoires : Bronchites, Trachéo-bronchites, Pneumonie, broncho-pneumonie. Gripes pulmonaires, etc., etc.

**Propriétés.** — Microbicide, antiseptique des voies respiratoires, puissant antispasmodique, sédatif. Combat efficacement l'infection.

Agit sur le symptôme Toux et sur l'affection qui le provoque. N'est pas toxique et n'a aucune action nuisible sur les fonctions digestives, propriétés précieuses qui permettent de prescrire directement la *Germose* aux nourrissons atteints de bronchites, de coqueluche, etc., etc. dans un peu de lait ou simplement dans de l'eau sucrée ou non.

**Forme.** — Gouttes concentrées : 1 gr. (46 gouttes) contient 1/10 de centimètre cube de fluoroforme stabilisé et 0 gr. 30 de Bergénite.

**Doses habituelles dans les 24 heures.** — Jusqu'à 1 an, 4 fois 10 gouttes; de 1 à 3 ans, 8 fois 10 gouttes; de 3 à 12 ans, 8 fois de 15 à 20 gouttes; au-dessus, 8 fois de 25 à 30 gouttes. A prendre dans une ou deux cuillerées d'eau ordinaire ou sucrée ou un peu de tisane.

**Nota.** — Le médecin peut prescrire sans inconvénient, la *Germose*, à des doses plus élevées; il doit même le faire si les résultats ne lui paraissent pas suffisamment rapides.

Dans tous les cas, les doses doivent être prises aussi régulièrement que possible, toutes les deux heures par exemple, sans tenir compte des accès de toux ou des quintes.

Aucune contre indication

**Laboratoire MOREAU**

7, rue d'Hauteville, PARIS

## GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

Comprimés effervescents dosés à 0,25 centigr. par unité.

Granulé dosé à 0,30 centigr. par cuillerée-mesure,

Ampoules injections dosées à 0,10 centigr. par ampoule 1 c.c.

**Doses et Mode d'emploi.** — Granulé ou comprimés : 1 gr. par jour en 2 fois dans un peu d'eau; ampoules : 1 à 2 c. c. ou 3 fois par semaine.

**Prop. Thér.** — Réminéralisateur physiologique. Ne fatigue pas l'estomac. Son emploi continu ne présente aucun inconvénient.

**Indications.** — Dans tous les cas de déminéralisation phosphorée et d'asthénie nerveuse.

**Laboratoires M. ROBIN**

13, Rue de Poissy — PARIS

## GLYCOGÈNE CLIN

**Compos.** — Hydrate de carbone voisin de l'amidon ( $C^6 H^{10} O^6$ )n. Poudre blanche, insipide, soluble dans l'eau en donnant un liquide opalescent que l'acide acétique éclaircit.

**Formes.** — 1° Capsules de *Glycogène Clin* glutinisées à 0 gr. 20 par capsule.

2° Granulé de *Glycogène Clin* à 0 g. 20 par cuillerée à café.

3° Tubes stérilisés de *Glycogène Clin* de 2 cm<sup>3</sup> à 0 gr. 05 par cm<sup>3</sup>.

**Dose.** — Voie buccale : 60 egr. à 1 gr. par jour (3 à 5 capsules ou cuillerées à café de granulé). Le granulé à base de sucre ne sera pas prescrit dans le diabète.

Voie hypodermique : 1 tube par jour (injection intramusculaire).

**Laboratoires CLIN**

20, Rue des Fossés-St-Jacques — PARIS

## GLYCO-LACTIMASE

**Description.** — Association symbiotique de bacille lactique Bulgare et de bacille glycobacter, en comprimés de 0 gr. 50, 40 comprimés par flacon.

**Action Thér.** — Le bacille glycobacter transforme les matières amylacées en sucres et fournit par conséquent un milieu de culture éminemment favorable au bacille lactique, dont l'activité se trouve ainsi considérablement renforcée.

**Indications.** — 4 à 8 comprimés par jour, dans les intoxications intestinales, diarrhées, entérites, affections du foie.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**

18, Avenue Hoche — PARIS

---

## GLYKOLAINE ROBIN

Association de la kola  
aux glycérophosphates.

**Granulé.**

**Dose et mode d'emploi :**

1 à 2 cuill. à café par repas.

**Indications :**

Stimulant du système nerveux, Surmenage, Névralgies, Neurasthénie.

**Laboratoires M. ROBIN**

13, Rue de Poissy

PARIS

## GOBÉROL

Toilette journalière, Gynécologie, Obstétrique  
Injection alcaline type, Oxygénée et isotonique  
et analgésique.

**Présentat.** — Poudre et comprimés, chaq. compr. pèse 5 gr.  
**Compos.** — Oxygène-Borate de soude mentholé pur. (Perborate de soude, Bisorate de soude, Menthol).

**Prop.** — Soluble instantanément dans l'eau chaude à 38-40° en donnant une solution d'H<sup>+</sup> O<sup>+</sup> faible, mais à l'état naissant, alcaline et isotonique.

**Avantages** — Pas d'intolérance. Ni toxique, ni corrosif, ni salissant, ni acide. Tous les avantages de l'H<sup>+</sup> O<sup>+</sup> sans en avoir les inconvénients. *Titre fixe, alcalinité, état naissant* qui donne une suractivité que le Professeur A. Robin évalue de 1 à 5.

**Indic.** — Injection alcaline, oxygénée, isotonique et analgésique : Toilette journalière, Gynécologie, Leucorrhées, Vulvite, Vaginite, Prurit, etc.

**Dosologie** — *Solution normale* : une cuillerée à café ou un comprimé (pour un litre d'eau chaude à 38-40°). — *Solution forte* : deux cuillerées à café ou deux comprimés (pour un litre d'eau chaude à 38-40°).

### A. CHARMAISON

Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe de l'Université de Paris  
35, Avenue de Royat — CLERMONT-FERRAND

## GOMÉNOL

Essence provenant d'une variété sélectionnée  
de *Melaleuca viridiflora*.

**Propriétés.** — Antiseptique, analgésique, anticatarrhal, désodorisant, hautement diffusible. Toxicité et causticité nulles.

**Action thérapeutique et usages.** — Préconisé à l'intérieur, comme balsamique et anticatarrhal. Convient spécialement aux affections chroniques des voies respiratoires : Bronchites, bronchectasies, tuberculose. On le prescrit utilement dans l'urétrite et la cystite. — A l'extérieur, il est surtout employé en inhalations et pulvérisations dans le coryza, les laryngites, les bronchites, la coqueluche; en pansements chirurgicaux dans les cas de brûlures, plaies septiques, ulcères, furoncles, phlegmons; en pansements vaginaux dans les métrites. — L'OLÉO-GOMÉNOL à 5 % est un bon antiseptique nasal non irritant. — Sous forme d'OLÉO GOMÉNOL, il est donné en injections intra-musculaires (tuberculose, infections généralisées) et intra-trachéales (laryngite tuberculeuse, bronchite fébrile, tuberculose pulmonaire); en instillations intravésicales (cystites).

### Laboratoire du GOMÉNOL

17, Rue Ambroise-Thomas — PARIS (9<sup>e</sup>)

## GONACRINE

Chlorhydrate de Diamino-Méthyl-acridine

Matière colorante douée de remarquables propriétés comme antiseptique urinaire.

D'après Stowell, le Chlorhydrate de diamino-méthyl-acridine posséderait à l'égard du gonocoque un pouvoir bactériocide 600 fois supérieur à celui du Protargol : cette action persiste en présence de l'urine surtout si celle-ci est alcaline.

Toxicité pratiquement nulle aux doses couramment utilisées : solutions à 1/1000 pour injections, 1/4000 pour grands lavages, 2 à 3 fois par jour.

Littérature et échantillons sur demande.

**Etablissements POULENC Frères**

92, Rue Vicille-du-Temple — PARIS

## GOUTTES LIVONIENNES

### DE TROUETTE-PERRET

Capsules de goudron, créosote, baume de tolu.

**Composition.** — Chaque petite capsule renferme :

Créosote pure de bois de hêtre.....	0 gr. 05
Goudron purifié de Norvège.....	0 gr. 075
Baume de tolu.....	0 gr. 075

**Indications.** — Rhumes, toux, bronchites, catarrhes, tuberculose, maladies des voies respiratoires, antiseptie des voies digestives et urinaires. Le meilleur moyen de faire tolérer la créosote. Médicament préventif et curatif.

**Dose et Mode d'emploi.** — 4 à 8 Gouttes Livoniennes de Trouette-Perret par jour *au milieu des repas*.

Bien spécifier : GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET, pour éviter les contrefaçons.

**Etablissements TROUETTE & Cie**

15, Rue des Immeubles-Industriels, 15  
PARIS (11<sup>e</sup>)

## GOUTTES DE LOLOTSÉ ISBERG

(Principe actif du marron d'Inde)

**Forme.** — Gouttes préparées avec le principe actif du marron d'Inde et avec sa molécule organique.

**Indic. thér.** — Varices, Hémorroïdes, Varicoèles, Phlébites, Congestions, Hémorragies, Hémoptysies.

**Propriétés.** — Aucune contre indication. Dans le cas de constipation, l'intestin se remet à fonctionner d'une façon normale. Vaso-constricteur périphérique du système veineux tout entier.

**Mode d'emploi.** — 10 à 15 gouttes à chaque repas. Pour les crises hémorroïdaires: 40 à 50 gouttes par jour, pendant 2 à 3 jours.

Echantillons sur demande

**Laboratoires I. BERGER**

90, Avenue du Bac

LA VARENNE SAINT-HILAIRE (Seine)

## GOUTTES DE SÉRÔ

Extrait total et concentré de galbules de cupressus sempervirens.

**Indication.** — Vaso constricteur et tonique puissant du système veineux. — Spécifique *efficace sûr et constant* des varices, ulcères variqueux, périphlébites, *hémorroïdes*, varicoèles et des *troubles de la ménopause*.

**Dose moyenne.** — 30 gouttes avant chacun des deux principaux repas.

**LETTRY**

42, Avenue de Breteuil — PARIS



# GOUTTES NICAN

(sans sucre)

**Compos.** — Bromoforme et eodéine purs, associés à : Aconit, belladone, drosera, Grindelia. (4 gouttes = 1 goutte de Bromoforme stabilisé.)

**Caractéristiques.** — Effet rapide et persistant, souvent surprenant. Tolérance parfaite. Pas de contre-indications.

**Incomptabilité.** — Tabac dont l'usage retarde la guérison.

**Prop. thér.** — Sédatif, décongestif, antispasmodique très puissant et fidèle.

**Posologie.** — Enfants de tout âge, adultes, diabétiques. — A absorber loin des repas, dans de l'eau, du grog ou du lait tièdes qu'on agitera en y ajoutant les gouttes.

**1<sup>o</sup> Toux des tuberculeux.** — (Calme et repos immédiats).

**2<sup>o</sup> Grippe.** — Toux spasmodique, asthme, rhume des foins, etc. (Succès immédiat, jugulation complète en quelques jours, souvent en quelques heures).

**Doses initiales.** — Adultes, 240 gouttes.

Enfants, 24 gouttes par année.

A prendre en 4 fois dans les 24 heures.

Diminuer progressivement après effet.

**3<sup>o</sup> Coqueluche.** — (Amélioration immédiate, jugulation complète en moins de 15 jours).

**Doses initiales.** — Adultes, 120 gouttes.

Enfants, 12 gouttes par année.

A prendre en 4 fois, après une quinte. Augmenter progressivement tous les jours de 1 goutte par année, jusqu'à effet. (La dose initiale devra ainsi être doublée le 12<sup>e</sup> jour au plus tard.)

**N. B.** — En cas, excessivement rares toutefois, de recrudescence des quintes ou de somnolence accentuée, interrompre le traitement pendant 24 heures. Puis continuer la progression ascendante, si c'est nécessaire. - Échantillons gratuits.

**Laboratoire CANTIN**

PALaiseau (S.-et-O.) France.

## GRAINS DE VALS

Podophyllin 0,015

Cascara et Bourdaine (extr.) aa 0,025

**Dose et Mode d'emploi :**

1 à 2 le soir au repas.

**Prop. Thér. :**

Laxatif, régulateur de l'intestin, ne donnant pas de coliques.

**Indications :**

Constipation, embarras gastrique.

Pas de contre-indications.

**Laboratoires H. NOGUÈS**

11, Rue Joseph-Bara — PARIS (6<sup>e</sup>)

---

## GRANULÉ GIRARD

iodotannique - glycérophosphaté

**Prop. thérap.** — Tonique, reconstituant et anti-déminéralisateur,

**Indications.** — Lymphatisme, Engorgements ganglionnaires, Scrofule, Tuberculose au 1<sup>er</sup> degré, Convalescences,

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 cuillerées à café par jour, pur ou délayé dans du lait chaud.

Prix : le flacon 6 francs.

**Laboratoire A. GIRARD**

48, rue d'Alésia — PARIS

## GUI GMET

Extrait total du "Visenum Album"

Préparation liquide sans Alcool correspondant à 2 gr. de plante par cuill. à café.

**Doses et Mode d'emploi.** — Adultes : 1 à 4 cuill. à café par jour. — Enfants 1/2 dose.

À prendre par cuill. à café dans un peu d'eau ou de tisane, en dehors des repas.

**Prop. Thér.** — Hypotenseur remarquable, Astringent hémostatique. Nervin.

**Indications.** — Artério-sclérose, Hémoptysies, Angine de poitrine, Anévrismes et tous les cas d'hypertension artérielle.

Littérature et échantillon sur demande au Service Médical des

### Produits GMET

27, Faubourg Montmartre — PARIS (9<sup>e</sup>)

Tél. Bergère 43.10

---

## GUIPSINE

Principes utiles du Gui

**Indic. Thér. :**

Régulateur du travail du cœur.

Médication hypotensive. — Hypertension, Artério-sclérose, Hémoptysie,

Goutte, Troubles de la Ménopause, Néphro-sclérose.

**Doses et Mode d'emploi :**

Pilules à 0,05, 4 à 10 par jour entre les repas.

Ampoules à 0,05 : 1 ou 2 injections par jour.

**D<sup>r</sup> M. LEPRINCE**

62, Rue de la Tour — PARIS (16<sup>e</sup>)

## HAMAMÉLINE ROYA

Préparation d'*Hamamelis* obtenue directement de la plante fraîche, contient à l'état concentré (0 gr. 20 par cuillerée à soupe), le principe actif, aromatique de la plante, « l'Essence », à l'exclusion de la matière extractive, inerte au point de vue vasculaire.

**Propriétés.** — Vasoconstricteur énergique et durable. Tonique des fibres lisses. Sédatif vasculaire puissant. Antieongestif.

**Indications.** — Toutes dilatations, congestions et inflammations veineuses, Varices, Varicoèles, Hémorroïdes, Phlébites, Congestions, Fibromes, Métrorragies, Hémoptysies, Hématémèses, Hématuries, Accidents congestifs de la ménopause.

**Doses.** — Deux à quatre cuillerées à soupe par jour, demi-heure avant de manger.

Echantillons gratuits aux médecins.

**Pharmacie ALEXANDRE**

41, Rue de Rome — PARIS

## HAMAMÉLIS GMET

Extrait total de l'*Hamamelis Virginica*

Préparation liquide sans alcool correspondant à 2 gr. de plante par cuillerée à café.

**Doses et mode d'emploi.** — 2 à 6 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau.

Cas graves doubler la dose.

**Prop. thér.** — Vaso constricteur, décongestif.

**Indications.** — Tous les troubles d'origine congestive ou dus à une dilatation veineuse anormale : Varices, Hémorroïdes, Formation Ménopause, Tumeurs abdominales, Migraines, Vertiges, Bourdonnements, Rougeurs du nez et du visage.

Littérature et échantillons sur demande au

**Service médical des Produits GMET**

27, faubourg Montmartre — PARIS (9<sup>e</sup>)

Téléphone Bergère 43-10

# HÉMOGLOBINE DESCHIENS

## Opothérapie Hématique

**Nature.** — Hémoglobine vraie et essentiellement vivante parce que préparée à froid, sans traumatisme histologique, physique ou chimique, conservant sa valeur opothérapique et oxydasique, grâce à son incorporation, à l'état naissant, à un excipient dosé avec soin, sorte de sérum aseptique où sa vitalité persiste.

**Action et Indications.** — Les résultats hématopoïétiques considérables que donne le sirop de Deschiens à l'hémoglobine vraie dans les anémies, la chlorose, la débilité, la tuberculose, le paludisme, les convalescences, les suites obstétricales, etc., s'expliquent par la triple action de ce médicament qui agit à la fois : opothérapiquement, puis par les oxydases du sang et les vitamines qu'il renferme, enfin par le fer vital qu'il contient; non en quantité infinitésimale, mais à doses comparables à celles indiquées dans les formulaires pour les ferrugineux usuels.

**Posologie.** — Préparation prescrite par plus de 30.000 médecins du monde entier, admise dans les Hôpitaux de Paris, contient environ 2 gr. 50 d'hémoglobine naissante et vivante par cuillerée à soupe, soit 1 centigramme de fer vitalisé.

1 cuillerée à soupe à chaque repas, doubler dans les cas graves. Pas de contre-indications.

Littérature — Echantillons

**DESCHIENS**, Docteur en pharmacie

9, rue Paul-Baudry — PARIS (8<sup>e</sup>)

# HÉMAGÉNINE DU D<sup>r</sup> GIRAUD

Médication iodo-arsénicale  
phosphorée-strychnique

**Doses et mode d'emploi.**— Doses ascendantes et descendantes indiquées sur chaque flacon.

**Prop. thér.** — Lymphatisme, Adénopathie, Eczémas, Anémie. Toutes maladies consomptives. Convalescences.

Tonique et dépuratif puissant

**F. AUCLAIR, Docteur Es-Sciences**  
**AIGURANDE (Indre)**

# HÉMOSTYL DU D<sup>r</sup> ROUSSEL

Agent d'hématopoïèse

(Voir en outre page suivante 157)

**Sérum hématopoïétique frais de cheval**, c'est-à-dire recueilli sur un animal mis, par une saignée préalable, en pleine crise de régénération hématique.

**Action.** — 1<sup>re</sup> Hématopoïétique spécifique (Prof. Carnot, Acad. des Sc. 1906); 2<sup>re</sup> Tous les autres emplois du sérum de cheval : Hémostatique, Hyperleucocytaire général et local.

**Formes pharm.** — 1<sup>re</sup> Boîte de 6 flacons-ampoules de 10 cc. de sérum pur; 2<sup>re</sup> Boîte de quarante-cinq comprimés de Sang hématopoïétique total desséché; 3<sup>re</sup> Flacon de trois cents grammes de Sirop de Sang hématopoïétique total liquide. Prix en France : 3 fr. 75

**Indications et posologie dans les Anémies.**— Toutes les Anémies, quelle qu'en soit la nature : Convalescences, Tuberculose, Paludisme, Suites opératoires et Obstétricales, etc.

**Mode d'emploi.** — Un ou deux flacons-ampoules de dix cc. par jour, en ingestion ou lavement, ou six à huit comprimés, ou deux à trois cuillerées à potage de Sirop.

Littérature et Échantillons

**Laboratoire de l'HÉMOSTYL**

21, Rue d'Aumale — PARIS (Tél. Louvre 16-22)

# HÉMOSTYL DU D<sup>r</sup> ROUSSEL

Agent d'hémostase

(Voir en outre page 150)

Sérum frais, hémopoiétique de cheval.

**Action.** — Hémostatique et Hyperleucocytaire général et local. Hémopoiétique.

**Formes pharm.** — Boîte de six flacons-ampoules. Boîte de quarante-cinq comprimés. Flacon de sirop. — Prix en France : 9 fr. 75.

Le sérum liquide (flac.-ampoules), seul, est hémostatique.

**Indications.** — Syndrômes toxi-hémorragiques, hémophilie. Hémorragies (hémoptysies, entérorragies, métrorragies, etc.). Plaies saignantes.

**Posologie dans les hémorragies.** — Dans les cas aigus : injection de 30 cc. (technique du sérum antidiphthérique). Dans tous les autres cas : ingestion ou mieux lavement de trois fl.-ampoules.

Utiliser, en outre, si possible, l'application locale : tamponnements (métrorragies, épistaxis, etc.). — Littérature et Echantillons :

**Laboratoire de l'HÉMOSTYL**

21, Rue d'Aumale — PARIS (Tél. Louvre 16-22)

## HÉMOTONINE

**Complexe :** Fer et Strychnine en combinaison avec l'Arsenic et le Phosphore organiques.

**Forme.** — Ampoules de 1 cc. pour injections hypodermiques.

**Propriétés.** — Reconstituant et stimulant organique et sanguin complet.

**Indications.** — Etats anémiques : Asthénie, Débilité organique, Neurasthénie, Anémie palustre, etc.

**Mode d'emploi.** — Une ampoule par jour, par séries de 12 à 24 injections hypodermiques.

**Etablissements Albert BUISSON**

157, rue de Sèvres — PARIS

## HÉPATO-BYL

Opothérapies entérique, hépatique et biliaire  
en ovoïdes glutinisés

**Dose.** — 4 à 8 ovoïdes par jour, en trois fois, dix minutes avant les repas (avec un demi-verre d'eau destiné à faire pression sur le pylore et à entraîner le tout dans l'intestin) ou le soir, la dose complète en une seule fois avant de se coucher.

**Propriétés.** — L'extrait biliaire seul est thérapeutiquement insuffisant. Aussi le Corps Médical prescrit de préférence l'extrait total de la glande hépatique (bile et foie) additionné d'extrait intestinal, dans la Constipation, l'Entérocolite et toutes les Affections du foie.

Médication sans similaires ni équivalents.

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**

8, Rue de la Source — PARIS (16<sup>e</sup>). — Tél. Aut. 06-62

## HOLOS

Opothérapie osseuse

**Nature.** — Extrait opothérapique d'os vivants, renfermant périoste, corps osseux, éléments actifs (non gras) de la moëlle, retiré à température physiologique d'os de bœufs et de veaux pris directement à l'abattoir sur des animaux encore chauds.

**Indications.** — Reminéralisation du terrain tuberculeux : Prétuberculose, tuberculoses osseuse et pulmonaire. Rachitisme et tous les troubles de l'ostéogénèse. Phosphaturie, Grossesse, Allaitement, Convalescences, Dentition, Fractures et en général dans tous les cas où s'impose une promptre reconstitution du terrain organique par des éléments phosphatés et fluorés réellement assimilables.

**Posologie.** — Une petite cuiller-mesure, bien pleine (1 gr.) à chaque repas, mêlé aux aliments (aucun goût). Chez les très jeunes enfants se contenter d'une 1/2 mesure.

Littérature - Échantillons

**DESCHIENS, Docteur en Pharmacie**

9, Rue Paul-Baudry — PARIS



## **HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER**

à 40 % cc<sup>3</sup>. (Codex 1908.)

Se servir de préférence de la Seringue spéciale du D<sup>r</sup> Barthélemy, à 15 divisions; chaque division correspond exactement à un centigr. de mercure métallique.

## **HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER**

à 0 gr. 05 par cent. cube

Pour éviter les accidents buccaux chez les syphilitiques prescrire le

## **SAVON DENTIFRICE VIGIER**

injections mercurielles solubles,  
hypertoniques indolores  
intra-musculaires de VIGIER

### **AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIER**

Solution aqueuse saccharosée à 0 gr 01.  
et à 0 gr. 02 de Benzoate d'Hg par cent. cube.

### **AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER**

Solution aqueuse saccharosée à 0 gr.01.  
et à 0 gr. 02 d'Iodure d'Hg par cent. cube.

## **HUILE au BI-IODURE de MERCURE VIGIER**

à 1 % stérilisée, inodore.

### **SUPPOSITOIRES D'HUILE GRISE VIGIER à 1, 2, 3, 4 gr. de Hg**

**Pharmacie CHARLARD-VIGIER et  
HUERRE, Docteur ès-sciences  
12, Boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS**

## HUILAXINE "GILLOT"

**Composition.** — Huile de Paraffine bi-rectifiée, absolument sans goût et sans odeur. Viscosité maxima.

**Indications.** — Constipation opiniâtre, Appendicite, Colites, Hémorroïdes.

**Propriétés.** — Lubrifiant de l'intestin. Action mécanique.

**Dose.** — 1 cuill. à bouche le matin, avant le petit déjeuner; 1 cuill. le soir en se couchant.

**Laboratoire GILLOT**

59, Rue de Châteaudun — PARIS

## HYPNEURAL COS

C<sub>10</sub> H<sub>23</sub> O<sub>4</sub> Az 4 Na

Sel organique sodé, comportant le groupement hypnotique diéthyhé, et le groupement analgésique anilide (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>-NH-CO). Découvert en 1915 par H. Labbé.

**Forme.** — Cachets et comprimés. Boîtes de 20. Demi-boîtes de 10.

**Propriétés.** — Analgésique pris dans un liquide froid. — Hypnotique pris dans un liquide chaud (tisane, etc.).

**Indications.** — Insomnie essentielle ou due à la douleur. Douleurs rhumatismales (lumbago, sciatique, névralgies diverses). Surtout douleurs entraînant l'insomnie. L'Hypneural Cos permet de doser l'action analgésique et de la graduer au besoin jusqu'au sommeil.

**Doses et Mode d'emploi.** — 2 cachets ou comprimés en moyenne. Dans les insomnies graves, aiguës, jusqu'à 6 cachets ou comprimés le 1<sup>er</sup> soir (2 à 5 heures, 2 à 8 h., et si nécessaire 2 à 11 h., par exemple); puis doses décroissantes jusqu'à 1 seul les soirs suivants. Dans l'insomnie habituelle, chronique, doses croissantes jusqu'à obtention de l'effet désiré. Pas de toxicité à court terme, Pas d'accoutumance.

**LABÉLONYE & C<sup>ie</sup>**

90, Rue d'Aboukir — PARIS

## HYPODERMIE "LE PECQ"

Les USINES CHIMIQUES DU PECQ préparent et livrent en ampoules toutes les solutions hypodermiques strictement dosées et stérilisées.

**Ampoules :** 1 et 2 cc.

Par boîtes de 6, 12, 50, 100, 500, 1.000 ampoules.

**Ampoules massives :** 2 à 10 cc.

**Ampoules sérums :** 20, 30, 50, 125, 250, 500 cc.

**Ampoules eau bi-distillée :** 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 cc.

**Ampoules pour inhalations.**

Toutes les formules spéciales sont exécutées sur demande.

Laboratoire des USINES CHIMIQUES DU PECQ

39, Rue Cambon — PARIS

---

## HYPODERMOZONE

(Peroxydine injectable)

**Ampoules de 2 cc.** d'ozone stable à la température ordinaire. (*Voir fiche Entérozone*) pour usage hypodermique.

**Prop. thér.** — Bactéricide puissant. Antiseptique intestinal. Antithermique. Oxydant et régénérateur des globules sanguins. Cicatrisation rapide des plaies rebelles.

**Posologie et dose.** — Doit être employée dans les cas graves à raison d'une injection de 2 cc. chaque matin. Il est bon de faire boire en même temps au malade de l'*Entérozone* pour compléter le traitement.

**L. BORSON**

137, Rue de Rome — PARIS

# HYPOPHOSPHITES CHURCHILL

Sels de phosphore complètement assimilables, parce que non oxydés.

**Sirops et Ampoules** (Voir la fiche Ampoules Churchill).

**Limol Churchill.** — Sirop d'hypophosphite de chaux 6 gr. 20 par dose, dans Phosphaturie, Tuberculose, Asthénie, Diabète, Rachitisme, Dentition, Bronchites.

**Sorol Churchill.** — Sirop d'hypophosphite de soude : 9 gr. 20 par dose, mêmes indications mais en cas d'hypertension artérielle et d'âge avancé.

**Irol Churchill.** — Sirop d'hypophosphite de fer 9 gr. 10 par dose, dans Anémie, Chlorose, Aménorrhée, Dysménorrhée.

**Pollol Churchill** — Sirop d'hypophosphite composé dans la proportion des bases minérales de l'organisme avec méthylarsinate de strychnine : 1 mgr. par dose. Neurasthénie et dans tous les cas exigeant un reconstituant énergique.

Et tous autres sels : Manganèse, potasse, magnésie, ammoniac, etc.

**Dose pour adultes** — Une à deux cuillerées à soupe dans un peu d'eau après les deux principaux repas.

Le flacon..... 8 francs

(Prix réglementé)

Exiger la signature Churchill et la marque de fabrique de la

**Pharmacie SWANN**

12, Rue Castiglione — PARIS

Demandez-nous tous les renseignements que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage.

# IMMUNIZOLS GRÉMY

Vaccins microbiens curatifs  
atoxiques

A l'heure actuelle, on ne discute plus la vaccinothérapie : c'est une méthode thérapeutique rationnelle et qui a fait ses preuves. Mais, pour obtenir des vaccins vraiment efficaces, les plus grands soins doivent être apportés à leur préparation : choix et entretien des souches vaccinales, culture, récolte, stérilisation, contrôle, toutes ces opérations nécessitent une vaste installation créée *ad hoc*. C'est ce que nous avons réalisé dans nos Laboratoires qui occupent tout un immeuble (à Courbevoie, 9, rue de Metz), uniquement consacré à la fabrication des *Immunizols* et installé avec tous les perfectionnements désirables.

Un certain nombre d'*Immunizols* sont destinés à l'usage hypodermique seul, d'autres sont à double mode d'administration : voie sous-cutanée et voie buccale.

Les vaccins destinés à l'usage hypodermique sont délivrés de telle manière que la dose initiale soit de 1/2 c. c. (on ne doit jamais dépasser cette dose à la première injection) et la dose maxima de 2 c. c.

Les *Immunizols* destinés à l'absorption buccale sont présentés sous forme de comprimés, que l'on prend à la dose journalière de 8 à 12 comprimés, ce fractionnement assurant une bonne tolérance du vaccin.

Toutes les fois que l'on emploie un *Immunizol* à double mode d'administration (voie sous-cutanée et voie buccale), on peut avoir recours à un traitement mixte : dans les cas où, pour une raison quelconque, le médecin ne peut pratiquer une longue série d'injections, il pourra, après avoir fait 4 ou 5 injections, utiliser l'*Immunizol* en comprimés, destiné à l'absorption buccale.

14, Rue de Cléchy — PARIS (9<sup>e</sup>)

# INJECTION CLIN

## Strychno-Phospharsinée

### Composition :

Encodylate de soude . . . . .	0 gr. 65	} (formules par cc. 598 et 796).
Glycérophosphate de soude . . . . .	0 gr. 10	
Sulfate de strychnine . . . . .	1/2 mgr. ou 1 mgr.	

Cette préparation évite d'allier le glycérophosphate de soude au encodylate de strychnine, le dosage de la strychnine dans cette association réduisant l'élément arsenical à une proportion trop faible pour lui conserver un rôle thérapeutique. Le encodylate de strychnine est, en outre, un sel trop instable pour le faire figurer utilement dans une solution qu'on doit pouvoir stériliser et conserver. L'Injection Clin Strychno-Phospharsinée possède effectivement l'avantage d'une action thérapeutique des trois composants.

**Formes.** — L'Injection Clin Strychno-Phospharsinée est délivrée en boîtes de 6 ou de 12 ampoules de 1 cc.

**Mode d'emploi et posologie.** — L'Injection pratiquée en plein muscle n'est pas douloureuse. L'Injection sous-cutanée se montre plus souvent indolore. On injectera 1 cc. soit le contenu d'une ampoule, chaque jour ou tous les deux jours selon l'indication et l'urgence.

### Laboratoires CLIN

20, Rue des Fossés-St-Jacques — PARIS

# IODASEPTINE CORTIAL

Iodo Benzo Méthyl Formine (voir aussi Septicémine)

**Compos.** — Mono Urotropine iodobenzométhylée, cristallisée, dialysable, injectable, atoxique : aucune réaction locale ou générale. Tolérance sans réserve.

**Prop.** — Antiseptique, Antitoxinique, Antiscleux, Éliminateur.

**Indicat.** — Infections passives et Chroniques rebelles, Rhumatismes (Déformant, de Poncet); Bacillose, Syphilis, Scléroses.

**Formes.** — 1<sup>re</sup> Ampoules B, de 5 cc<sup>3</sup> dosées à 0,50 egr. d'Iodaseptine cristallisée : la boîte de 10 ampoules, 15 fr. — Ampoules A, de 2 cc<sup>3</sup> dosées à 0,20 (pour enfants), 10 fr. — Injections intraveineuses, musculaires ou sous-cutanées, même locales *ad lib.*, quotidiennes au besoin, (Voir notice technique). — 2<sup>e</sup> Comprimés B dosés à 0,50 egr., le flacon de 45 : 5 fr. — Comprimés A dosés à 0,20 egr., le flacon de 50 : 10 fr., pour traitement d'entretien ; dose des Iodures : 0,20 à 2 et 3 gr. *pro die*.

### Laboratoires CORTIAL

15, rue de Turenne — PARIS

## IODÉINE MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

**Propriétés.** — Action calmante de la toux, régularisateur du rythme respiratoire, anti-dyspnéique ; facilite l'expectoration.

**Indications.** — Toux, Emphysème, Asthme.

**Formes Pharmaceutiques :**

*Sirop.* — 0,04 egr. d'Iodéine par cuill. à soupe.

Dose : 1 à 3 cuill. par jour.

*Gouttes.* — X gouttes = 0,01 d'Iodéine crist.

Dose : X à XL gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée.

*Pilules.* — 0,01 egr. d'Iodéine par pilule.

Dose : 4 à 8 pilules par jour.

*Ampoules* (0,02 egr.) : 2 à 3 par jour.

**Laboratoire MONTAGU**

49, Boulevard de Port-Royal — PARIS

## IODÉYL FOURNIER

Combinaison iodo-organique d'iode  
et peptone pure

**Forme.** — Globules : 0,01 egr. iode métalloïdique combiné par globule.

**Dose.** — 3 à 6 globules par jour, à prendre aux repas.

**Indications.** — Celles de l'iode et des iodures : Adénopathies chroniques, Emphysème, Asthme, Artério-Sclérose, Syphilis.

En flacon de 60 globules : 5 fr. 50 le flac.

**Laboratoires FOURNIER Frères**

26, Boulevard de l'Hôpital — PARIS

# **IOLOGÉNOL PÉPIN**

Peptone iodée spéciale

Gouttes titrées. Supérieur à tous les produits similaires, aux iodures métalliques et aux vins et sirop iodés.

S'en différencie par : 1° L'absence d'acide iodhydrique libre ; 2° La grande stabilité des iodures organiques et la nature de leurs bases ; 3° La très grande proportion d'iode substitué (25 % de l'iode total au lieu de 0 à 8 %) ; 4° La très grande activité pharmacodynamique de l'iode sous cette forme.

Saveur agréable. Tolérance absolue.

Les études clinique et physico-chimique montrent que c'est la meilleure forme d'administration de l'iode et des iodures.

**Posologie.** — Enfants : 10 à 30 gouttes par jour ; adultes : 40 à 60 gouttes par jour, dans un peu d'eau, aux repas, en 2 fois. Syphilis : 100 à 120 gouttes par jour.

**PÉPIN & LÉBOUCQ**

à COURBEVOIE (Seine)

## **IODOMÉTINE**

Solution concentrée et titrée d'iodhydrate d'hexaméthylène tétramine.

Combinaison organique d'iode soluble et assimilable, 5 gouttes représentent un centigramme d'iode ; 20 gouttes agissent comme un gramme d'iodure alcalin.

**Dosage et mode d'emploi.** — Vingt gouttes en deux ou trois fois dans la journée, dans un peu d'eau pure ou sucrée.

**Prop. thér.** — Élimine l'acide urique et les toxines du sang. Active la sécrétion des bronches. Produit une suractivité leucocytaire et un réveil des fonctions glandulaires. Agit comme diurétique, tonique et dépuratif. Spécifique puissant contre la grippe.

**Indications.** — Goutte, Rhumatisme, Arthritisme, Asthme, Emphysème, Grippe, Auto-intoxication, etc.

**E. HAUTDIDIER**

37, Rue Galilée — PARIS



## IODONE ROBIN

Combinaison physiologique d'iode et de peptone de viande de bœuf.

Gouttes dont 20 = 1 gr. d'iodure de potassium.

**Doses et mode d'emploi.** — 10 à 40 gouttes à prendre en 2 fois aux repas dans un peu de boisson.

**Prop. thér.** — Dépuratif, reconstituant assimilable, non toxique, tolérance parfaite, jamais d'iodisme.

**Indications.** — Maladies par ralentissement de la nutrition; artério-sclérose; obésité; polysarcie; dégénérescence graisseuse; intoxications chroniques; asthme; emphyseme; rhumatisme; arthritisme; goutte; tertiarisme.

**Laboratoires M. ROBIN**

13, Rue de Poissy — PARIS

---

## IDO-THYROÏDINE CATILLON

**Forme :**

Tablettes de Catillon à 0, 25 de Corps Thyroïde, titré, stérilisé.

**Indications :**

Obésité, Goître, Myxœdème, Dermatoses.

**Doses :**

1 à 2 contre Myxœdème; 2 à 8 contre Obésité, Goître, Herpétisme, Ostéogénèse.

**Laboratoire CATILLON**

3, Boulevard Saint-Martin — PARIS

## IODOSTARINE " ROCHE "

Acide diiodo 6-7 élaïdique ou taririque diiodé du Professeur Arnaud (Communication à l'Académie des Sciences, Paris, CXLX, page 220), 47,56 % d'iode organique complètement assimilé, sans aucune saveur. Absorbé seulement dans l'intestin.

**Indic. Thér. :**

Remplace KI aux mêmes doses.

**Posologie et Mode d'emploi :**

*Iodostarine " Roche "* cachets, dosés à 0,25 egr. Adultes : 1 à 4 par jour, selon les cas.

*Iodostarine " Roche "* comprimés, dosés à 0,125 mgr. Adultes : 2 à 8 par jour, selon les cas; enfants : 1 à 4 par jour, selon l'âge. Les comprimés peuvent être absorbés très facilement avec un peu de liquide (eau, vin, thé ou café), au choix du malade.

*Iodostarine " Roche "* granulé, dosé à 0,25 egr. par mesure (intérieur de la capsule en aluminium). Adultes : 1 à 4 mesures par jour, selon les cas; enfants : 1/2 à 2 mesures par jour, selon l'âge.

Toutes ces préparations sont d'une blancheur immaculée.

N. B.— On prend l'Iodostarine " Roche " de préférence à la fin des repas.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**

21, Place des Vosges — PARIS

## IODURAL NOVAT

**Forme.** — Comprimés d'iodure de K. contenant un alealin qui neutralise les acides Iodique et Iodhydrique et évite le pyrosis, l'iodisme. — Se dissout immédiatement dans l'estomac.

**Indic. therap.** — Asthme, Emphysème, Artério-sclérose, etc.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 comprimés par jour, toujours à la fin des repas. Les avaler avec une gorgée de liquide : eau ou lait, sans les dissoudre.

**Laboratoires NOVAT**  
**MACON (S.-&-L.)**

---

## IODURASE

**Description.** — Capsules kératinisées contenant :

Iodure de potassium pur...	0 gr. 50
Levurine extractive.....	0 gr. 10

**Action thérapeutique.** — La même que celle de l'iodure mais sans iodisme grâce à l'action spécifique de la levurine et à l'enrobage qui ne libère l'iodure que dans le milieu alcalin de l'intestin. Dosage rigoureux, conservation indéfinie et facile à prendre.

**Indications.** — 1 à 6 capsules par jour dans l'artériosclérose, l'asthme, l'emphysème, l'arthritisme, la syphilis, le goître, l'obésité, le saturnisme.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**  
18, Avenue Hoche — PARIS

## IODURES SOUFFRON

Iodure de potassium (KI), Iodure de Sodium (NaI)

Chimiquement purs - Titrés - Inaltérables

Pas d'Iodisme

Solution à 1/15<sup>e</sup>. Une cuill. à potage contient  
1 gr. KI ou NaI.

Sirop à 1/20<sup>e</sup>. Une cuill. à potage contient  
1 gr. KI ou NaI.

Dragées à 0 gr. 25 chaque KI ou NaI. Ké-  
ratinisées ou non.

Gouttes à 1/5<sup>e</sup>. Une goutte contient 0,01 egr.  
KI ou NaI.

**Dose et Mode d'emploi.** — De 0,15 à 1 gr.  
par jour et plus.

**Prop. Thér.** — Vaso-dilatateur, Hypotenseur,  
Artério-sclérose, Hypertension, Syphilis  
Scléroses viscérales, Asthme, etc.

**Etablissements Albert BUISSON**

157, Rue de Sèvres — PARIS

## IONOÏDES

Métaux et Métalloïdes colloïdaux

(Procédé E. Fouard)

Ionoïde d'arsenic en ampoules de 1 et  
de 3 cc. pour injections intramus-  
culaires.

**Indic. thér.** — Anémies, Convalescence,  
Tuberculose, Grippe, Asthme, Furon-  
culose, Emphysème, toutes maladies  
infectieuses en général.

**“ IONOÏDES ”, DARRASSE, Pharmacien**

13, Rue Pavée — PARIS

## JÉCOL

**à base de Kinkélibah** (Combretacées)  
*Régulateur des trois fonctions essentielles  
hépatique, rénale, intestinale.*

**Composition.** — Kinkélibah (*Extrait mou aqueux*), Boldo, Evonymine.

**Forme.** — Cachets minuscules disposés dans des tubes de verre.

**Indications.** — Le *Jécol* possède une action directe et spécifique sur l'épithélium du foie, des reins et de l'intestin d'où ses propriétés cholagogues, diurétiques et laxatives et secondairement ses qualités toniques, dépuratives et antitoxiques, — utilisées avec succès non seulement dans les maladies du foie, mais encore dans de multiples affections rénales et gastro-intestinales, dans les toxiinfections, les autointoxications et les diathèses.

**Dose.** — *Traitement prophylactique (cure de Jécol).*

a) Cas habituels (Insuffisance et congestion hépatiques et constipation chronique.) Un cachet à la fin du repas du soir pendant une semaine sur deux ou trois.

b) Cas graves (Maladie du foie caractérisée). Deux à quatre cachets par jour à la fin des repas pendant deux à trois semaines, dans l'intervalle des accès.

*Traitement curatif :*

a) Cas moyens (maladies du foie non toxi-infectieuses). Deux à quatre cachets par jour dans un liquide quelconque, de préférence une eau minérale alcaline.

b) Cas graves (surtout maladies des Pays chauds).

Quatre à six cachets par jour et plus.

**Contre-indications.** — Néant.

Boîte de 30 cachets.

Echantillon médical et littérature sur demande adressée à

**Laboratoire du JÉCOL**

36, Rue Rivay — LEVALLOIS-PERRET (Seine)

## JUGLAND GMET

Extrait total du " Juglans Regia "

Préparation liquide sans alcool correspondant à 2 gr. de plante par cuill. à café.

**Doses et Mode d'emploi.** — 2 à 8 cuill. à café par jour dans eau, vin, lait, bière. 1/2 heure avant le repas.

**Prop. thér.** — Antiscrofuleux, Dépuratif, Régénérateur.

**Indications.** — Chlorose, Lymphatisme, Anémie prëtuberculeuse.

Littérature et échantillons sur demande au

**Service Médical des Produits GMET**

27, Faubourg Montmartre — PARIS (9\*)

Tél. Bergère 43.10

## KÉPHIR-SALMON

Ferments actifs

(Adopté depuis 1888 par l'Assist. Publiq. dans les Hôpitaux Tuberculeux, Cancer, Affections stomacales et intestinales, reconstituant. Aliment complet au maximum de digestibilité. Remplace avantageusement le lait dans le régime lacté.

### PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR.

Boîte de 40 doses pour 40 bouteilles 10 fr. 50

*Même objet que le KÉPHIR*

### LAIT CAILLÉ (YOHOURT)

Préconisé dans les cas d'intoxications intestinales

**Laboratoire du KÉPHIR-SALMON**

28, Rue de Trévis — PARIS

Tél. Gutenberg 49-78 — Livraisons quotidiennes

# KIPSOL

(en pilules)

Caëao pulv. et tannates actifs d'alealoïdes.

(Avantages curatifs des préparations belladonnées et opiacées à l'exclusion de leurs inconvénients.)

**Dose et Mode d'emploi.** — 2 à 7 pilules par jour, espacées au moins de deux heures.  
— Ces pilules, très petites, s'avalent facilement avec une gorgée d'eau et même sans aucun véhicule liquide.

**Prop. Thér.** — Spécifique des Coryzas accidentels ou chroniques, des toux, bronchites, coryza des iodures, grippe, etc.

**Indications.** — Préservatif et curatif des rhumes.

**BERTAUT-BLANCARD Frères**

64, Rue de La Rochefoucauld — PARIS

# KLUCHOL REMEAUD

à base de Benzoate d'Anethol solubilisé.

**Forme.** — Sirop d'un goût très agréable bien accepté des enfants. Non toxique.

**Propr. thérp.** — Antispasmodique puissant, calmant et curatif de la coqueluche, des toux coqueluchoïdes ou nerveuses, asthme, etc.

**Posologie.** — *Adultes* : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour.

<i>Enfants</i>	moins d'un an	2 à 4 cuill. à café p'jour.		
	1 à 5 ans	4 à 8	—	—
	5 à 10 ans	5 à 10	—	—
	au-dessus de 10 ans	8 à 10	—	—

**NOTA.** — L'innocuité absolue permet d'augmenter progressivement, et même de doubler les doses ci-dessus, jusqu'à l'obtention rapide de l'effet désiré.

**Laboratoire REMEAUD**

38, Grande-Rue — BOULOGNE-sur-SEINE

Téléphone 459

## KOLA GRANULÉE ASTIER

**Composition.** — Extrait de Kola granulé contenant tous les principes actifs de la noix fraîche : caféine, théobromine, combinaisons tannocaféiniques, rouge de Kola et tanins actifs.

**Prop. thér.** — Régulateur du cœur. Excitant musculaire. Reconstituant du système nerveux. Tonique général des forces intellectuelles et physiques.

**Indications.** — Neurasthénie, Dépression mentale, Adynamie cardiaque, Troubles fonctionnels cardiaques, Grippe, Convalescence des maladies infectieuses et maladies graves, Asthénie, Surmenage physique et intellectuel.

**Posologie.** — Dose moyenne : 2 cuill. à café par jour, à prendre tel que dans le creux de la main, ou en dissolution dans tout liquide aqueux.

Prix : 5 francs

**Laboratoires P. ASTIER**

45, Rue du Docteur Blanche — PARIS (16<sup>e</sup>)

## KRÉOFOS NOVAT

Créosote.....	0.10
Extrait d'opium .....	0.01
Arséniate de soude.....	0.001/2 mil.
Phosphate de chaux, q. s.	pr éteindre

**Forme.** — Capsules à base de Créosote dont la causticité est neutralisée par le Phosphate de Chaux, ce qui lui évite de corroder les muqueuses et permet la suralimentation.

**Indic. thérap.** — Toutes affections des bronches et de la poitrine.

**Mode d'emploi.** — 4 capsules par jour, 2 avant chaque repas.

**Laboratoires NOVAT**

à MACON (Saône-et-Loire)



# KYMOSINE ROGIER

(Anciennement Pegnine)

A base de Ferment lab et sucre de lait purifié. — Poudre blanche.

Rend le lait de vache absolument digestif, facilite la digestion du lait de femme chez le nouveau-né.

**Dose.** — Une cuillerée-mesure dans 200 cm<sup>3</sup> de lait tiède à 40°.

Une pincée dans une cuillerée à café d'eau avant chaque tétée.

Le flacon, 8 fr.

**Henry ROGIER**

Docteur en Pharmacie

19, Avenue de Villiers — PARIS

## LAB-LACTO-FERMENT

(Lab-Ferment et Digestion lactée)

**Présentation.** — Flacon de poudre blanche.

**Action thérapeutique du Lab-Ferment.** — Les travaux chimiques et cliniques de ces dernières années montrent que la mauvaise digestion du lait est liée à la diminution du *lab-ferment* dans la sécrétion gastrique. On peut par suite logiquement combattre cette mauvaise digestion du lait (intolérance, troubles gastro-intestinaux, vomissements), en le coupant avec une solution de *lab-ferment*.

**Dose moyenne.** — Pour adultes ou enfants : Une cuillère mesure par verre de lait (verre 1/6 litre environ).

Pour nourrissons : Une demi-cuillère mesure par biberon de lait (tous les biberons de la journée peuvent être ainsi coupés avec le *Lab-Lacto-Ferment*).

**Mode d'emploi.** — Mettre la dose indiquée de *Lab-Lacto-Ferment* avec environ une à deux cuill. à bouche d'eau froide bouillie. Dès que l'effervescence aura disparu, ajouter le lait froid ou tiède.

**Pharmacie du D<sup>r</sup> MIALHE**

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine

8, Rue Favart — PARIS

## LACCODERMES

Vernis semi-gras solubles à l'eau

*Prière de désigner la base :* Oxyde de zinc, Goudron de houille 5 %, 10 %, 15 %, Ichtyol, Stovalne, Ichthyol et stovalne.

**Prop. thérap.** — Assurent la perméabilité des sécrétions de la peau, favorisent l'excrétion des sérosités de l'épiderme, suppriment les inconvénients des pommades qui provoquent la macération de l'épiderme.

**Indicat.** — Eczémas papuleux, vésiculeux, parakératose psoriasiforme, eczéma prurigineux des enfants, dishydrose.

**Mode d'emploi.** — Les Laecodermes constituent le pansement de jour idéal et pratique pour le traitement des maladies de la peau.

**Laboratoires Pierre BRISSON & C<sup>ie</sup>**  
111, rue du Mont-Cenis — PARIS

---

## LACTIMASE

**Description.** — Comprimés de ferment lactique de 0 gr. 50 ; par flacon de 40 comprimés.

**Action thérapeutique.** — La *lactimase* détruit les microbes pathogènes de l'intestin par accaparement du milieu, action renforcée par la symbiose du bacille Bulgare et d'une levure spéciale.

**Indications.** — 4 à 8 comprimés par jour dans les intoxications intestinales, diarrhées, diarrhées vertes des nourrissons, constipation, dysenteries, entérites.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**  
18, Avenue Hoche — PARIS,

## LACTOBACILLINE

Comprimés de ferments lactiques  
sélectionnés

**Doses et Mode d'emploi.** — 3 à 9 comprimés par jour, avant ou après les repas. Aucun inconvénient à augmenter ces doses.

**Prop. Thér.** — Remplacement de la flore intestinale nocive par une flore bienfaisante.

**Indications.** — Auto-intoxication intestinale, entérites, diarrhées, dermatoses.

## LACTOBACILLINE

13, Rue Pavée — PARIS

---

## LACTOLAXINE FYDAU

Ferments lactiques laxatifs.

**Compos.** — Ferments lactiques sélectionnés, sels biliaires, agar-agar, naphtholphtaléine.

**Forme.** — Comprimés.

**Prop. thér.** — Supprime la constipation, les intoxications gastro-intestinales, les fermentations putrides; rétablit les fonctions normales de l'intestin sans la moindre irritation.

**Doses.** — 2 à 3 comprimés pour adultes pris le soir avec un peu d'eau sucrée.

Enfants, un comprimé suffit.

Se vend par boîtes de six tubes de six comprimés

Prix au public : 5 fr.

**Laboratoires Biologiques**

**André PÂRIS**

4, Rue de La Motte-Piequet — PARIS (15<sup>e</sup>)

## LACTOZYMASE B

Ferment lactique Bulgare.

Comprimés de 0,50 cgr.

**Prop. Thér.** — Antisepsie gastro-intestinale.

**Indications.** — Gastro-entérites, entérites mucomembraneuses, fièvre typhoïde, appendicite, grippe, constipation, diarrhées, dermatoses (furunculose, urticaire, acné, eczéma, etc.), migraines, rhumatismes, artério-sclérose, etc.

**Dose et Mode d'emploi.** — Adultes : 2 comp. après chaque repas avec dessert sucré. — Enfants : 1 comp. pris de la même façon.

**Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE**

5, Rue Ballu — Paris — Tél. Central 45-56

---

## LANTOL

**Description.** — Complexe colloïdal électrique à base de rhodium à 0 gr. 20 par litre en ampoules de 3 cc., par boîtes de 4 ampoules, et en capsules kératinisées pour la voie gastrique en flacons de 60 capsules.

**Action thér.** — Colloïde isotonique, non toxique et indolore. Provoque la baisse de la température, une sensation de bien-être notable et une hyperleucocytose considérable, suivie de la destruction des agents infectieux localisés ou disséminés dans l'organisme.

**Indications.** — 1 à 4 ampoules par jour en injections intramusculaires ou intraveineuses, dans toutes les septicémies, pneumonies, péritonites, scarlatines, typhoïdes et tous états infectieux. Les capsules servent à compléter et achever le traitement tout le temps nécessaire.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**

18, Avenue Hoche — PARIS

## LAXAGARINE

**Composition.** — Agar-agar sans addition d'aucun principe médicamenteux.

**Indications.** — Constipation chronique habituelle.

**Dose.** — *a*) Paillettes : 1 à 4 cuill. à café à chaque repas.

**Dose.** — *b*) Cachets : 1 à 4 cachets à chaque repas.

### LAXAGARINE BELLADONÉE

**Composition.** — Association de l'agar-agar avec la belladone.

**Indications.** — Constipation par spasme intestinal.

**Dose.** — *a*) Paillettes : 1 à 2 cuill. à café à chaque repas.

**Dose.** — *b*) 1 à 2 cachets à chaque repas.

### Laboratoires DURET & RÉMY

5, Avenue des Tilleuls — PARIS (18<sup>e</sup>)

---

## LAXATIF ORGEAT

**Forme.** — Le *laxatif orgeat* est une poudre finement granulée, mise, stérilisée, dans de petits sachets dosés (2 gr. 1/2). Délayé dans un peu d'eau il donne une véritable émulsion (loech) douce et agréable au goût.

**Dose et mode d'emploi.** — Prendre une dose le matin à jeun. Déjeuner immédiatement après en absorbant de préférence : thé, lait, café ou chocolat. La régularité et l'entretien des fonctions digestives et intestinales sont assurés avec une dose par semaine.

**Indications.** — Très apprécié par l'enfance, il agit doucement à la façon d'un véritable régulateur de l'estomac et des intestins sans engendrer de constipation. Convient également aux adultes.

Le coffret de 5 sachets dosés : 2 fr., impôt compris.

Coffret-Echantillon sur demande.

**Dépôt : A. GÉRAUDEL, Pharmacien**  
36, Rue Rivay — LEVALLOIS-PERRET

# LAXOPEPTINE GIRARD

Laxatif pour Enfants

Poudre à base de ferments de céréales, de citrate de soude et d'eupeptiques divers.

**Mode d'emploi.** — Une ou deux cuill. à café dans du lait ou de l'eau bouillie, le matin au réveil ou le soir au coucher. Doubler la dose pour les enfants de 2 à 7 ans.

**Prop. Thér.** — La Laxopeptine combat la constipation, régularise les fonctions digestives en assurant une bonne antisepticité intestinale.

**Indications.** — Gastro-entérites, ballonnement, gros ventre, vomissements, maladies aiguës, fébriles et toutes les affections ayant pour cause la constipation.

Prix du Flacon : 8 fr.

**A. GIRARD**

48, Rue d'Alésia — PARIS (14<sup>e</sup>).

## LEBNOL

**Compos.** — Ferment lactique filtré et stabilisé. Un comprimé de Lebnol équivaut à 3 cc de culture fraîche.

**Indic. thérap.** — Le Lebnol a donné des résultats remarquables par leur constance et leur activité dans le traitement des infections des voies digestives. Il agit remarquablement dans l'entérite. C'est un adjuvant de la thérapeutique de certaines néphrites toxiques où il agit en empêchant la formation de nouvelles toxines d'origine fermentative. Le Lebnol est également précieux dans le traitement de certains états hépatiques. Composition, schéma ; dans ces cas, la rapidité de son action n'est pas bien expliquée.

**Doses.** — Adultes : 3 à 6 par jour ; Enfants : 2 à 4 par jour ; Nourrisson : 1 par jour.

**N.-B.** — La longue conservation de ce produit en fait un médicament des plus utiles pour la médecine coloniale.

Littérature et échantillons sur demandes adressées directement aux Usines Thevenot.

Prix : la boîte de 48 comprimés en tube, 6 fr.

Ce produit est fabriqué par la Société des  
**Produits Pharmaceutiques THEVENOT — DIJON**  
 pour **M. GIRANO, Pharmacien**,  
 217, rue Lafayette — PARIS

## LÉCITHINE CLIN

Extraite de l'œuf

**Compos.** - Les lécithines du commerce renferment souvent une forte proportion de matières grasses de l'œuf qui en diminuent le titre en phosphore et, par suite, l'activité thérapeutique; elles peuvent également, lorsqu'elles sont mal préparées, être en partie décomposées et contenir des bases choliniques libres dont l'ingestion peut provoquer des accidents. La Lécithine Clin est de pureté garantie.

**Formes.** - Pilules de Lécithine Clin à 0,05 par pilule.  
Granulé de Lécithine Clin à 0 gr. 10 par cuill. à café.  
Tubes stérilisés de 1 cm<sup>3</sup> de Lécithine Clin à 0 gr. 05 par tube.

Tubes stérilisés de Lécithine Clin en association avec le fer, le galacol, la strychnine aux dosages usuels.

**Doses.** - Voie buccale : 20 à 30 egr. par jour.  
Voie hypodermique : 5 à 10 egr. (1 ou 2 tubes) par jour, en injection intramusculaire.

**Laboratoires CLIN**

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

---

## LECITHOSINE ROBIN

Lécithine naturelle ex-ovo

Granulé. — Pilules

**Dose et mode d'emploi :**

Granulé 1 à 3 cuillers-mesure.

Pilules 2 à 3 par jour.

**Indications :**

Neurasthénie, Phosphaturie, Tuberculose, Rachitisme, Diabète.

**Laboratoires M. ROBIN**

13, Rue de Poissy

PARIS

## LEVURASE

Produit biologique antitoxique, composé des ferments totaux purs et sélectionnés de la levure de bière.

(Méthode Pasteur)

Auto-intoxication, Estomac, Intestin, Peau, Cuir chevelu, Furonculose, Anthrax, Gastro-entérites, Diabète, Dermaloses, Eczéma.

**Présentation.** — Cachets de 1 gr. (représentant 50 gr. de levure de bière fraîche).

**Composition.** — Ferments totaux purs et sélectionnés de la Levure de bière non épurée (zymase de Büchner et de Rapp).

**Propriétés, Avantages.** — Pas d'intolérance, assimilation rapide, commodité d'absorption, faible volume. Supplée à l'insuffisance de toutes les glandes. Antitoxique, antistaphylococcique, conservation indéfinie.

**Indication.** — Furonculose, Anthrax, Entérites, Gastro-entérites, Obésité, Diabète, Constipation, Dermaloses, Eczéma, Lymphatisme, Rachitisme, Diarrhée, Dyspepsie, Kyés, Phlégmone, Aené.

**Posologie.** — De 3 à 6 cachets par jour, loin des repas.

**A. CHARMAISON**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe de l'Université de Paris

35, Avenue de Royat, 35

CLERMONT-FERRAND (P.-de-D.)

## LEVURINE EXTRACTIVE

**Description.** — Comprimés de 0 gr. 30 d'extrait sec de levure de bière en flacons de 50 comprimés.

**Action Thérapeutique.** — Contient sous un poids 35 fois moindre tous les principes actifs de la levure fraîche, auxquels elle-ci doit son activité, car ils agissent comme poisons vis à vis des microbes et surtout des staphylococques. Conservation parfaite et facilité d'absorption.

**Indications.** — 4 à 12 comprimés par jour dans les cas d'abcès, anthrax, aené, eczéma, furoncles, herpès, phlegmons et toutes affections de la peau.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**

18, Avenue Hoche — PARIS



## LIPOFÉINE

Médicament cupnéique.

**Comp. et Prop.** — Obtenue par combinaison de l'éther éthyldiiodobrassidique (lipoiodine) avec la caféine. La *Lipoféine* active le travail du cœur, abaisse la tension artérielle; elle fluidifie les sécrétions bronchiques, facilite l'expectoration, dissipe la dyspnée et régularise le rythme respiratoire.

**Indic.** — Etats dyspnéiques en général, plus particulièrement asthme et emphysème, catarrhes, bronchites et laryngites chroniq.

**Posologie et Forme pharmac.** — 1 à 4 comprimés par jour. Chaque comprimé contient 0 gr. 12 d'iode et 0 gr. 05 de caféine. Période de traitement de 15 à 25 jours.

Prix : Le tube de 15 comprimés 7 fr. 50

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND, Ph<sup>ien</sup>  
1, Place Morand — LYON

## LIPOGYRE CIBA

(Lipoiodine Hg)

Médicament iodo-mereurriel

**Comp. et Prop.** — Combinaison iodo-mereurrielle obtenue à l'aide de l'éther éthyldiiodobrassidique (lipoiodine), et réalisant l'association et la synergie médicamenteuse de l'iode et du mercure avec exaltation de l'activité thérapeutique de chacun de ces composants. Préparation se recommandant par sa bonne tolérance.

**Indicat.** — La syphilis dans ses diverses manifestations et particulièrement dans ses accidents tertiaires et secundo-tertiaires.

**Posologie et Forme pharmac.** — 1 à 8 comprimés par jour à prendre aux repas. Chaque comprimé contient 0 gr. 15 d'iode et 0 gr. 02 d'Hg.

Prix : Le tube de 20 comprimés 5 fr. 50

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND, Ph<sup>ien</sup>  
1, Place Morand — LYON

## LIPŒIDES H. I.

**Lipophosphatides de tous les organes**

**Formes :**

- 1<sup>o</sup> Ampoules huileuses pour injections hypodermiques (méthode de choix).
- 2<sup>o</sup> Pilules kératinisées.

**Adrénol Cortex, Adrénol Total,**  
**Androcrinol, Cardiocrinol,**  
**Cérébrocrinol, Entérocrinol,**  
**Gastrocrinol, Gynocrinol, Gynolutéol,**  
**Hémocrinol, Hépatocrinol, Hypophysol,**  
**Mammol, Néphrocrinol, Pancréol,**  
**Placentocrinol, Prostatocrinol,**  
**Pulmocrinol, Splénocrinol,**  
**Thymocrinol, Thyrol A.**

**Indications :**

Chaque lipœide constitue un aliment et un excitant, spécifique de l'organe dont il provient.

## POLYCRINOL

Association de lipœides.

## AFATYL

Médication iodée sensibilisée.

(Association d'iode et de lipœide thyroïdien). (Arthritisme, Obésité thyroïdienne, Rhumatisme chronique, Artériosclérose).

**Laboratoire de Biologie Appliquée**

**H. CARRION & C<sup>ie</sup>**

**V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie**  
**54, Faub. Saint-Honoré, PARIS (8<sup>e</sup>)**

## LIPIODINE CIBA

Iode organique assimiliable

**Composition et Propriétés.** — Ether éthyl-diiodo-brassicidique. — Corps contenant 41,1 % d'iode et se présentant sous forme d'une substance blanche, insipide, fondant à 37°. D'une élimination plus lente que les iodures de potassium et de sodium, la lipiodine remplace avantageusement ces deux médicaments à dose moindre avec une tolérance meilleure et sans accidents d'iodisme.

**Indications.** — Celles de l'iode et des iodures : Artério-Sclérose, Hypertension artérielle. — Affections des voies respiratoires, Rhumatisme chronique, Obésité, Goître, Scrofule, Adénopathies, Syphilis, etc.

**Posologie et Formes pharmaceutiques.** — Adultes : 1 à 7 comprimés par jour. Enfants : 1/2 à 3 comprimés (aux repas principaux).

PRIX :

Le tube de 20 comprimés, 5 fr. 50

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**

1, Place Morand, 1

LYON

## LIQUEUR LAVILLE

**Composition.** — Quino-colocynthisme et principes actifs de convallaria majalis, gentiane, scille, hermodactyle et fraxinus excelsior.

**Prop. théér.** — Spécifique de l'accès de goutte; exerce une action sédative sur la douleur; augmente l'élimination de l'acide urique.

**Forme.** — Vin médicamenteux.

**Dose et mode d'emploi.** — Cas aigus graves : une cuillère à café dans une tasse de thé 2 heures avant ou 4 heures après le repas. Recommencer quelques heures après s'il est nécessaire. En cas de douleurs modérées, une cuillère à café le matin à jeun pendant 3 jours.

## PILULES LAVILLE

A base de boies d'alkéhenge et de silicate de soude, les Pilules Laville sont prises dans les périodes intercalaires des accès, à la dose de 4 à 10 pilules par jour.

### Laboratoires CLIN

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

## LUSOFORME

(Formol saponiné)

1 cuillère à café ou 5 gr. = 1 gr. de Formol à 40 %.

**Lusoforme médical.** — Antiseptique général de 1/2 à 1 %.

**Lusoforme brut.** — Désinfectant et désodorisant de 2 à 5 %.

Le Lusoforme est un savon alcalin liquide contenant 20 % de formol et stérilisé à l'autoclave.

### CARTERET

15, Rue d'Argenteuil — PARIS

## MANGAÏNE

Bi-oxyde de Manganèse,  
chimiquement pur.

### Forme et Dose :

Tablettes (ou Pastilles) 0,14 de Bi-oxyde de Manganèse.

### Propriétés therap. :

Elles constituent la préparation la plus rationnelle pour l'assimilation rapide et efficace des sels de manganèse.

### Indicat. therap. :

Dyspepsies gastro-intestinales, Anémies.

### Dose :

4 à 6 pastilles (ou tablettes) par jour.

**Pharmacie SCHMIT**

71, Rue Sainte-Anne — PARIS

## MARINOL

Reconstituant Marin Inaltérable, de Goût Agréable.

Compos. — Eau de mer captée au large, stérilisée à froid; Iodalgol (iode organique); Phosphates calciques en solution organique; Algues marines iodifères avec leurs nucléines azotées; Méthylarsinate disodique.

5 cm (une cuill. à café) contiennent exactement 1 mgr. d'Iode et 1/4 de mgr. de méthylarsinate en combinaison physiologique.

Ni alcool, ni huile. Pas d'intolérance. Pas d'iodisme. Entièrement assimilable en été comme en hiver. Convient à tous les âges. Médication de durée illimitée. Goût très agréable. Meilleur succédané de l'huile de foie de morue dont il a la même origine marine.

Propriétés. — Reconstituant, Tonique, Dépurateur.

Indications. — Toutes manifestations de l'Anémie, du Lymphatisme, du Rachitisme et de la Scrofule. Tuberculoses pulmonaire, ganglionnaire et osseuse. Mal de Pott. Bronchites. Asthme. Convalescences. Neurasthénie. Maladies consomptives. Dyscrasies. Troubles de la croissance, etc.

Mode d'emploi et Doses. — Avant ou après les repas, pur ou dans un peu d'eau. Grandes personnes : 2 à 3 cuill. à soupe. Enfants : 2 à 3 cuill. à dessert. Nourrissons : 1 à 3 cuill. à café.

Prix réglementé : 8 fr. le flacon (sans impôt)

Remise sur commandes médicales : 40 %, franco de port et d'emballage.

**Laboratoires "LA BIOMARINE"**

à DIEPPE (Seine-Inférieure)

## MÉDICATION ARRHÉNIQUE SIMPLE

*Cacodylate de soude Clin, Métharsinate Clin*

Médication arsenicale organique non toxique

I. — *Cacodylate de soude Clin* :

*Gouttes Clin* 0 gr. 01 par 5 gouttes.

*Globules Clin* 0 gr. 01 par globule, enrobés au gluten.

*Tubes stérilisés Clin*, à 0 gr. 01, 0 gr. 02, 0 gr. 03, 0 gr. 05, 0 gr. 10 par  $\text{cm}^3$ .

**Dose.** — La dose moyenne est de 0,05 par jour, que l'on peut porter à 0 gr. 10 et à 0 gr. 15.

II. — *Métharsinate Clin*. (Méthylarsinate disodique chimiquement pur) :

*Gouttes Clin*, à 0 gr. 01 par 5 gouttes.

*Globules Clin*, à 0 gr. 01 par globule, enrobés au gluten.

*Tubes stérilisés Clin*, à 0 gr. 05 par  $\text{cm}^3$ .

**Dose.** — En moyenne 0 gr. 05 par jour.

Le traitement comprend généralement des périodes de huit jours environ alternant avec des périodes de repos d'égale durée.

**Laboratoires CLIN**

20, Rue des Fossés Saint-Jacques — PARIS

## MÉDICATION ARRHÉNIQUE COMPOSÉE

1<sup>re</sup> *Arsenic et Fer*

*Marzyle Clin* (Cacodylate de protoxyde de fer) : Renferme dans des proportions thérapeutiques l'arsenic et le fer au minimum d'oxydation.

*Gouttes Clin* à 0,025 par 5 gouttes.

*Globules Clin* à 0,025 par globule.

*Tubes stérilisés Clin* à 0,05 par  $\text{cm}^3$  (injection intramusculaire).

**Dose.** — De 5 à 10 cgr. par jour.

*Métharsinate de Fer Clin* (Méthylarsinate de fer).

*Gouttes Clin* à 0 gr. 01 par 5 gouttes.

*Globules Clin* à 0 gr. 01 par globule.

*Tubes stérilisés Clin* à 0 gr. 05 par  $\text{cm}^3$  (injection intramusculaire).

**Dose.** — 5 à 10 cgr. par jour.

2<sup>e</sup> *Arsenic et Mercure*

*Enérol* (Salicylarsinate de mercure) et *Tubes stérilisés Clin* de Cacodylate de Mercure.

3<sup>e</sup> *Arsenic et Gallacol*

*Tubes stérilisés Clin* de Cacodylate de Gallacol.

4<sup>e</sup> *Arsenic et Strychnine*

*Tubes stérilisés Clin* de Cacodylate de Strychnine.

**Laboratoires CLIN**

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

# MÉSOTHORIUM BUISSON

Solution de Bromure de Mésothorium pour injections hypodermiques, intra-veineuses ou interstitielles.

1<sup>re</sup> *Solution faible (concentration A)* : dosée à 1/4 de microgramme par c. c. Injecter de 1 à 3 c. c. par jour pendant une à deux semaines. Indications : artério-sclérose, états œsthéniques et anémiques, pré-tuberculeux.

2<sup>e</sup> *Solution moyenne (concentration B)* : dosée à un microgramme par c. c. Indications : Rhumatismes, goutte, manifestations blennorrhagiques (orchite, rhumatisme), sciatiques, anémies graves, leucémie, cancers. Injecter de 1 à 3 cc. par jour pendant 10 à 12 jours.

3<sup>e</sup> *Solution forte (concentration C)* : dosée à 2 microgrammes par c. c. S'emploie en injections interstitielles dans les cancers accessibles.

Stimulation puissante de l'organisme et de l'hématopoïèse. Décharges d'acide urique. Antinfectieux. Action analgésique.

**Etablissements Albert BUISSON**

157, Rue de Sèvres — PARIS

## MOKAVÈNE

Graines exotiques torréfiées

Imitation parfaite du café sans action sur le cœur.

**Dose.** — 1 cuillère à café par tasse d'eau bouillante.

**Prix :** 7 fr. la boîte de 500 grammes

**Comte René de GRAUWE**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe

16, Rue de Roeroy — PARIS

## MORRHUETINE JUNGKEN

**Forme et composition.** — Liqueur non alcoolique à base de glycérine pure contenant : iode métallique 0,015 mgr. Hypophosphites composés (NaO, CaO, Manganèse, Quinine) en tout 0,15 egr. par cuiller à soupe. Phosphate de soude : 0,15 egr.

Produit de composition fixe et stable, de goût très agréable; pas d'irritation des muqueuses; pas de troubles des fonctions gastriques. Très bien toléré en toutes saisons.

**Propriétés.** — Dépurateur, Tonique, Reconstituant.

**Indications.** — Anémie, lymphatisme, tuberculose, convalescences des maladies infectieuses, d'opérations et blessures de guerre.

**Doses et Mode d'emploi.** — Enfants : 1/2 ou 1/3 de verre à liqueur. — Adultes : 1 ou 2 verres à liqueur pur après les repas ou étendue d'eau au début des principaux repas.

Prix réglementé net : 6 fr. 50 la bouteille de 600 cm<sup>3</sup>

**Laboratoires J. DUHÈME**

105, Rue de Normandie — COURBEVOIE (Seine)

---

## MUSCULOSINE BYLA

Sue musculaire total, hyperactivé par les oxydases globulaires, les hormones spléniques, le manganol et les vitamines cardiohépatomusculaires.

**Dose et Mode d'emploi.** — Par cuillères à bouche aux repas, dans la boisson préférée, toujours *froide* ou *tiède*.

**Prop. thérap.** — Antibacillaire, Toninutritif, Excitant physiologique.

**Indications.** — Convalescence, Anémie, Tuberculose, Neurasthénie.

**Les Etablissements BYLA**

26, Avenue de l'Observatoire — PARIS



# MYCOLYSINE

du Docteur DOYEN

Solution colloïdale phagogène polyvalente. —  
Provoque la phagocytose. — Prévient et guérit  
la plupart des maladies infectieuses de l'homme.

**Formes et doses :**

Mycolysine buvable, 4 à 12 cuill. par jour.

Extrait de Mycolysine, 1 à 4 cuill. par jour.

Mycolysine injectable, ampoules de 10 cc.

**Indications.** — Action thérapeutique rapide dans  
les affections aiguës des voies respiratoires,  
dans les phlegmons profonds, les lymphan-  
gites infectieuses, les fièvres éruptives et la  
grippe, la méningite cérébro-spinale, etc...

**P. LEBEAULT & C<sup>ie</sup>**

5, Rue Bourg-l'Abbé — PARIS (3<sup>e</sup>)

---

# NARSENOL

Novarsenobenzol destiné à être admi-  
nistré par voie buccale, sous forme  
de comprimés dosés à 0 gr,10.

Grâce à un enrobage spécial, le médi-  
cament conserve intégralement son  
activité et ne se dissout que dans l'in-  
testin.

La dose moyenne est de 1 à 4 comprimés  
par jour, qu'on avale comme des pilu-  
les, sans les diviser.

**Principales applications.** — Anémie perni-  
cieuse, angine de Vincent, dermatoses, palu-  
disme, pian, entérite rebelle, fièvre récur-  
rente, spirochétose, amibiase, grippe etc.

Littérature sur demande.

**Etablissements POULENO Frères**

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

## NÉO-ARSYCODILE

Méthylarsinate disodique  
(Syn. Arrhénal)

**Indic. thér.** — Tous les avantages de l'arsenic organique. Plus particulièrement destiné à l'usage interne par la voie gastrique.

**Doses et mode d'emploi.** — *Pilules* à 0,01, 4 à 5 par jour aux repas, pendant 12 jours, repos 8 jours et reprise. *Ampoules* à 0,05, même usage que pour l'ARSYCODILE et spécialement dans le paludisme.

**Docteur M. LEPRINCE**

62, Rue de la Tour — PARIS (16<sup>e</sup>)

---

## NEO-RHOMNOL

Rhomnol Strychno-Arsénié  
(Nucléinate de Strychnine défini  
et Cacodylate de Soude)

**Indic. Thér.** — Neurasthénies, Grippe, Convalescences, Intoxications, Dépressions nerveuses, Etats cachectiques, Suites d'infections, etc.

**Mode d'emploi.** — Tous les jours une ampoule, deux dans les cas graves. Habituellement, la boîte de 12 étant terminée, on institue un repos d'une semaine, suivi de la reprise des piqûres, si c'est nécessaire.

**Dr M. LEPRINCE**

62, Rue de la Tour — PARIS (16<sup>e</sup>)

## NÉOL

**Constitution.** — Préparation aqueuse peroxy-sulfatée, d'origine électrolytique, constituant une solution auto-génératrice d'Ozone naissant.

**Propriétés.** — Aucune toxicité, antiseptique-cicatrisant, essentiellement cytophyllactique, kératoplastique et décongestif.

**Indications.** — Brûlures par le feu, le radium ou le froid, Ulcérations cutanées et muqueuses. Plaies phagédéniques, Métrites, Angines, Pharyngites.

**Mode d'emploi.** — L'eau néolée (*Néol 1 partie, eau 4 parties*) remplace avantageusement l'eau oxygénée dans toutes ses indications — Atouchements, badigeonnages (Angines, Stomatites, Laryngites, Métrite et Endométrite) : *Néol pur*. — Pansements (Brûlures, Plaies diverses) : *Eau néolée*. — Gargarismes : *Deux cuill. à soupe par verre d'eau*. — Injections, grands lavages : *Quatre cuill. à soupe par injection de deux litres d'eau*.

**Prix :** le grand flacon de 375 gr. 6 fr. 50 (impôt compris).  
— le petit flacon de 125 gr. 4 fr. —

## NÉOLIDES

**Compos.** — Néolides = Néol solide; se différencient du produit liquide par leur réaction alcaline spécialement adaptée à l'antisepsie gynécologique, ce qui en limite l'emploi aux lavages et injections vaginales exclusivement.

**Propriétés.** — Par leur constitution percarbonatée source d'oxygène naissant, ils ne peuvent être irritants ou toxiques comme les produits à base de formol, alun, etc. Ils remplacent économiquement le Néol liquide et ont toutes les indications et qualités du Permanganate de Potasse sans tacher. Discrètement parfumés leur emploi est pratique et agréable. Pour le médecin c'est l'antiseptique scientifique et rationnel.

**Prescrire pour soins intimes et hygiéniques** 1 Néolide par litre; pour Métrite, Leucorrhées, etc. : 2 Néolides par litre. Bien recommander de dissoudre d'abord le comprimé dans une petite quantité d'eau, mais bouillante ou très chaude.

**Prix :** la boîte de 60 comprimés 7 fr. 50 net.

**Laboratoires du NÉOL**

9, Rue Dupuytren — PARIS (6<sup>e</sup>)

Téléph. Fleurus : 13-12

## NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de quinine pur

**Propriétés.** — Rapidement absorbée, se montre à doses égales, plus active que les sels ordinaires de quinine. — Action tonique, à petites doses, par ses deux éléments.

**Formes.** — 1<sup>re</sup> Cachets de Néoquinine Falières, 0 gr. 25 par cachet.

2<sup>re</sup> Suppositoires de Néoquinine Falières à 0 gr. 15 par suppositoire (chaque suppositoire ne pèse que 2 gr.).

Enfants : 1 suppositoire; Adultes : 2 après avoir assuré la vacuité du rectum.

3<sup>re</sup> Pilules de Néoquinine Falières, 0 gr. 10 par pilule.

4<sup>re</sup> Tubes stérilisés de Néoquinine Falières, 0 gr. 50 par cm<sup>3</sup>.

### Néoquinine arsinée Falières

Glycérophosphate et méthylarsinate de quinine

**Formes.** — 1<sup>re</sup> Cachets de Néoquinine arsinée Falières, 0 gr. 25 par cachet.

2<sup>re</sup> Capsules de Néoquinine arsinée Falières à 0 gr. 10 par capsule.

3<sup>re</sup> Tubes stérilisés de Néoquinine arsinée Falières, 0 gr. 50 par cm<sup>3</sup>.

### Laboratoires CLIN

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

## NEURÈNE

En 1904 et 1905, le Prof. Pouchet et Chevallier démontrent que l'acide valérianique et ses sels sont physiologiquement inactifs. En 1906, le Prof. Brisseau découvre l'éther de bornyl (du Cornéol soluble).

**Principe actif de la Valériane. Sans odeur**

**Solution** contenant 0 gr. 10 de Bornéol soluble par cuill. à café. Une cuill. à café de Neurène contient la partie active de 150 gr. de racine sèche de Valériane.

**Doses.** — Adultes : 3 à 5 cuill. à café par jour. —

Enfants : 1 à 3 cuill. à café par jour, selon l'âge.

**Mode d'emploi.** — Chaque cuill. à café dans 1/4 de verre d'eau sucrée froide et aromatisée à la fleur d'oranger.

**Prop. Thér.** — Régulateur et tonique des centres nerveux.

**Indications.** — Toutes les Affections nerveuses, Neurasthénie, Hystérie, Spasmes, Insomnies nerveuses...

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**

8, Rue de la Source — PARIS (16<sup>e</sup>). — Tél. Aut. : 06-62

## NEURINASE

Solution ou comprimés à base de Valériane fraîche et de Véronal pur solubilisé. Renferme 0 gr. 15 de Véronal par comprimé ou cuill. à café de solution.

A) **Dose et Mode d'emploi.** — 1<sup>o</sup> Sédatif : 1 cuill. à café ou 1 comprimé matin et soir dans de l'eau sucrée. — 2<sup>o</sup> Hypnotique : De 1 à 4 cuill. à café le soir au coucher. Enfants : 1/2 dose.

B) **Prop. Thér.** — Régulateur du système nerveux contre Insomnies, Mélancolie, Hystérie, Epilepsie, Troubles névropathiques de la Ménopause, Maladies de Basedow, Tics, Délires toxiques, Palpitations, Surmenage, Prurit, etc.

Contre indication : Néant. — Prix : 7 fr.

**Laboratoire A. GENEVRIER**

2, Rue du Débareadère — PARIS

---

## NEUROSINE PRUNIER

(Phospho Glycérate de Chaux, Procédé G. Prunier)

**Prop. Thér.** — Reconstituant du système nerveux.

**Mode de Présentation.** — La "Neurosine Prunier" est présentée sous trois formes : granulé, cachets, sirop.

**Indications.** — Neurasthénie, Phosphaturie, Rachitisme, Débilité, Surmenage, etc.

**Posologie.** — 2 à 3 cuill. à café par jour de granulé; 2 à 3 cachets par jour; 2 à 3 cuill. à bouche par jour de sirop. Chaque cuill. à café de granulé, chaque cachet et chaque cuill. à bouche de sirop contiennent 0 gr. 30 de Glycérophosphate de Chaux (Procédé G. Prunier).

**G. PRUNIER & C<sup>ie</sup>, (Maison Chassaing)**

6, Rue de la Tâcherie — PARIS

## NEUROTROPHOL BYLA

Elixir ou Granulé à base de Nueléinate de soude, de Méthylarsinate disodique, de glycéro-phosphate de soude et d'extrait total de glande orchéique et interstitielle.

**Doses et Mode d'emploi.** — *Elixir* : 1 verre à liqueur *après* chaque repas pour les adultes, 1 cuillerée à dessert ou à café pour les enfants. *Granulé* : 1 cuillerée à bouche *avant* chaque repas pour les adultes ; 1 cuillerée à café pour les enfants.

**Prop. therap.** — Tonique neuro-musculaire. Excitant de la nutrition.

**Indications.** — Neurasthénie, Surmenage, Dépression, Sénilité, Asthénie musculaire, Insuffisances génitales.

**Les Etablissements BYLA**

26, Avenue de l'Observatoire — PARIS

## NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

A base de Glycérophosphates de soude, de potasse et de magnésie. Ne contient ni chaux, ni sucre, ni alcool.

**Forme.** — Gouttes concentrées, 20 gouttes contiennent 0,40 cgr. de glycérophosphate composé à base de soude, de potasse et de magnésie.

**Dose.** — XV à XX gouttes à chaque repas dans le premier verre de boisson.

**Propriétés.** — Reconstituant rationnel par suite de sa composition qui est celle des éléments mêmes de l'organisme : Soude = Plasma sanguin ; Potasse = Tissus nerveux ; Magnésie = Substance grise.

**Indications.** — Neurasthénie, Paralysie générale, Dépression et Fatigue nerveuses, Surmenage, Anémie cérébrale, Vertiges, Convalescence, etc.

Aucune contre-indication

**Laboratoire FREYSSINGE**

6, Rue Abel — PARIS

## NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET

Préparation à base d'extrait de Guaco ; doit être employé "INTUS & EXTRA" — action physiologique à l'intérieur, sur les centres nerveux sensitifs et sur la sécrétion rénale à l'extérieur ; sur les terminaisons des nerfs de la sensibilité générale.

**Indications.** — Prurit, Dermatoses, Névralgies.

### *Traitement interne :*

**Pilules** Nisaméline "TROUETTE-PERRET" (0 gr. 10 Extrait de Guaco).  
2 à 5 pilules à chacun des deux repas.

**Sirop** Nisaméline "TROUETTE-PERRET" (0 gr. 20 Extrait de Guaco).  
1 à 2 cuillerées à soupe à chacun des deux repas.

### *Traitement externe :*

**Poudre** Nisaméline "TROUETTE-PERRET".

1/2 flacon ou 1 flacon, pour un grand bain. — 1 à 4 cuillerées à café pour 1/2 litre d'eau froide ou tiède, pour lotions, compresses, etc.

**Pommade** Nisaméline "TROUETTE-PERRET".

En onctions pour prurits et dermatoses localisés.

**Savon** Nisaméline "TROUETTE-PERRET".

Pour lavages et soins hygiéniques.

Bien spécifier : NISAMÉLINE "TROUETTE-PERRET" pour avoir le véritable Guaco.

**Etablissements TROUETTE & Cie**

15, Rue des Immeubles-Industriels — PARIS (11<sup>e</sup>)

## NOVARGYRE

(Ampoules Guillaumin  
à l'oxycyanure d'hydrargyre indolore)

**Compos.** — Les ampoules de Novargyre contiennent : Oxycyanure d'hydrargyre : 1 centigr. ; Stovaine : 1 centigr. ; Eau distillée : 1 cm. cube.

**Propr.** — Solution très stable, rigoureusement dosée, neutre, indolore, ne coagulant pas les albuminoïdes, d'une action très prompte et très sûre.

**Indicat.** — Accidents syphilitiques.

**Mode d'emploi.** — Injections intra-musculaires tous les deux jours de 1 à 2 cc. selon l'intensité de la maladie ou la susceptibilité du sujet. Faire huit à douze injections et laisser reposer le malade pendant une ou deux semaines. Renouveler ensuite le traitement s'il est nécessaire.

Laboratoires André GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi — PARIS

---

## NOVARSENOBENZOL

Dioxydiaminoarsenobenzol-méthylène  
sulfoxylate de soude

Mêmes indications que l'Arsenobenzol

S'emploie principalement dans la syphilis en injections intra-veineuses, à doses progressives de 0 gr. 15 à 1 gr. 05. Soluble dans l'eau distillée; il n'y a pas lieu d'alcaliniser les solutions.

Peut également être utilisé en injections intramusculaires, en lavements et comme topique local (Angine de Vincent, etc.).

Littérature sur demande

Etablissements POULENC Frères

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS



## NUCLÉARSITOL ROBIN

Association de la combinaison végétale nucléophosphatée avec le méthylarsinate Nucléophosphate de chaux et de soude méthylarsiné.

**Comprimés.** — Ampoules injectables.

**Doses et Mode d'emploi.** — Adultes : 4 à 6 comprimés ou 1 à 2 injections hypodermiques par 24 heures.

**Prop. Thér.** — Antituberculeux, Reconstituant puissant.

**Indications.** — Cachexie des pays chauds, fièvres paludéennes, syphilis, tuberculose, scrofule, lymphatisme.

**Laboratoires M. ROBIN**

13, Rue de Poissy — PARIS

---

## NUCLÉATOL ROBIN

Combinaison de Nucléophosphates d'origine végétale

**Granulé :** Nucléophosphate de chaux et de soude.

**Injectable :** Nucléophosphate de soude pur.

**Doses et mode d'emploi.** — Adultes : 4 à 6 cuill. mesures de granulé aux repas ou 1 ou 2 ampoules en injection par 24 heures.

**Prop. thér.** — Exaltant de la Phagocytose, abaisse la température en quelques heures. Effets analogues à ceux des ferments métalliques ou les colloïdes.

**Indications.** — S'emploie dans les convalescences, les débilités, les cachexies; provoque la défervescence dans les fièvres infectieuses, puerpérales, érysypèles, typhoïdes, etc.; s'emploie aussi préventivement dans les opérations chirurgicales.

**Laboratoires M. ROBIN**

13, Rue de Poissy — PARIS

## NUCLÉO-FER GIRARD

**Forme.** — Pilules de 0 gr. 10 de Nueléinate de fer, exemptes de produits provenant de la désintégration du noyau nucléinique (créatinine et bases xanthiques).

**Propr. thérap.** — Les expériences faites par le Docteur Dor et poursuivies dans les Hôpitaux de Paris ont prouvé :

1<sup>o</sup> qu'il accroit en quelques jours, de 30 à 90 % la teneur des globules en hémoglobine.

2<sup>o</sup> que le Nueléo-Fer était de tous les ferrugineux, le mieux supporté par les estomacs de chlorotiques.

**Indications.** — Anémie et plus spécialement l'Anémie nerveuse.

Prix : le flacon de 80 pilules, 5 fr.

Laboratoire A. GIRARD

48, rue d'Alésia — PARIS

---

## NYCTAL

Comprimés

**Compos.** — Bromdiéthylacétylurée.

**Action.** — Réunit l'action hypnotique des produits du groupe "Véronal" et l'action sédative des bromures.

**Indications.** — Toutes les insomnies ; affections nerveuses et mentales.

**Forme pharmaceutique.** — Comprimés dosés à 0,35 de Bromdiéthylacétylurée.

**Doses.** — Action sédative : 1 comprimé toutes les 4 heures.

Action hypnotique : 2 à 3 comprimés le soir dans une infusion chaude.

Laboratoires DURET & RÉMY

5, Avenue des Tilleuls — PARIS (18<sup>e</sup>)

# OCRÉINE GRÉMY

Extrait de corps jaune de l'ovaire.

Diagnostic facile et sûr de tous les troubles  
menstruels (1).

Quelles que soient leur nature, leur intensité, leur fréquence, les troubles menstruels ont pour seules causes soit l'insuffisance ovarienne, soit l'insuffisance thyroïdienne. Ils cèdent à l'administration opportune de l'Ocréine ou de la Thyrénine.

Le diagnostic entre l'une et l'autre insuffisance dépend uniquement de la fréquence, de l'abondance et de la durée de l'écoulement.

Troubles Menstruels	CAUSES	TRAITEMENT
<i>Règles rares ..</i>	Insuffisance ovarienne	<b>OCRÉINE GRÉMY</b>
<i>Règles peu abondantes ..</i>	Id.	Deux à cinq pilules tous les jours pendant les huit jours qui précèdent les règles et pendant tout le temps que dure l'écoulement sanguin.
<i>Règles douloureuses</i>	Id.	Gouttes d'Ocréine.
<i>Accès d'oppression, palpitations, bouffées de chaleur ..</i>	Id.	Dix gouttes correspondant à une pilule.
<i>Règles fréquentes ..</i>	Insuffisance thyroïdienne	<b>THYRÉNINE GRÉMY</b>
<i>Règles abondantes.</i>	Id.	Une pilule par jour pendant deux jours, puis alternativement une et deux, puis deux pilules par jour.
<i>Règles de trop longue durée ...</i>	Id.	Le traitement commencera huit jours après la fin des dernières règles et se prolongera jusqu'à la fin de la période menstruelle suivante.
<i>Migraines, maux de tête, nervosité, douleurs rhumatismales ...</i>	Id.	Recommencer huit jours après jusqu'à cessation des troubles. (Tablettes : doses doubles).
<i>Amenorrhées ...</i>	Insuffisance ovarienne et insuffisance thyroïdienne associées.	<b>THYRÉNINE &amp; OCRÉINE</b>
		Une à quatre pilules d'Ocréine, et une à deux pilules ou deux à quatre tablettes de Thyrénine pendant vingt jours par mois.

(1) Nous ne comprenons sous cette dénomination que les troubles de la période cataméniale en dehors de tout état pathologique, c'est-à-dire en exceptant tous les cas où une tumeur ou une infection en sont la cause première.

## ŒNOPHOS

*Acide ortho-phosphorique vital*  
*Reminéralisation phospho-dolomitique*

Méthode des Professeurs DUBARD et VOISENET, de Dijon.

**Prop. thér.** — Neurotonique. Reconstituant énergétique; *fixateur électif* de la Magnésie (voir fiche *DOLOMA*). Médication phosphorique rationnelle.

**Indications.** — Phosphaturie, neurasthénie, psychasthénies, surmenages physique et nerveux, *cancers, tuberculose*.

**Doses et mode d'emploi.** — A chaque repas : 1 cuill. à soupe d'*Elixir* ou 2 cuill. à café de *Granulé*.

Pour la cure reminéralisante, voir '*DOLOMA*'.

*Granulé* : le flacon, 14 fr. (impôt compris).

*Elixir* : le flacon 18 fr. (impôt compris).

**L. GUICHARD**, Pharmacien 1<sup>re</sup> classe

2, Rue de l'Hôpital-Saint-Louis — PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone Nord : 84-19

## OLÉOLAXINE

**Composition :**

Huile de paraffine chimiquement pure préparée pour l'usage interne et aromatisée à l'essence d'anis.

**Action :**

Mécanique et lubrifiante.

**Indications :**

Constipation chronique habituelle.

**Dose :**

Une à deux cuill. le matin à jeun et le soir en se couchant.

**Laboratoires DURET & RÉMY**

5, Avenue des Tilleuls — PARIS (18<sup>e</sup>)

## OPHTALMINE

**Indic. therap.** — Antisepsie oculaire.  
Cataracte, Conjonctivites, Presbytie  
prématurée, etc.

**Doses et Mode d'emploi.** — Pommade,  
deux applications par jour.

**Docteur M. LEPRINCE**

62, rue de la Tour

PARIS (XVI<sup>m</sup>)

---

Ce n'est pas nous que vous devez remercier, si cet ouvrage vous rend service, ce sont les Spécialistes qui en font les frais. Et vous ne pouvez mieux le faire qu'en prescrivant leurs produits.

# OPOCALCIUM DU D<sup>r</sup> GUERSANT

## Polyopothérapie - Reminéralisation

**Composition.** — Extrait sec des glandes à sécrétion interne : Parathyroïde, surrénale, thymus ; poudre d'os frais, sels calciques, fluorure de calcium, silice, manganèse, magnésie.

**Formes.** — Cachets et comprimés.

**Prop. therap.** — La déminéralisation est toujours due à la déficience des glandes endocrines : Parathyroïde, surrénale, thymus. Ces glandes régissent le métabolisme dans l'économie de tous les minéraux. Par leur action, l'*OPOCALCIUM* assure la reminéralisation totale.

Pour réaliser une méthode thérapeutique rationnelle, les minéraux associés aux extraits de glandes sont d'origine organique, par conséquent à orientation vitale ; leur fixation est par conséquent assurée : Os frais et sels calciques (rendus assimilables selon la formule Ferrier).

**Indications.** — Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Débilité, Anémie, Croissance, Convalescence, Lymphatisme, Rachitisme, Fractures, Carie dentaire.

**Doses et mode d'emploi.** — 1 à 3 cachets ou 4 à 5 comprimés par jour, au début des repas.

*Enfants* jusqu'à 10 ans : 1 cachet ou 2 à 3 comprimés par jour.

Au-delà de cet âge, 2 à 3 cachets ou 4 à 5 comprimés par jour.

Exceptionnellement et sur indication expresse du médecin, jusqu'à 6 cachets par jour.

Dans un peu de lait froid ou d'eau, matin et soir, ou début des repas : matin, midi et soir.

La boîte de 30 cachets : 8 fr. 80 (impôt compris)

**Laboratoire de l'OPOCALCIUM**

**Albert RANSON**

Docteur en Pharmacie

121, Avenue Gambetta — PARIS (20<sup>e</sup>)

(Télép. : Roquette 80-31)

# OPOTHÉRAPIE VIGIER & HUERRE

Docteur ès-sciences

12, Boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS

Préparations renfermant les organes en nature, sans qu'ils aient subi aucune modification chimique ou thermique susceptible de détruire tout ou partie de la substance active.

Capsules ovariques. — Dosage 0,20 cgr. de substance ovarienne pure.

Capsules orchitiques. — Dosage 0,20 cgr.

Capsules de corps thyroïde. — Dosage 0,10 cgr. et 0,05 cgr.

Capsules surrénales. — Dosage 0,25 cgr.

Capsules de thymus. — Dosage 0,30 cgr.

Capsules pancréatiques. — Dosage 0,50 cgr. et 0,05 cgr.

Capsules prostatiques. — Dosage 0 20 cgr.

Capsules hépatiques. — Dosage 0,30 cgr.

Capsules galactogènes. — Dosage 0,30 cgr. de placenta.

Ces capsules s'ordonnent à la dose de 2 à 6 par jour, au moment des repas.

---

Le "DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES" deviendra le pendant du "FORMULAIRE MAGISTRAL" sur le bureau du médecin.

# OPOTHÉRAPIE CHOAY

## 1° OPOTHÉRAPIE UNIGLANDULAIRE :

### Extraits totaux CHOAY

Poudres obtenues par dessiccation rapide des tissus glandulaires, dans le vide profond et à froid. Équivalent aux organes frais dont elles ne diffèrent que par simple élimination d'eau. (CHOAY, *Des extraits opothérapiques*, Vigot, éditeur, Paris).

Le thérapeute dispose de tous extraits : Bile, Cérébral, Corps Jaune, Entérique, Gastrique, Hématique, Hépatique, Hypophysaire (glandes totales, lobes antérieurs ou lobes postérieurs), Mammaire, Moelle épinière, Moelle osseuse, Myocardique, Orchitique, Ovarien, Pancréatique, Entéro-Pancréatique, Parathyroïdien, Placentaire, Prostatique, Pulmique, Rénal, Sérum sanguin, Splénique, Surrénal (glande totale ou substance corticale), Thymique, Thyroïdien.

**Prescrire :** (A) Voie *digestive* Comprimés, ou cachets, ou pilules CHOAY, à l'extrait (indiquer la sorte).

**Doses :** Adultes de 2 à 8 par jour aux repas. Enfants de 10 ans, la moitié; de 5 ans le tiers; de 2 ans 1/2, le quart des doses d'adultes.

(B) Voie *injectable* : Ampoules CHOAY à l'extrait (indiquer la sorte).

**Doses :** Généralement une ampoule de 1 cc. tous les deux jours, sauf dans certains cas spéciaux (obstétrique, gynécologie, etc.).

## 2° OPOTHÉRAPIES ASSOCIÉES :

### Syncrines CHOAY

Les troubles des glandes endocrines sont presque toujours complexes par synergie des sécrétions internes.

Pour combattre ces troubles le praticien dispose d'extraits opothérapiques associés, les Syncrines, dont les formules correspondent aux cas les plus fréquents de Syndromes pluriglandulaires.

**Prescrire :** Comprimés, ou cachets, ou ampoules Syncrines CHOAY, formule n°

**Syncrines CHOAY :** N° 1, Pluriglandulaire — N° 2, Surréno-Hypophysaire — N° 3, Thyro-Surréno-Hypophysaire — N° 4, Thyro-Ovarienne — N° 4 bis, Surréno-Ovarienne — N° 5, Thyro-Orchitique — N° 5 bis, Surréno-Orchitique — N° 6, Hypophyso-Orchitique — N° 6 bis, Hypophyso-Ovarienne — N° 7 Thyro-Hypophyso-Ovarienne — N° 7 bis, Thyro-Hypophyso-Orchitique — N° 8, Peptosthénie (glandes digestives).

**Doses :** Voies *digestives*, 2 cachets ou comprimés par jour, aux repas. — Voie *injectable*, généralement une ampoule tous les deux jours.

### Laboratoire CHOAY

44, Avenue du Maine — PARIS (Télég. Roux 13-07)



## OPOTHÉRAPIE FOURNIER

Extraits totaux préparés à froid dans le vide

**Endocrisines** (voir ce mot). — Tous organes : Thyroïde, ovaire, hypophyse, glande mammaire, surrénale, foie, rein, thymus, testicule, pancréas, placenta, etc.

**Forme.** — 1<sup>o</sup> *Cachets* à toutes doses (sur demande médicale).

**Doses** usuelles toutes préparées. — Thyroïdine, 0,025 mgr., 0,10 cgr. ; ovarine, 0,10 cgr. ; orchitine, 0,20 cgr. ; surrénale, 0,10 cgr. ; hypophyse, 0,10 cgr. ; foie, 0,50 cgr. ; rein, 0,25 cgr.

Prix : La boîte, 8 fr. ; 10 fr. ; 12 fr.  
selon dosage

*Cachets pluri-glandulaires*

M, sexe masculin.

F, sexe féminin.

Trouble de croissance, infantilisme, arriération.

2<sup>o</sup> *Ampoules* :

Thyroïde. Ovaire. Surrénale. Hypophyse. Orchitine. Rate. — Association hypo-surrénale. Asthme. — Hypophyse lobe-postérieur, usage obstétrical.

**Formules** : Endocrisines, glande injectable Fournier.

Prix : 8 fr. 50

**Laboratoires FOURNIER Frères**

26, Boulevard de l'Hôpital — PARIS

# OPOTHÉRAPIE "LE PECQ"

## INTERNOSES "LE PECQ"

Extraits secs de glandes totales desséchés dans le vide profond au voisinage de 0°. Toxicité et propriété physiologique rigoureusement titrées et éprouvées. Existe sous forme : cachets, comprimés, pilules.

*OVARINE* à 0,10 (1 à 2 cachets par jour).

*THYROIDINE* à 0,0001 à 0,10 (utiliser des doses faibles avec période de repos).

*HYPOPHYSE* à 0,10 (1 à 2 cachets par jour).

*SURRENALE* à 0,10 (1 à 4 cachets par jour).

*BILE* à 0,10 (stabilisée pour lavements).

*ANOBILINE* (suppositoires).

*CERVEAU* à 0,25.

### Liste des autres Produits Opothérapiques préparés :

*CŒUR*

*CORPS JAUNE*

*ESTOMAC*

*FOIE*

*GANGLIONS LYMPHATIQUES*

*Lobe postérieur*

*INTESTIN*

*MAMELLE*

*MOELLE OSSEUSE*

*MOELLE ÉPINIÈRE*

*MUSCLE*

*PANCRÉAS*

*PARATHYROÏDE*

*PLACENTA*

*PROSTATE*

*POUMON*

*RATE*

*REIN*

*SANG*

*SÉRUM*

*TESTICULE*

*THYMUS*

*MUQUEUSE UTÉRINE*

### ASSOCIATIONS PLURIGLANDULAIRES

(sur demande ou ordonnance)

*THYROIDO - SURRENALO - TESTICULAIRE* ou  
*OVARIENNE, CÉRÉBRO - TESTICULAIRE,*  
*HYPOPHYSO - SURRENALO - TESTICULAIRE,*  
*ENTÉRO - PANCRÉATIQUE, HÉPATO-*  
*ENTÉRO-PANCRÉATIQUE.*

Laboratoire des **USINES CHIMIQUES DU PECQ**

39, Rue CAMBON — PARIS

# OPOTHÉRAPIE " LE PECQ "

## (SPÉCIALITÉS OPOTHÉRAPIQUES)

### CHLOROSOL :

Reconstituant, antitoxique et antibactérien favorisant la fixation du phosphore dans les tissus nerveux et cérébral. Antihémolytique et cholagogue.

### CHLOROSOL B :

Médicament antitoxinique à associer aux médicaments spécifiques des infections, pneumocoques, staphylocoques, streptocoques, grippe, etc.

### SIROP BILYOD :

Médicament iodotannique et biliaire utilisé dans les affections sclérosantes artérielles, goutte, rhumatisme, bronchites chroniques.

### ANOBILINE :

Suppositoires à la bile pour traitement de la constipation et de l'entérocolite muco-membraneuse.

### RECTOBYL :

Suppositoires aux extraits surrénaliens et hépatiques pour traitement des hémorroïdes.

### " LIPOÏDES LE PECQ " :

Le rôle joué par les lipoides dans la régularisation des échanges organiques, dans les phénomènes d'immunisation et de leuco-activation, nous a amenés à préparer toute une série de lipoides extraits des différentes glandes. Sans indication spéciale nous livrons toujours le lipuide total soluble dans l'éther, mais sur indication magistrale nous établissons des lipoides partiels :

(Solubles ou insolubles alcool)

(Solubles ou insolubles acétone, etc.)

Les *Lipoides Le Pecq* existent uniquement sous une forme pilulaire.

Laboratoire des USINES CHIMIQUES DU PECQ

39, Rue Cambon — PARIS

## OSTÉO-HÉPATINE

Opothérapie osseuse additionnée de 10 % d'extrait hépatique (moelle et os frais de veau).

**Dose.** — Tablettes friables. — Adultes : 3 à 5 tablettes par jour. — Enfants : 1 à 3 tablettes par jour, entières ou pulvérisées.

**Propriétés.** — Reminéralisant, récalcifiant organique toujours actif et puissamment actif. Sa différence des sels minéraux par une activité indiscutable, cliniquement établie.

“La reminéralisation doit être faite à l'aide de l'opothérapie osseuse en soutenant l'activité hépatique”. Travaux des professeurs A. Robin et Teissier (de Lyon).

**Indications.** — Tuberculose, Maladies osseuses et nerveuses, Grossesse, Allaitement, Croissance, Dentition, Rachitisme, etc.

Préparation sans similaires ni équivalents.

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**

8, Rue de la Source — PARIS (16<sup>e</sup>)

Téléph. Aut. : 06-62

## OSTRÉINE BUISSON

Chaux organique silico-fluorée  
(partie centrale de l'écaille d'huître)  
et phosphates assimilables

Recalcifiant et reminéralisateur biologique global.

**Indications.** — Tuberculose et pré-tuberculose, Rachitisme, troubles de croissance du squelette, Retard de consolidation des fractures, Retards de dentition, Grossesse et allaitement, Phosphaturie, Déminéralisation des déchéances organiques.

**Formes.** — Cachets, poudre, granulé, comprimés.

**Dose.** — 1 cachet, 1 comprimé, 1 mesure de poudre ou une cuill. à café de granulé au milieu de chaque repas.

**Etablissements Albert BUISSON**

157, Rue de Sèvres — PARIS

# OUABAÏNE

du Professeur ARNAUD, cristallisée

Principe actif, *chimiquement pur*, du *Strophanthus Gratus*.

« L'Onabaïne, véritable tonique du myocarde, ne remplace pas, mais complète heureusement la Digitaline. »

(Académie de médecine, 20 mars 1917.)

*Ampoules* à 1/4 milligr. La boîte de 6 : 12 fr.

*Comprimés* à 1/10 de milligr. La boîte de 30 : 7 fr.

*Indications.* — Insuffisance du ventricule gauche : des Aortiques, des Cardio-Rénaux, des Hypertendus, avec ou sans artério-sclérose.

Insuffisance du ventricule droit : des Lésions mitrales ou tricuspidiennes, des Péricardites et symphyses du péricarde, de l'Emphysème, de l'Asthme, des Bronchites chroniques, des Scléroses pulmonaires.

Certaines myocardites d'origine infectieuse : Typhus exanthématique, Diphthérie, Fièvre typhoïde, Grippe, etc.

Echantillons :

**Laboratoire NATIVELLE**

49, Boulevard de Port-Royal — PARIS

## OVO-LÉCITHINE BILLON

**Prop. thér.** — L'*Ovo-Lécithine* agit comme un stimulant des fonctions de nutrition et d'assimilation; elle favorise l'hématopoïèse, empêche la déminéralisation phosphorée, relève l'énergie contractile du cœur et des muscles, etc.

**Formes et doses.** — Dragées à 0 gr. 05, 4 à 6 par jour (enfants 2 à 3); granulés à 0 gr. 10 par cuill. à café, 2 à 3 par jour (enfants 1 à 2); injections intra-musculaires une par jour.

**Indications.** — Neurasthénie, dépression nerveuse, chlorose, anémies de toute nature, lymphatisme, cachexie sénile, période de convalescence des états infectieux.

Littérature et échantillons sur demande

**Etablissements POULENC Frères**

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

## OVULES DERMA

Breveté S. G. D. G.

Ces ovules, au moment de la fabrication, sont stérilisés par la chaleur, en même temps qu'ils sont coulés dans des moules. — Par un procédé spécial, il se forme autour de cet ovule un épiderme non adhérent qui l'enveloppe entièrement et en assure l'asepsie complète. Cette enveloppe se détache de l'ovule aussi facilement que le blanc se détache du jaune de l'œuf coagulé. Ces ovules se préparent à tous les médicaments usuels et sont vendus au même prix que les ovules ordinaires.

**Laboratoires M. ROBIN**  
13, Rue de Poissy — PARIS

## OVULES " ROCHE "

au Thigénol à 30 %

(Voir également page " Thigénol ")

**Prop. thér.** — Analgésiques, antiseptiques, décongestionnants et puissamment résolutifs. On constate au bout de quelques jours du traitement par les *Ovules " Roche "* la sédation complète des douleurs, et après quelques temps, l'arrêt complet des pertes. De même, les ulcérations rétrocedent rapidement et le volume des organes hypertrophiés diminue dans des proportions notables, ce qui permet de retarder, sinon d'éviter une intervention chirurgicale.

**Indic. thér.** — Vaginite, Vulvovaginites, Métrites, Paramétrites, Gonorrhée, Leucorrhée, Métorrhée, etc., etc.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**  
21, Place des Vosges — PARIS

## OXYDOTHYRINE PÂRIS

**Compos.** — La totalité des principes actifs de la glande Thyroïde privée de toxine par un procédé spécial. Est sans action sur le cœur.

**Indications.** — Embonpoint, Obésité, Fibrôme, Goitre et tous les états dûs à l'insuffisance Thyroïdienne.

**Forme.** — Dragées renfermant 0 gr. 10 de substance active.

**Posologie.** — 1 à 2 dragées par 24 heures prises de préférence le matin à jeun.

Prix : 12 fr. le flacon de 50 dragées

**Laboratoires Biologiques**

**André PÂRIS**

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (15<sup>e</sup>)

---

## OXYDOVARINE PÂRIS

**Composition.** — Tous les principes actifs de l'ovaire. Corps jaune et cellules interstitielles.

**Forme.** — Dragées dosées à 0 gr. 10 de substance ovarique totale.

**Indications.** — Troubles de la menstruation, Retentissements pathologiques de l'ovariotomie, Irrégularités, Insuffisance, Douleurs périodiques, accidents de la ménopause, etc.

Prix : Le flacon de 50 dragées : 12 fr.

**Laboratoires Biologiques**

**André PÂRIS**

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (15<sup>e</sup>)

## PANBILINE

**Formes.** — Pâtures et Solution.

**Définition.** — La Panbiline, Spécifique total des Maladies du Foie et des Affections qui en dérivent, est la seule médication agissant simultanément sur la sécrétion hépatique et sur l'excrétion biliaire.

**Composition.** — Elle associe synergiquement les opothérapiques Hépatique et Biliaire avec les meilleurs cholagogues sélectionnés et réunit, en milieu glycérolé : Extrait hépatique, extrait biliaire intégral, extrait de Boldo, podophyllin (traces). La Panbiline n'est ni toxique, ni irritante, et ne contient ni sucre, ni alcool.

**Indications.** — Insuffisances hépatique et biliaire, Lithiase biliaire (Coliques hépatiques, icères) Hépatisme, Arthritisme, Cholémie familiale, Diabète par Dyshépatie, Artériosclérose, Tuberculose et Lymphatisme justiciables de l'Huile de FOIE de Morue, que la Panbiline remplace. Dyspepsies, Hyperchlorhydrie, Entérite muco-membraneuse, Constipation, Appendicite, Fièvre typhoïde, Intoxications, Infections, Névroses, Troubles de la grossesse, Dermatoses par dyshépatie, Maladies des pays chauds, Congestions du foie, Hépatites et Cirrhoses, (Alcool, Paludisme, Syphilis).

**Doses moyennes.** — 2 à 12 pâtures par jour, ou 1 à 6 cuillerées à dessert de 10 gr. par jour, au début des repas.

Demi-dose pour les enfants.

## RECTOPANBILINE

**Forme.** — Solution.

**Définition.** — Lavement établi d'après les dernières données scientifiques amenant, en quelques minutes, sans réaction nocive, par un mécanisme physiologique une évacuation complète du gros Intestin. — Non irritant, non douloureux, non toxique, non salissant. — Concourt, en outre, à la guérison durable de la Constipation en rétablissant la biligénèse normale grâce à sa teneur en Panbiline.

**Composition.** — Extrait de Bile glycérolé et associé à la Panbiline.

**Indications.** — Toutes les modalités de Constipation médicamente. En s'opposant à l'auto-intoxication intestinale supprime ses nombreuses manifestations pathologiques (Troubles digestifs, nerveux, circulatoires, nutritifs, cutanés, etc.). Est le meilleur moyen d'entraver le développement de l'artériosclérose dont le point de départ est aujourd'hui rattaché universellement à l'auto-intoxication intestinale (Lemoine, Chauffard, etc.). Résout parfaitement le problème posé par Metchnikoff dans ses travaux sur la vieillesse précoce. — Autres indications : Hémorroïdes, Vers intestinaux, Etats où la défécation doit se faire sans efforts : Hernies, Grossesse, Accouchements.

**Posologie.** — Une à trois cuillerées à café dans 200 grammes d'eau bouillie chaude à prendre en lavement à garder 10 à 30 minutes. — Demi-dose pour les enfants.

Le pot de Rectopanbiline contient 20 doses d'une cuillerée à café.

En vente dans toutes les pharmacies

Echantillon, Littérature :

Laboratoire de la PANBILINE — ANNONAY (Ardèche)



## PANCALCINE

Médicament reminéralisateur et reconstituant  
par excellence.

Formes. — Cachets (*adultes*), Poudre (*enfants*).

Composition des cachets. — Glycérophosphate de chaux, Phosphate tricalcique, Carbonate de chaux précipité, Carbonate de magnésie, Silicate de chaux, Fluorure de calcium, Tannin à l'alcool, Poudre de colombo, Pan-créatine, Poudre de noix vomiques.

Composition de la poudre. — Même composition, moins : Tannin, Poudres de colombo et noix vomiques.

**Ordonner :**

*Adultes*, 1 cachet au milieu des deux principaux repas.

*Enfants*, 1 cuillerée à montarde dans un liquide ou de la confiture, deux fois par jour.

Indications. — Bronchite chronique et états lymphatiques, Troubles de la croissance et de la dentition, Consolidation des fractures, Fatigue générale et surmenage.

### Laboratoire de la PANCALCINE

Louis PAPET, Ex-interne des Hôpitaux de Paris

15, Rue d'Etampes — DOURDAN (S.-&-O.)

---

## PANGLANDINE

Description. — Capsules kératinisées de 0 gr. 25 (50 par flacon) contenant une synthèse opothérapique : thymus, ovaires, rate, duodénum, hypophyse, capsules surrénales thyroïde, pancréas, testicules, foie, prostate, en proportions physiologiques.

Action thérapeutique. — L'insuffisance fonctionnelle d'une glande à sécrétion interne, entraînant un surcroît de travail pour les autres, la médication opothérapique doit renforcer l'action des principales glandes en suppléant celle qui est déficiente et devra, par conséquent, comporter un mélange synthétique.

Indications. — 4 à 8 comprimés par jour dans la sénilité, l'obésité, la neurasthénie, les retards de croissance, les troubles de la puberté, le myxœdème, l'infantilisme.

### Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, Avenue Hoche — PARIS

## PANLACTO MIDY

Culture pure des 3 bacilles lactiques : bacille Bulgare, bacille Bifidus, bacille Paralactique à l'état vivant et actif.

Comprimés dosés à : Bacilles bulgares . . . . 0,02  
   Bacilles bifidi . . . . . 0,02  
   Bacilles paralactiques 0,02

Mode d'emploi. — 3 à 8 comprimés par jour, soit à la fin du repas, soit au petit déjeuner et dans un verre d'eau lactosée (5 grammes) le soir avant de se coucher.

Prop. therap. — Détruit toutes les fermentations microbiennes, antiseptise et tonifie les intestins.

Indic. — Affections intestinales : diarrhées infantiles, gastro-entérites, entéro-colites, etc.

Vente au détail : 140, Faubourg-St-Honoré, PARIS

### Laboratoires MIDY

9, Rue du Commandant-Rivière — PARIS (8<sup>e</sup>)

## PANUROL TISSOT

Composition. — Contient, 1<sup>o</sup> le régulateur de la production urique *acide thyminique* ; 2<sup>o</sup> l'éliminateur de l'excès urique et de ses dérivés (pipérazine, lithine, helmithol, etc.).

*Répond donc à la double médication nécessaire dans le traitement de la diathèse urique.*

Indication. — Toutes les manifestations de l'*Arthritisme* et de l'*Uricémie*, Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Calculs, Coliques hépatiques et néphrétiques, Eczémas, *Maux de tête et Migraines* souvent occasionnés par la rétention rénale.

Dose. — 2 ou 3 cuillers à soupe par jour dans un verre d'eau, suivant l'âge et suivant le cas.

Jamais de contre-indications.

### Laboratoire du Dr TISSOT

34, Boulevard de Clichy — PARIS

## PANTOPON "ROCHE"

Opium total injectable. — Tous les alcaloïdes de l'opium sous forme de chlorhydrates solubles et injectables.

0 gr. 01 de Pantopon "Roche"  
= 0 gr. 50 ctg. de teinture d'opium,  
= 0 gr. 025 mgr. d'extrait d'opium,  
= 0 gr. 005 mgr. de morphine.

**Posologie et mode d'emploi.** — Voie buccale :

### PANTOPON "ROCHE" SIROP

(dosé à 0,01 ctg. de Pantopon "Roche" par cuillerée à soupe.)

Adultes : 1 à 3 cuill. à soupe par jour et plus.  
Enfants : 1 à 3 cuill. à café selon l'âge.

### PANTOPON "ROCHE" COMPRIMÉS

(1 comprimé = 0.01 ctg. de Pantopon "Roche").

Adultes : 1 à 3 par jour et plus.  
Enfants : 1/3 à 1 par jour, selon l'âge.

Voie hypodermique :

### PANTOPON "ROCHE" AMPOULES

(1 ampoule = 1 cc. = 0,02 ctg. de Pantopon "Roche").

Boîtes de 3, 6 et 12 Ampoules

Adultes : 1 à 2 par jour et plus.  
Enfants : 1/4 à 1/2 ampoule selon l'âge.

**Indic. thér.** — Toutes celles de l'opium, de la morphine et de leurs dérivés.

### Produits

**F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**

21, Place des Vosges — PARIS

## PAPAÏNE de TROUETTE-PERRET

Ferment digestif, énergétique, extrait du  
sue du *Cariea Papaya*, digère les pro-  
duits azotés, *quelle que soit la réaction*  
*de l'estomac*, acide neutre ou alcaline.

### Indications :

Toutes les fois que l'on digère mal.

*Pour les Adultes :*

**Elixir** "TROUETTE-PERRET" à la  
*Papaïne :*

Un verre à liqueur après chaque repas.

**Cachets** "TROUETTE-PERRET" à la  
*Papaïne.*

Un à deux cachets à chaque repas.

**Comprimés** "TROUETTE-PERRET" à  
la *Papaïne.*

Deux à huit comprimés à chaque repas.

*Pour les Enfants :*

## SIROP DE PAPAÏNE de TROUETTE-PERRET

Gastro-Entérite des nourrissons, Diar-  
rhées, Vomissements.

Une demi ou une cuillerée à café avant  
ou après chaque repas ou tétée.

A souvent réussi après échec de toute  
autre médication.

Bien formuler : *Elixir - Sirop - Cachets*  
*Comprimés de TROUETTE-PERRET,*  
*à la Papaïne.*

**Etablissements TROUETTE & C<sup>ie</sup>**

15, Rue des Immeubles-Industriels, 15

PARIS (11<sup>e</sup>)

# PARAFFINOLÉOL HAMEL

Paraffine liquide chimiquement pure,  
sans saveur.

## NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL

### Indications :

Constipation opiniâtre, Colites, Enté-  
rocolites, Appendicites.

Littérature et Echantillons :

**Pharmacie HAMEL**  
**LE MANS**

à PARIS : **Laboratoires BRUNEAU & C<sup>ie</sup>**  
17 bis, rue de Berri  
Téléphone : Elysées 61-46

## PAROXYL

(Gouttes spécifiques contre la coqueluche)

Le *Paroxyl* n'est pas toxique. Il ne ren-  
ferme aucune substance vénéneuse, ni  
stupéfiante.

**Prop. thérap.** — Action régulière et sûre.

Effet *non seulement calmant, mais curatif.*

**Indications.** — Coqueluche (nourrissons, en-  
fants et adultes).

Pas de contre-indication.

**Posologie.** — 3 prises par jour (quelque soit  
l'âge du malade).

Dose par jour	{	Enfants de moins de 1 an. :	X à XXX gouttes
		— de 1 à 3 ans. .... :	XX à LX gouttes
		— 5 ans et au-dessus :	XX à cent gouttes
		Adultes. .... :	XXX à cent gouttes

**THIRIET & C<sup>ie</sup>**

26 et 28, Rue des Ponts — NANCY

# PASTILLES GÉRAUDEL

Au goudron de Norvège pur  
agissant par inhalation et par absorption

**Compos.** — Goudron végétal de Norvège lavé et purifié par "procédé Géraudel" avec des appareils spéciaux (25 mgr.). Poudres Béchiques et Balsamiques, Sucre et Mucilage de gomme, aromatisé avec de l'huile essent. d'Anis.

**Dose et Mode d'emploi.** — 6 à 10 pastilles par jour, entre les repas, principalement le matin et le soir. Sucrer lentement et en avalant la salive, une seule pastille à la fois.

**Indications.** — Rhume, Bronchite, Catarrhe, Asthme, Enrouement, Irritation de poitrine, Laryngite, Phtisie pulmonaire et toutes affections des bronches, des poumons et des cordes vocales.

Prix de l'étui : 2 fr. 50

## Emploi rationnel et efficace du Goudron de Norvège pur

L'immense et légitime popularité conquise par le Goudron de Norvège, produit de la distillation à haute température d'arbres résineux, a confirmé les espérances fondées sur ce précieux médicament et permis de mieux préciser les conditions de son emploi thérapeutique.

Nous croyons avoir obtenu le double résultat : 1° de faire parvenir les Vapeurs de Goudron dans l'appareil respiratoire; 2° dans le cas où il est utile de le faire agir sur les autres muqueuses, en le soumettant à l'action du tube digestif, de l'y introduire dans un état de dilution tel qu'il est facilement absorbé, sans causer aucun trouble digestif.

**A. GÉRAUDEL, Pharmacien**

(anciennement à Sainte-Menehould)

36, Rue Rivay — LEVALLOIS-PERRET

## PASTILLES MERY

Gaïacol 0,02. Eucalyptol 0,33. Menthol 2.  
Essence d'Eucalyptus 0,66. Essence  
de Pin 2. Gomme : 51 k. 500, Sucre 48 k.

**Indications.** — Laryngites, Toux, Bronchites, etc.

Prix : 2 fr. 75 la boîte

**Comte René de GRAUWE**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe

16, Rue de Rocroy, 16

PARIS

---

## PÉLOSPANINES

Sulfates de terres rares

Traitement des Bacilloses subaiguës ou chroniques.

Injections intra-veineuses :

Pélospanines A ampoules de 2 cc.

Pélospanines B ampoules de 4 cc.

Injections intra-musculaires :

Pélospanines C, ampoules de 2 cc.  
(associat. lipoïdique)

Prix : A 12. — B 18. — C 12

**Laboratoires FOURNIER Frères**

26, boul<sup>d</sup> de l'Hôpital — PARIS (5<sup>e</sup>)

## PEPTO-FER DU D<sup>r</sup> JAILLET

à base de Chloropeptonate de Fer  
Elixir aromatisé  
très agréable à prendre

**Propriété.** — Tonique, digestif, re-constituant, ne constipe pas, ne noircit pas les dents.

**Indications.** — Traitement des Anémies, de la Chlorose.

**Dose et mode d'emploi.** — Un petit verre à liqueur immédiatement après les deux principaux repas.

**Société des Produits SCHAFFNER**

43, Rue Pavée, 13

PARIS

---

## PEPTO KOLA ROBIN

Type du Médicament Aliment

Liqueur très agréable contenant le sue de Kola fraîche.

**Dose et Mode d'emploi :**

1 verre à liqueur avant chaque repas.

**Indications :**

Fatigues passagères physiques ou intellectuelles, Albumine, Diabète, etc.

**Laboratoires M. ROBIN**

13, Rue de Poissy — PARIS



## PEPTONATE DE FER ROBIN

Combinaison définie de peptone, de glycérine et de fer

Gouttes concentrées, Elixir, Vin.

**Doses et mode d'emploi.** — Adultes : 10 à 30 gouttes ou 1 verre à liqueur d'Elixir ou de vin à chaque repas; Enfants : 1 goutte par année d'âge 2 fois par jour.

**Prop. théér.** — Reconstitution du globule rouge du sang.

**Indications.** — Tous les états anémiques et chlorotiques.

**Laboratoires M. ROBIN**

13, Rue de Poissy — PARIS

---

## PÉRISTALTINE CIBA

Médicament enoprotique.

**Composition et Propriétés.** — Extrait du *Rhamnus Purshiana* (Cascara), agissant exclusivement sur le péristaltisme, sans provoquer de coliques. Utilisable également par voie hypodermique (Ampoules de 1 cm<sup>3</sup> 1/2).

Ne produit pas d'accoutumance.

**Indications.** — Constipation chronique. Atonie intestinale. Atonie post-opératoire. (Injecter préventivement 1 ou 2 ampoules après l'intervention).

**Posologie et Formes pharm.** — Adultes : 2 à 4 comprimés, 1 à 2 ampoules. — Enfants : 1/2 à 1 1/2 comprimés, 1 ampoule. — Injectée ou ingérée la Péristaltine agit au bout de 10 à 15 heures.

Prix :

Le tube de 20 comprimés..... 2 fr. 50

La boîte de 5 ampoules..... 10 fr.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**

1, Place Morand — LYON

## PERLES TAPHOSOTE

LAMBIOTTE Frères

Perles gélatineuses contenant 0 gr. 25 de tanno-phosphate de créosote.

### Dose et mode d'emploi :

Adultes : 5 perles par jour à n'importe quel moment de la journée.

Enfants : 1 à 2 perles par jour jusqu'à l'âge de 6 ans. 2 à 3 perles par jour de 6 à 12 ans. 3 à 4 perles par jour de 12 à 16 ans.

Ces doses sont suffisantes. On peut les augmenter de moitié sans inconvénient.

Dans les bronchites chroniques, traiter pendant 10 jours, cesser pendant 5 jours, puis recommencer le traitement jusqu'à complète guérison, en l'interrompant tous les 10 jours pour le reprendre 5 jours après.

### Indications :

Maladies des voies respiratoires, affections broncho-pulmonaires aiguës et chroniques. Aucune contre indication.

### Prop. théér. :

Asséchant bronchique, bactéricide, dynamogène, selérogène et modérateur des échanges respiratoires.

Littérature et échantillons :

Produits LAMBIOTTE Frères

3, Rue d'Edimbourg — PARIS (8<sup>e</sup>)

Téléphone Wagram 14-73

## PHOSOTE LAMBIOTTE Frères

Phosphate de créosote chimiquement pur et complètement assimilable, livré en boîtes de 7 ampoules de 1 c. c.

Les piqûres sont absolument indolores si elles sont faites profondément et en plein muscle.

### Dose et mode d'emploi :

Injection intra-musculaire dans la région fessière de préférence.

1 c. c. chaque jour soit 1 ampoule, ou

2 c. c. tous les deux jours soit 2 ampoules, ou

3 c. c. tous les trois jours soit 3 ampoules ;

Vingt et un jours de ce traitement et neuf jours de repos et ainsi de suite jusqu'à guérison ; la semaine qui précède le repos, il est bon d'injecter 3 c. c. tous les 3 jours.

### Prop. thér. :

Modificateur direct des lésions, astringent, anticatarrhal, possède un grand pouvoir asséchant, tonifie l'organisme.

### Indications :

Bronchite aiguë et chronique, broncho-pneumonie, grippe, prétuberculose, tuberculose pulmonaire.

### Contre-Indication :

S'abstenir de la médication arsenicale.

Littérature et échantillons :

**Produits LAMBIOTTE Frères**

3, Rue d'Edimbourg — PARIS (8<sup>e</sup>)

Téléphone Wagram 14-73

## PHOSPHATE VITAL de JACQUEMAIRE

Glycérophosphates très purs qui ont servi aux expériences de M. le Professeur Albert Robin (Communication à l'Académie de Médecine du 24 Avril 1894).

**Formes et doses.** — *Solution gazeuse :*

(de chaux, de soude ou de fer)

2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

*Granulé* (de chaux, de soude, ou composé de fer) :

2 à 4 cuillerées à café par jour.

*Injectable* (de chaux, de soude ou de fer) :

1 à 2 injections par jour.

**Propriétés.** — Double action reconstituante :

1<sup>o</sup> *Action reminéralisatrice*, par l'apport du phosphore uni aux bases qui lui sont normalement associées dans l'organisme, sous la forme même — directement assimilable — adoptée par celui-ci ;

2<sup>o</sup> Puissante *action stimulante sur la nutrition*, par l'intermédiaire du système nerveux et de tout le système glandulaire.

**Indications.** — Contre toutes les formes de la faiblesse et de l'épuisement : Croissance, Débilité, Anémie, Neurasthénie, Tuberculose, Grossesse, Allaitement, Surmenage, Convalescences.

**Nota.** — Ce traitement reconstituant s'associe utilement et sans contre-indications à de nombreuses autres médications : opothérapique, sérothérapique, iodurée, arsenicale, mercurielle, anti-paludique.

Etablissements JACQUEMAIRE

M. MIGUET, Docteur en Pharmacie

VILLEFRANCHE (Rhône)

## PHOSPHATINE FALIÈRES

Aliment des enfants, des vieillards,  
des surmenés, des convalescents.

S'emploie, pour les enfants, dès l'âge  
de 7 à 8 mois, surtout au moment du  
sevrage et pendant la croissance.

Associée au lait frais, la *Phosphatine  
Falières*, constitue une bouillie, d'un  
goût très agréable, de digestion  
facile.

Chaque cuillerée à bouche contient  
0 gr. 20 gr. de phosphate bicalcique,  
assimilable.

**G. PRUNIER & C<sup>ie</sup>**

6, Rue de la Tacherie — PARIS

---

## PHOSPHOTAL CLIN

(Ether phosphoreux de la créosote)

**Prop. thér.** — Antiseptique pulmonaire et reminéralisateur, à minimum de toxicité. Traitement des maladies des voies respiratoires et particulièrement des formes sécrétantes : Tuberculose pulmonaire, Bronchites chroniques, fétides, Gripes, etc.

**Formes.** — Capsules titrées à 0,20 egr.

Emulsion titrée à 0,50 egr. par cuill. à café.

Ampoules à 0 gr. 10 par cm<sup>2</sup> (amp. de 3 cm<sup>2</sup>).

**Doses et mode d'emploi.** — Capsules : 4 à 6 par jour.

Emulsion : De préférence en lavement, 1 à 2 cuill.  
à café d'émulsion mélangée à 1/2 verre de lait tiède.

Ampoules : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

**Laboratoires CLIN**

20, Rue des Fossés-St-Jacques — PARIS

## PHYLACTONE BYLA

Peptone spéciale à polyvalence protéinique et riche en polypeptides.

**Doses et mode d'emploi.** — Un cachet une heure avant les repas, dans un peu d'eau froide.

**Propriétés thérapeutiques.** — Anti-anaphylactique.

**Indications.** — Migraines, Céphalées, Urticaires et tous états morbides relevant d'une intoxication alimentaire d'origine anaphylactique.

**Les Etablissements BYLA**

26, Avenue de l'Observatoire, 26  
PARIS

---

## PHYSÉINE GRÉMY

Principe actif du lobe postérieur  
de l'hypophyse.

En ampoules de 1 cc. correspondant à 0,20 cgr. de lobe postérieur de l'hypophyse.

**Mode d'emploi.** — En injections sous-cutanées ou intraveineuses.

**Prop. thér.** — Action élective sur les fibres musculaires lisses et sur la musculature du cœur.

**Indic.** — En obstétrique : inertie utérine ; hémorragies de la délivrance.

En médecine : hypotension vasculaire ; cœur défaillant.

En chirurgie : shock et hypotension sanguine ; hémorragies.

14, Rue de Clichy — PARIS (9<sup>e</sup>)

## PHYTINATE DE QUININE CIBA

Phosphate organique de quinine

**Composition et Propriétés.** — Résulte de la combinaison de l'acide inosito-phosphorique avec l'alcaloïde principal du quinquina : 57 % de quin., 11 % de phosph.

Réunit l'action spécifique de la quinine à l'action tonique et reconstituante de la Phytine. Très bien toléré.

**Indications.** — Celles de la quinine en général et plus particulièrement : Grippe, Migraines, Névralgies, Paludisme (surtout les formes anciennes accompagnées de cachexie et d'anémie). Fièvre typhoïde et maladies infectieuses. Coqueluche, Diabète, etc.

**Posologie et Formes pharmaceutiques.** — Mêmes doses que le sulfate ou le chlorhydrate de quinine. Comprimés argentés, dosés à 0 gr. 10, d'un usage commode et agréable.

Prix :

Le tube de 20 comprimés. 3 fr.

Le flacon 50 » 6 fr.

On trouve aussi le Phytinate de quinine en vrac, et on peut le formuler comme les autres sels de quinine.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**

1, Place Morand — LYON

## PHYTINE CIBA

Composé phospho-organique

### Composition et Propriétés :

Produit naturel extrait des graines végétales contenant 22 % de phosphore en combinaison organique. Le plus assimilable des médicaments phosphorés. Apéritif puissant. Tonique et reconstituant. Stimulant des échanges nutritifs et de l'hématopoïèse.

### Indications :

Débilité constitutionnelle, Neurasthénie, Névroses, Surmenage sous toutes ses formes, Tuberculose, Chlorose, Anémie, Anorexie, Convalescences difficiles, Troubles de la grossesse et de la lactation, etc.

### Posologie et Formes pharmaceutiques :

Adultes : 1 gr. par jour.

Enfants : 0 gr. 25 à 1 gr. par jour.

Caquets dosés à 0 gr. 50

Comprimés » à 0 gr. 25

Granulé » à 0 gr. 50

Prix :

Caquets et comprimés : la boîte, 5 fr. 50

Granulé : le flacon, 7 fr.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**

1, Place Morand — LYON



## PILULES DE BLANCARD

A l'Iodure de fer inaltérable, Approuvées par l'Académie de Médecine de Paris, dosées à 5 egr. d'iodure de fer.

**Dose et mode d'emploi.** — Adultes : 2 à 6 pilules par jour aux trois principaux repas.

**Prop. thér.** — Agent incomparable d'Hématopoïèse.

**Indications.** — Anémie, Serofules, Lymphatisme, Chlorose, Leucorrhée, Aménorrhée, Syphilis accidentelles ou constitutionnelles, suite de gripes, infectieuses, etc.

**BERTAUT-BLANCARD Frères**

64, Rue de la Rochefoucauld — PARIS

---

## PILULES GIP

Oxalate de fer 0,10; Extrait de Quinquina rouge 0,05; Extrait de gentiane 0,01.

**Dose et Mode d'emploi.** — 4 pilules par jour (2 avant chaque repas; dans les cas graves aller jusqu'à 6 par jour. — Enfants : 3 pilules par jour suivant âge.

**Prop. Thér.** — Spécifique de l'Anémie et de la faiblesse; régénératrices du sang et des nerfs.

**Indications.** — Anémie, Chlorose, Convalescence, Lassitude, Vieillesse, etc.

**Laboratoire H. NOGUÈS**

11, Rue Joseph-Bara — PARIS (6<sup>e</sup>)

## PILULES D'HERMAL

### BRETONNEAU

Ces pilules ne donnant pas d'hydrargirisme parce qu'enrobées au gluten, sont très souvent employées à côté des injections mercurielles et même à côté des injections de 606 et de néosalvarsan. Voici leur formule :

Bi-iodure de Mercure.....	0,01
Iodure d'Arsenic.....	0,002
Correctif spécial.....	0,30

Nous croyons devoir prévenir Messieurs les Docteurs que les flacons de vente de *Pilules d'Hermal* ne sont accompagnés d'aucune notice.

**Henri RIVIER**, succ<sup>r</sup> de **LANCELOT & C<sup>ie</sup>**  
26-28, Rue St-Claude — PARIS

## PILULES DE MOUSSETTE

à l'Aconitine cristallisée

**Prop. thér.** — Action sédative et analgésique surtout remarquable dans la zone du trijumeau.

**Forme.** — Pilules dosées à 1/5<sup>e</sup> de mgr. d'aconitine cristallisée et 5 egr. de quininum par pilule.

**Doses.** — Deux pilules le premier jour, une le matin et une le soir; on prendra trois pilules le second jour, en trois prises espacées, si aucun soulagement ne s'est produit. On n'atteindra la dose de 4 pilules qu'exceptionnellement en surveillant la tolérance du malade (la sensation de fourmillement dans la langue, les lèvres et la face est un signe prémonitoire d'intolérance).

Après chaque ingestion de *Pilules de Moussette* prendre une infusion chaude. L'administration simultanée d'un purgatif énergique est conseillée par le Dr Fuchs.

**Laboratoires CLIN**

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

# PILULES

## du Docteur SEJOURNET

à base de Santonine

**Indications therap.** — Traitement du  
DIABÈTE sans régime rigoureux  
spécial.

**Doses et Mode d'emploi.** — Pilules  
dosées à 0 gr. 02 de Santonine.

1 Pilule à chaque repas.

**Docteur M. LEPRINCE**

62, rue de la Tour — PARIS (16<sup>e</sup>)

## PIPÉRAZINE MIDY

Diéthylène Diamine,  $\text{NH} < \begin{smallmatrix} \text{CH}^+ \\ \text{CH}^+ \end{smallmatrix} > \text{NH}$ , alcalin  
organique du groupe des Pyridines. (Inscrit au  
Codex Français 1908).

Granulé effervescent, dosé à 0,20 egr. Pipérazine  
pure par cuillerée à café.

**Doses et Mode d'emploi.** — 2 à 3 cuillerées à  
café par jour comme préventif; 4 à 6 cuillerées  
à café par jour, crises aiguës, dissoute dans un  
verre d'eau à distance des repas.

**Prop. Thér.** — Dissout 92 % des composés de l'acide  
urique; réduit les déchets uratiques en stimulant  
l'activité hépatique; antiseptise les urines.

**Indications.** — Le plus actif des remèdes à pres-  
crire dans les manifestations de l'Arthritisme et  
de l'Uricémie, Goutte, Rhumatisme, Gravelle,  
Calculs, Coliques hépatiques et néphrétiques  
Sciatique, Artério-sclérose, Bézéma, Diabète.

Aucune contre-indication, Innocuité absolue sur cœur,  
estomac, vaisseaux.

Détail: 140, Faubourg Saint-Honoré — PARIS

**Laboratoires MIDY**

9, Rue du Commandant Rivière — PARIS (8<sup>e</sup>)

## POMMADE MIDY

(Adrénostyptique)

(Adrénaline, Stovaine, Anesthésine et Extrait de marrons d'Inde frais, stabilisé), Hamamelis.

**Mode d'emploi.** — Une application matin et soir, et après les garde-robes.

**Prop. thérap.** — Sédation des douleurs, arrêt des hémorragies, décongestion et vaso-constriction, antiseptic.

**Indications.** — Traitement rationnel des hémorroïdes externes et internes.

Une canule rectale s'adaptant au tube permet d'atteindre les hémorroïdes internes haut placées.

Détail : 140, Faubourg Saint-Honoré — PARIS

### Laboratoires MIDY

9, Rue du Commandant-Rivière, 9  
PARIS (8<sup>e</sup>)

## POUDRE GÉNIA

Digestive, Absorbante, Laxative Reconstituante

**Prop. thérap.** — Traitement local et général des Affections gastro-intestinales.

**Indicat. thérap.** — Très efficace dans Dyspepsie et Entérites communes et tuberculeuses, Gastralgies et Fermentations, Constipations, Hémorroïdes, Cirrhoses, Diabète, Goutte, Obésité, Gastro-entérites infantiles.

**Doses.** — Adultes : Une à deux cuillerées à café à hauteur des bords, au début, au milieu de chaque repas. Deux à quatre cuillerées à café à hauteur des bords, dans hyperchlorhydrie. Enfants : Une demi à deux cuillerées à café par 24 heures, suivant l'âge.

Prix : 7 fr., impôt en plus

AMOUROUX & C<sup>ie</sup>

GRANDE PHARMACIE GÉNÉRALE

136, rue du Chemin-Vert — PARIS

## PRÉPARATIONS OPOTHÉRAPIQUES

### “ MONCOUR ”

Extrait gastrique. — Extrait hépatique.  
— Extrait pancréatique. — Extrait  
entéro-pancréatique. — Extrait intes-  
tinal. — Extrait de bile. — Extrait  
Rénal. — Extrait de muscle lisse. —  
Extrait de muscle strié. — Moëlle  
osseuse. — Myocardine. — Poudre  
surrénale. — Thymus, etc., etc.

Pour tous renseignements et litté-  
ratures s'adresser :

**Pharmacie de MONTCOURT**  
49, Avenue Victor-Hugo  
BOULOGNE-PARIS

---

## PRÉVENTYL

Nécessaire de poche de prophylaxie  
antivénérienne.

Le premier créé en France sous le contrôle et  
d'après les conseils des Maîtres de la vénéréo-  
logie française.

**Composition.** — En 3 tubes d'étain de couleur  
différente :

- 1<sup>er</sup> Pommade de Metchnikoff (calomel 33 %);
- 2<sup>e</sup> Gelée au protargol à 3 %;
- 3<sup>e</sup> Emulsion de savon;
- 4<sup>e</sup> Une cartouche de ouate hydrophile.

**Présentation.** — Grand modèle (7 fr.), pour 8 à  
10 applications.

Petit modèle (3 fr. 50), aspect et format d'une  
boîte d'allumettes, pour 3 applications.

Echantillons et littérature sur demande aux

**Laboratoires MARCHAND & LEROY**

40, Rue d'Enghien — PARIS

Téléphone Bergère 37-13

## PRODUITS DIÉTÉTIQUES FAVRICHON

### **Phosphogène :**

De toutes les farines alimentaires la plus riche en phosphates assimilables. Convient à tous les enfants pendant la croissance, mais particulièrement aux enfants chétifs, à ceux dont la dentition est en retard ou dont le système osseux ne se développe pas d'une façon normale.

Aliment de choix des jeunes mères pendant la grossesse et l'allaitement.

Répare rapidement les pertes en éléments phosphatés chez les convalescents.

Crème de Cacao

Soupe de grains grillés,

Farines naturelles mélangées,

Céréales granulées, etc.

Littératures et échantillons  
sur demande

**J. FAVRICHON**

Pharmacien - Chimiste

Usine créée en 1890 à

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

(Loire)

## PROCUTA

Topique réducteur kératoplastique expérimenté dans les Hôpitaux de Paris et de province.

**Propriétés thérapeutiques.** — Traitement des dermatoses à forme squameuse; décape la peau, calme le prurit, décongestionne l'épiderme, reconstitue le tégument sain sans avoir l'inconvénient de le colorer.

Le *Procuta* est sans odeur et il ne souille pas le linge.

**Indications.** — Psoriasis, Eczémas secs, Pityriasis, séborrhéides psoriasiformes, Lichen, Ichtyose, Prurits, Névrodermites.

**Laboratoires Pierre BRISSON & Cie**  
111, Rue du Mont-Cenis — PARIS

## PROPIDON

Bouillon stock-vaccin du Prof. Pierre Delbet

**Compos.** — Association, en proportions définies, de cultures en bouillon de streptocoques, staphylocoques et B. Pyocyanique. Vieillessement suivi de chauffage. Ces procédés d'atténuation permettent d'injecter le protoplasma microbien à doses massives.

**Indicat.** — Staphylocoques fébriles, anthrax, phlegmons, ostéo-périostites dentaires, ostéomyélites, annexites et pelvi-péritonites, érysipèle, lymphangites, infections pyogènes, etc..

**Mode d'emploi.** — Délivré par boîtes de 3 ampoules contenant chacune 4 cm<sup>3</sup> de vaccin. On pratique, selon le cas, une à trois injections intra-musculaires d'une ampoule chaque fois, à trois jours d'intervalle. Pratiquer chaque injection à la face externe de la fesse en deux points différents. Les phénomènes locaux et généraux, parfois assez intenses, se culment après quelques heures. Effet thérapeutique rapide.

Littérature et échantillons sur demande

**Etablissements POULENC Frères**  
22, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>)

## PSINASE GRÉMY

Erepsine et ferments peptonisants.

Solution chlorurée glycérinée.

**Doses et mode d'emploi.** — Chaque flacon est muni d'une petite cuillère-mesure de 3 cc, l'aire prendre une mesure dans un peu d'eau à la fin de chacun des deux principaux repas.

**Prop. thér.** — Réalise la digestion complète de l'albumine.

**Indications.** — Dyspepsies et troubles consécutifs de nutrition et d'auto-intoxication.

14. Rue de Clichy — PARIS (9<sup>e</sup>)

---

## PURGANOL DAGUIN

$C^{20} H^{14} O^4$

**Forme.** — Pastilles à la menthe dosées à 0 gr. 25 par pastille.

**Dose et Mode d'emploi.** — Adultes : 1/2 à 1 pastille le soir au coucher. Enfants : 1/4 à 1 pastille. — Sucrer lentement les pastilles; ne pas les croquer.

**Prop. Thér.** — Laxo-purgatif.

**Indications.** — Constipation sous toutes ses formes.

**Contre-indication.** — Néant.

**Etablissements DAGUIN**  
SAINT-MAUR (Seine)



## QUIÉTOL

Bromhydrate de diméthylaminovaléryloxy-isobutyrate de propyle

Le *Quiétol* peut être employé dans tous les cas où il faut calmer une douleur nerveuse, ou un système nerveux surexcité.

Bien qu'il ne soit pas un hypnotique au sens vrai du mot, son action est très favorable dans les cas d'insomnie nerveuse.

Aux doses courantes, ce produit n'a aucune toxicité, il est sans action nuisible sur les globules sanguins. Ni éruption ni intolérance. Son emploi ne rencontre aucune contre-indication.

**Mode d'emploi et doses.** — Un à quatre cachets de 0 gr. 50 par jour, suivis d'absorption d'une certaine quantité de liquide.

Littérature et échantillons sur demande

**Etablissements POULENC Frères**

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

## QUINA LAROCHE

(Extrait complet des 3 Quinquinas)

**Compos.** — Extrait complet des 3 sortes de quinquinas : quinquina gris Loxa vrai, quinquina jaune royal, quinquina rouge. Préparé en épuisant le mélange des quinquinas par dialyse, il concentre sous un petit volume tous les éléments actifs, amers, astringents et aromatiques contenus dans les écorces. Principaux éléments : quinine, cinchonine, acide quino-tannique, acide quinique, etc.

**Propriétés.** — Tonique et cupeptique.

**Formes.** — Quina Laroehe (phosphaté, ferrugineux).

**Doses.** — Adultes : un verre-mesure après chaque repas; Enfants : le tiers ou la moitié de cette dose étendue d'eau selon l'âge.

**Laboratoires CLIN**

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

## QUINEINE

Extrait intégral des principes  
du quinquina.

Préparation concentrée, de titrage fixe,  
très active, faite avec des écorces  
choisies de même origine, concassée  
de la même façon, etc. XL gouttes  
deux fois par jour, dose fébrifuge: 1/2  
cuill. à café.

**Laboratoire des Produits Scientia**

10, Rue Fromentin, 10

PARIS

---

## QUINQUINA GMET

Extrait total de Quinquina Succirubra  
Préparation liquide sans alcool corres-  
pondant à 2 gr. de plante par cuill.  
à café.

**Doses et Mode d'emploi.** — 2 à 8 cuil.  
à café par jour dans eau, vin, bière,  
etc., 1/2 heure avant le repas.

**Prop. Thér.** — Apéritif, Fébrifuge,  
Tonique.

**Indications.** — Anorexies, Pyrexies,  
Paludisme, Grippe, Anémie, Chlorose.

Littérature et échantillons sur demande  
au Service Médical des

**Produits GMET**

27, Faubourg Montmartre — PARIS (9<sup>e</sup>)

Tél. Bergère 43-10

## RECTOLINE

Pommade lanolinée à base d'Esculine adrénalinée et d'Ortho-cocaïne livrée, en tube avec canule spéciale.

Pansement hémorroïdique parfait.

**Prop. théér.** — Action calmante, décongestionnante, hémostatique et directement curatrice, Absorption facile, inodore, incolore. Application méthodique *loco dolenti* et toujours aseptique.

**CRESTEY, Pharmacien**

164, Rue Saint-Honoré, 164

PARIS

---

## REGÉNÉRATEUR PULMONAIRE

**DU Dr O. BOUYER**

à base de Phénol synthétique  
chimiquement pure

Liquide dosé à raison de 0 gr. 05 par cuill. à bouche, sans causticité et parfaitement toléré par les estomacs les plus susceptibles.

**Doses.** — 4 cuill. à bouche pour les grandes personnes; 4 cuill. à dessert pour les enfants de 7 à 14 ans; 4 cuill. à café pour les enfants de 2 à 7 ans.

**Indications.** — Toutes les affections chroniques et secrétantes des voies respiratoires.

8,80 le litre et 5,50 le 1/2 litre avec remise de 25 % pour les Pharmaciens

**BARTHÉLEMY & C<sup>ie</sup>**

5, Rue Dugommier — NANTES

## RÉVULSIF LIQUIDE BOUDIN

**Prop. therap.** — 1° Il produit en une minute une révulsion intensive ; 2° Etant liquide, il peut être appliqué très rapidement sur une très large surface ; 3° Après le badigeonnage, le malade ne pouvant l'arracher, est forcé d'en subir les effets ; 4° Il ne colore pas et n'abîme pas la peau, peut être renouvelé et appliqué plusieurs fois par jour ; 5° absorbé par la peau, il agit efficacement sur les régions profondes qu'il décongestionne très vite ; 6° Il ne contient aucun produit nuisible pour les reins et se conservent indéfiniment ; 7° Il n'entre dans sa composition, ni cantharide, ni produit caustique ou acide.

**Indic. therap.** — I. — Maladies aiguës des voies respiratoires : Rhume. Laryngite, Bronchite, Congestion pulmonaire, Fluxion de poitrine, Pleurésie, Pneumonie, Broncho-pneumonie. — II. Maladies chroniques des voies respiratoires : Asthme, Emphysème, Catarrhe, Bronchite chronique, Tuberculose pulmonaire. — III. Douleurs, Rhumatismes, Névralgies : Torticolis, Lumbago, Points de côté, Rhumatismes aigu et chronique, Arthrites, Névralgies de toutes sortes.

**Mode d'emploi.** — 1° Dans les maladies aiguës ou chroniques des voies respiratoires, badigeonner deux fois par jour avec le pinceau imbibé du Révulsif le dos et la poitrine du malade. Laisser sécher et appliquer flanelle ou ouate. — 2° Dans les douleurs, rhumatismes, névralgies, badigeonner deux fois par jour avec le pinceau imbibé du Révulsif toute la région douloureuse ou malade et la recouvrir ensuite de flanelle ou d'ouate. — Pour les enfants dont l'épiderme est plus sensible que chez les grandes personnes, on peut additionner le Révulsif d'eau de Cologne ou d'alcool par partie égale.

**Laboratoire BOUDIN**

6, rue du Moulin — VINCENNES

## RÉSYL

Antiseptique pulmonaire

**Comp. et Prop.** — Ether glycéro-gaïnacolique soluble, non caustique, se décomposant pendant la traversée digestive et mettant en liberté du gaïacol à l'état naissant. Modificateur des sécrétions bronchiques; sous son influence la bronchorrhée diminue, les bacilles se raréfient, la température s'abaisse, l'état général et les signes stéthoscopiques s'améliorent.

**Indicat.** — Toutes les formes de tuberculose pulmonaire ouvertes ou fermées, avec ou sans température. Bronchites et toutes affections de l'appareil respiratoire en général.

**Posologie et Formes pharmac.** — Se prescrit sous forme de sirop, de comprimés ou d'ampoules, soit : 2 à 6 cuillerées à café de sirop, de 2 à 6 comprimés. Voie hypodermique : une ampoule tous les 2 jours.

Prix : Le flacon sirop : 6 fr.

Le tube de 20 comprimés : 4 fr.

La boîte de 12 ampoules : 8 fr.

**O. ROLLAND, Phar., 1, place Morand - LYON**

## RÉVULSIOR

Révulsif liquide

En réunissant toutes les propriétés des rubéfiants employés jusqu'à ce jour, n'en a aucun des inconvénients.

**Composit.** — Allylsénévol ..... 70 gr.  
Extrait intégral de capsicum ... .. 20 gr.  
Alcool éthylique à 85°..... 910 gr.  
Essences pour parfumer... .. q. s.

**Indicat. thérap.** — Angines et Affections de la gorge, Affections de la trachée et des bronches, Rhumatismes, Goutte, Lumbago, Torticollis, Sciatique, etc.

**Mode d'emploi** — Badigeonner au pinceau une ou plusieurs fois par jour la partie malade ou douloureuse. Une simple couche suffit.

Pour les enfants : Couper le Révulsior de moitié alcool ou eau de Cologne.

**Etablissements PAULIN & BARRÉ**

47, Rue Nationale — TOURS

(Indre-et-Loire)

## **RHINO-MENTHOL**

### **BAUME pour l'ANTISEPSIE NASALE**

*Scul procédé pratique, Bout spécial stérilisable*

**Souverain contre**

les Rhumes, le Coryza, les Rhinites et les Maladies du nez et de la Gorge. Préventif de la Tuberculose, des maladies infectieuses, grippe, etc., de toutes les affections d'origine nasale et de leurs complications auriculaires.

Prix : 2 fr. 50

**Dépôt : C. CARTILLIER, Pharmacien**  
48, Rue de Berri — PARIS

---

## **RHOFÉINE**

(Aspirine-Caféine)

Ajoute à l'action de l'Aspirine  
les propriétés stimulantes  
et toni-cardiaques de la caféine.

Comprimés dosés à 0 gr. 50 d'aspirine  
et 0 gr. 05 de caféine.

(1 à 6 par jour.)

**Laboratoire des Produits**

**"USINES DU RHONE"**

21, Rue Jean-Goujon — PARIS (8<sup>e</sup>)

## RHOMNOL



A base d'acide nucléinique pur et de nucléophosphates naturels.


**Indic. thér.** — Puissant reconstituant du noyau cellulaire, antineurasthénique de choix, indiqué dans toutes les affections dyscrasiques consomptives.

**Doses et mode d'emploi.** — *Pilules* à 0,05: 4 à 6 par jour aux repas. *Saccharure* (granulé) 0,10 par cuill. à café; une cuill. à café ou à dessert aux repas, pour adultes; moitié ou quart pour les enfants, suivant l'âge. *Ampoules* 1,5 et 10 c. c. (0,05 de nucléinate de sonde par c. c.) pour injections hypodermiques. (Spécialement indiquées dans les maladies infectieuses aiguës.)

**Dr M. LEPRINCE**

62, Rue de la Tour — PARIS (16<sup>e</sup>)

## RIODINE



**Compos.** — Éther glycérique iodé de l'acide ricinoléique contenant environ 20 % d'iode.

**Forme.** — Flacon de 50 perles. Chaque perle représente l'action de 0,20 cgr. environ d'iodure alcalin.

**Prop. Physiol.** — Médicament iodo-organique type, directement et totalement assimilable. Action prolongée et durable n'occasionnant aucun accident d'iodisme.

**Indications.** — Affections cardio-vasculaires: Artério-sclérose, Myocardites chroniques, Hypertension, etc. — Affections respiratoires chroniques: Emphysème pulmonaire, Bronchites chroniques, Asthme, etc. — Affections diverses: Obésité, Rhumatisme chronique, Scrofule, Syphilis, et dans toute affection où la médication iodée ou iodurée est indiquée.

**Dose.** — 2 à 6 perles par jour avant les repas.

Prix: 5 francs

**Laboratoires P. ASTIER**

45, Rue du Docteur Blanche — PARIS (16<sup>e</sup>)

## ROYÉRINE DUPUY

Poudre digestive absorbante  
en cachets

**Compos.** — Pepsine extractive; Pan-créatine extractive; Sous-carbonate de bismuth.

**Avantages.** — La pepsine et la pan-créatine associées à une poudre non fermentescible, antiputride, comme le carbonate de bismuth, se conservent indéfiniment et agissent toujours ainsi avec leur maximum d'action. Le carbonate de bismuth, non toxique, donne au contact du suc gastrique un dégagement très lent d'acide carbonique sans produire aucune distension de la paroi stomacale. Absorbant de premier ordre antiacide, ne provoque pas de constipation. Assure une digestion parfaite. Supprime les douleurs.

**Indications.** — Dyspepsies à forme hypersthénique ou hyposthénique. Gastralgies. Fermentations secondaires. Tympanisme. Maladie de Reiehmann. Entérites aiguës et chroniques. Diarrhées profuses des tuberculeux. Eruptions provenant de troubles digestifs (Urticaire).

**Dose.** — 2 cachets avant chaque repas. 6 et jusqu'à 8 cachets par jour dans les cas anciens et les diarrhées chroniques.

En boîtes de 40 cachets.

Laboratoire de Thérapeutique  
des Voies Digestives

J. LAUMONIER

225, Rue Saint-Martin. — PARIS



## SALÈNE CIBA

Analgésique externe

**Compos. et Prop.** — Ethers méthyl et éthylglyco salieylique. Liquide huileux, incolore, presque inodore, soluble dans l'alcool, l'éther, le chloroforme et quelques corps gras. Possédant, à un haut degré, les propriétés analgésiques du salicylate de méthyle, il a sur ce dernier l'avantage de son absence d'odeur et de toute action irritante.

**Indications.** — Le rhumatisme dans ses diverses manifestations.

**Formes pharm.** — Le *Salène* se formule magistralement, pur ou en liniments.

## SALÉNAL CIBA

Pommade au Salène, spécialement indiquée pour les traitements de longue durée. On l'utilisera avec profit pour les massages.

Prix :

4 fr., le tube de 30 gr.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**

1, Place Morand, 1

LYON

## SANTAL MONAL

au Bleu de Méthylène

**Forme.** — Capsules.

**Compos.** — Chaque capsule contient :

Essences balsamiques : 0 gr. 24

Bleu de Méthylène : 0 gr. 03

**Dose.** — 4 à 10 capsules par jour.

**Action.** — Antiseptique, Analgésique, Diurétique. Le plus actif et le mieux toléré des produits préconisés pour le traitement des Affections des Voies Urinaires.

**Particularité.** — Colore les urines en bleu.

**Laboratoires MONAL & C<sup>ie</sup>**

6, Rue Daubigny — PARIS

---

## SANTHÉOSE

A base d'une Diméthylxanthine irréprochablement pure, associée selon les cas au phosphate de soude, à la caféine ou au benzoate de lithine.

**Formes.** — Se présente en cachets en forme de cœur (dosés à 0,50 de principe actif) et existe sous 4 variétés :

1° *Santhéose pure* : Affections cardio-rénales, albuminurie ; 2° *Santhéose phosphatée* : Scléroses, convalescences ; 3° *Santhéose caféinée* : Asthénie, asystolie, infections ; 4° *Santhéose lithinée* : Artério-sclérose, rhumatisme, goutte.

**Dose.** — 1 à 4 cachets par jour.

**Prop. Thér.** — Diurétique, hypotenseur, toni-cardiaque, antitoxique.

**Indications.** — Toutes les affections justiciables d'un diurétique rénal direct.

**DÉPOT GÉNÉRAL :**

4, Rue Roi-de-Stelle — PARIS (4<sup>e</sup>)

## SANTOGÉNOL CAUBIN

**Compos.** — Forme granulée de Phosphates organiques et végétaux rendus intégralement assimilables par leur combinaison avec les vitamines du sous cortex des céréales (*Phosphates vitaminés Caubin*) en association avec du nucléinate de soude.

**Propriétés.** — Tonique puissant et seul reminéralisant scientifique.

**Indications.** — Anémie, Croissance, Convalescence, Grippe, Tuberculose, Maladies par carence.

**Doses.** — Nourrissons : 1/2 cuillerée à café. Enfants : 1 cuillerée à café. Adultes : 1 cuillerée à dessert. Avant les repas.

**Pharmacie CARTERET**

9, rue des Pyramides — PARIS

---

## SATUROL

**Compos.** — Bicarbonate, phosphate et sulfate de soude chimiquement purs (conditions essentielles d'efficacité). Formule du professeur Bourget de Lausanne).

**Action.** — Sature les acides de l'estomac; permet de ramener rapidement, à toutes les périodes de la digestion, l'acidité des hyperchlorhydriques au tarif normal de 0,2 %.

**Indications.** — Pyrosis (brûlures, acidité, aigreurs, pesanteurs, fermentations, spasmes pyloriques).

**Forme pharmaceutique.** — Granulé soluble.

**Dose.** — Une mesure dissoute dans un verre à bordeaux d'eau pure. Répéter aussi souvent que cela est nécessaire.

**Laboratoires DURET & RÉMY**

5, Avenue des Tillands — PARIS (18<sup>e</sup>)

## SAUGE GMET

Extrait total de "Sauge officinale"

Préparation liquide sans Alcool correspondant à 2 gr. de plante par cuill. à café.

**Doses et Mode d'emploi.** — 2 à 6 cuill. à café par jour dans un peu d'eau, en dehors des repas.

**Prop. Thér.** — Anti-sudorifique, Nervin, Tonique.

**Indications.** — Atonie, Sueurs profuses des tuberculeux et des grippés.

Littérature et échantillons sur demande au Service Médical des

### Produits GMET

27, Faubourg Montmartre — PARIS (9<sup>e</sup>)

Tél. Bergère 43.10

---

## SAVON ANTISEPTIQUE LIEUTAUD

Au goudron boraté

Son emploi est tout indiqué pour la guérison des maladies de la peau et pour la toilette intime.

MM. les docteurs ont intérêt eux-mêmes à faire usage du *Savon antiseptique Lieutaud* après une visite à ceux de leurs malades atteints de maladies contagieuses. Efficacité absolue, nombreuses attestations de notabilités médicales. Envoi sur demande à MM. les Docteurs contre 0 fr. 50 en timbres d'un spécimen d'essai en écrivant à

**A. RICHELME & C<sup>ie</sup>**

12, Rue Jacquand — MARSEILLE

# SAVON PÉRUSOL

au Baume du Pérou et Benjoin

**Indications.** — Toilette quotidienne, Soins hygiéniques de la peau et des muqueuses, Toilette des hémorroïdes, Dermatoses superficielles : rougeurs, boutons, acnés, gerçures, dartres, irritations variées. — Savon de choix pour la toilette des enfants et des personnes à épiderme sensible.

En incorporant à un savon de choix le *Baume du Pérou* et le *Benjoin de Siam*, on réalise avec des doses minimes de ces baumes, une *action thérapeutique efficace*, parce que le savon les dépose sur la peau mise au net.

**Laboratoire de Dermatologie E. VENDEL**

61, rue de Vaugirard — PARIS

## SAVONS ANTISEPTIQUES

Préparés avec des pâtes strictement neutres, entièrement saturées. Soins hygiéniques du corps; traitement des affections de la peau.

Savon doux, S. Surgras au beurre de cacao.

Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Goudron et Naphtol, S. Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Résoreïne, S. Salicylé.

Savon à l'Ichtyol, S. Panama et Ichtyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Iodé à 5 % d'iode, S. Mercuriel à 33 % de mercure, S. au Tannoforme contre les sueurs, S. à l'huile de Chaulmoogra (lépre, psoriasis), S. B. du Pérou et Pétrole (gale, parasitcs, etc.)

Savon Dentifrice Vigier pour l'entretien des dents, gencives et muqueuses; évite les accidents bucaux chez les syphilitiques.

**VIGIER & HUERRE**

Docteur ès-sciences

12, Boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS

## SAVONS PHARMACEUTIQUES

### marque "SPA"

Les Savons pharmaceutiques marque "SPA", préparés par un pharmacien attaché à la maison, se font à tous médicaments notamment : *Goudron de Norvège, Goudron boraté, Goudron et Panama, Boraté, Boriqué, Phéniqué, Sublimé, Sulfureux, au Soufre, à l'Huile de Cade* particulièrement recommandé ; à l'*Fichtyol, Acide salicylique, Crésil, Lanoline, Acide thimique, etc.,*

Ils donnent à MM. les Docteurs toutes les garanties de pureté et de dosage. En les prescrivant ils sont donc certains d'obtenir le maximum d'effet.

**A. RICHELME & C<sup>le</sup>, Fabricants**  
12, Rue Jacquand — MARSEILLE

---

## SCOROGÈNES

Régularisateurs des fonctions intestinales formés d'un mélange d'algues de la famille des floridées et de mucilages d'althéa additionnés, dans le *Scorogène-laxatif*, d'une petite quantité d'un glucoside du boldo, réunissant ainsi les actions gonflantes, émollientes et cholagogues à l'exclusion de toute action directement laxative.

### SCOROGÈNE granulé (sans sucre)

**Doses et mode d'emploi.** — Adultes : 3 à 6 cuill. à café par jour, en deux ou trois fois, au milieu des repas. — Enfants : 2 à 4 cuill. à café. Prendre de préférence « à sec » ce granulé en le portant directement sur la langue et en s'aidant d'une gorgée d'un liquide quelconque pour l'avaler.

### SCOROGÈNE-LAXATIF

Les cachets de Scorogène-Laxatif réunissent les éléments gonflants et mucilagineux du Scorogène et les principes laxatifs des rhamnées.

**Dose et mode d'emploi.** — De 1 à 3 cachets par jour au moment des repas.

**Laboratoires CLIN**

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

## SCURÉNALINE

Adrénaline synthétique chimiquement pure " Usines du Rhône " en solution au millième.

Flacons de 10 à 30 cc. et Boîtes de 5 ampoules de 1 cc.

**Laboratoire des Produits**

**" USINES DU RHONE "**

21, rue Jean-Goujon — PARIS (8<sup>e</sup>)

---

## SCUROCAÏNE

Novocaïne " Usines du Rhône "

**Ampoules** pour tous usages anesthésiques :  
Anesthésies par infiltration, rachidiennes,  
dentaires, régionales, rhino-laryngologi-  
ques, oculaires, etc...

**Comprimés** dosés à 0 gr. 05 pour prépara-  
tions extemporanées de toutes formules.

**Scurocaïne nitrate** pour addition, sans  
précipité, aux solutions de sels d'argent,  
de plomb, etc.,

**Scurocaïne base** pour préparation indolore  
de solutions huileuses injectables.

**Laboratoire des Produits**

**" USINES DU RHONE "**

21, rue Jean-Goujon — PARIS (8<sup>e</sup>)

## SCUROFORME

(Paraminobenzoate de Butyl normal)

Mêmes indications que les Orthoformes. Solubilité et, par suite, toxicité moindre. Anesthésie très supérieure, Anesthésique local, insoluble, non toxique

- 1° Scuroforme en nature. — Pour être employé en pulvérisation, en insufflation pour être associé aux pommades, lavements : Plaies douloureuses, Brûlures, Eczémas, Colites, Affections oto-rhino-laryngologiques.
- 2° Poudre lactosée à 1/10°. — Pour être employée en pulvérisation et insufflation : Affections rhino-laryngologiques, Dysphagie.
- 3° Pastilles chocolatées à 0 gr. 002. — Pastilles " RHODIA " spécialement indiquées contre : Stomatites, Angines, Pharyngites, Enrouements des fumeurs et des orateurs. Toutes affections douloureuses relevant de la Stomatologie.
- 4° Comprimés carbonato-calciques à 0 gr. 05. — N'exercent aucune influence sur les phénomènes de la digestion. Douleurs gastriques, Ulcérations.

Laboratoire des Produits " USINES DU RHONE "

21, rue Jean-Goujon — PARIS (8°)

## SÉDOGÈNE SALLÉ

Comprimés contre la Toux et la Dyspnée

**Présent.** — Le Sédogène se présente sous la forme de petites lentilles.

**Compos.** — *Aconit* (décongestif), *quebracho blanco* (fébrifuge-expectorant antiseptique) et très faible quantité de *dionine* et d'*héroïne* (calmants, antidyspnéiques).

**Indic.** — Action sédative vraiment *spécifique* sur les organes respiratoires, laryngites, rhumes, bronchites, catarrhe pulmonaire, asthme bronchique, emphysème, hémoptisies, tuberculose, manifestations pulmonaires de la grippe. A l'encontre des sirops pectoraux calmants, les comprimés de Sédogène n'ont aucune action nocive sur l'estomac, ne constipent pas, ne troublent pas l'activité cardiaque.

**Doses.** — 6 à 10 comprimés irrégulièrement espacés dans les 24 heures suivant les besoins. (En raison de l'*aconit*, il est prudent de ne pas donner de sédogène aux enfants âgés de moins de cinq ans). — Prix : 4 fr. 50.

Laboratoire BERGER — 4, rue des Pyramides



## SÉCACORNINE "ROCHE"

**Compos.** — Tous les principes actifs de l'ergot de seigle (*secale cornutum*) sous une forme soluble et injectable.

**Action thérap.** — Stable, d'action sûre, régulière et constante, c'est un vaso-constricteur puissant, donc un hémostatique interne énergique, décongestionnant, augmentant la tension artérielle et régularisant le pouls.

**Indic. thérap.** — a) *Action hémostatique.* Toutes les hémorragies internes, hémoptysies, hématomés, entérorragies, ménorragies, etc. — b) *Action liti-cardiaque.* Myocardites infectieuses. — c) *Action décongestive.* Congestion pulmonaire, états congestifs de l'encéphale, congestion éthylique, etc. — d) *Action vaso-constrictive.* Diarrhées, leucorrhée, lochies persistantes, sueurs des phthisiques, etc. — e) *Action sur les fibres musculaires lisses.* — a) *Utérus.* — Atonie utérine, avant, pendant, et après les accouchements et les avortements. — Troubles menstruels. — b) *Rectum et Vessie.* — Polypes du rectum (injection sous muqueuse). — Incontinence d'urine, spermatorrée etc.

**Doses et Mode d'emploi.** — 1 centimètre cube, ou 1 ampoule, ou 40 gouttes, ou 4 comprimés de Sécacornine "Roche" agissent comme 4 grammes de seigle ergoté.

**Thérapeutique d'urgence.** — 2 cc. ou 80 gouttes par voie buccale; ou 2 ampoules par voie hypodermique ou intramusculaire.

**Doses moyennes.** — 1/2 à 1 ampoule par jour, par voie hypodermique ou intramusculaire, 20 à 30 gouttes par jour, 1/2 à 1 cc. par jour; par voie buccale ou rectale; 2 à 4 comprimés par jour, par voie buccale.

**Thérapeutique Locale.** — 2 cc. ou 2 ampoules par jour, en injections intra-utérines (atonie utérine); 1 cc. ou 1 ampoule par jour, en injections sous-muqueuse (loco dolenti): Prolapsus du rectum.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>e</sup>

21, Place des Vosges — PARIS (3<sup>e</sup>)

## SÉDOBROL " ROCHE "

Extrait de bouillon végétal concentré  
aehloruré et bromuré

### Tablettes et Liquide :

1 tablette ou 1 mesure = 1 gr. Na Br.

### Mode d'emploi et Doses :

Adultes : 1 à 5 tablettes ou mesures par jour.

Enfants : 1/2 à 2 tablettes ou mesures par jour, selon l'âge.

Dans une tasse d'eau très chaude, on verse une ou deux mesures de *Sédobrol " Roche "* liquide ou on fait dissoudre une ou deux tablettes ; on prépare ainsi instantanément un bouillon particulièrement savoureux que l'on peut prendre à n'importe quel moment de la journée.)

### Prop. Thér. :

Médecament sédatif, hypnotique et calmant donnant des résultats certains et permettant d'imposer un *traitement bromuré intensif dissimulé*, tout en rendant agréable le régime déchloruré.

### Indic. Thér. :

Insomnies, névralgies, excitabilité, irritabilité, gastralgies, dyspepsies, palpitations, cardiopathies, migraines, spasmes, convulsions, chorée, névroses, épilepsie, etc.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co

21, Place des Vosges — PARIS

## SÉDOL

Association Scopolamine-Morphine

**Mode d'emploi et dose.** — Injection hypodermique : 1 à 3 ampoules par 24 heures.

**Propriétés.** — Antispasmodique, hypnotique, sédatif, hypocrinique.

**Indications.** — Phénomènes douloureux, Insomnies douloureuses, Cancers, Spasmes, Crises Tabétiques, Anesthésie chirurgicale, Accouchements, etc.

**Etablissements Albert BUISSON**

157, Rue de Sèvres — PARIS

---

## SEL DE HUNT

Alealin type

Régulateur Normal de l'Acidité gastrique et des Fonctions Digestives.

**Indications.** — Dyspepsies, Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Hyperacidité, Hypersthénie, Fermentations acides de l'Hyper et de l'Hypo-Chlorhydrie

**Forme.** — Granulé friable.

**Posologie.** — Une à une cuill. et demie à café dans un 1/2 ou 1/4 de verre d'eau. Pour les légers malaises ne nécessitant que de petites doses on peut à la rigueur prendre le *Sel de Hunt* à sec.

. Prix au public : 5 fr. 50 le flacon.

**Laboratoire Alph. BRUNOT**

16, Rue Boulainvilliers PARIS

(Téléphone : Auteuil 20-21)



## SERUM NEUROPHILE THEVENOT

**Composition.** — Soluté injectable de glycéro-phosphate de soude, de cacodylate de strychnine et de saccharose. L'addition de ce dernier corps a pour but de maintenir en solution la strychnine malgré l'alcalinité du liquide. — L'injection de ce liquide est indolore. Cette formule a été spécialisée à la suite de la communication de M. LECLÈRE, directeur des Usines Thevenot, à la *Société de Pharmacie de Paris* (février 1920).

**Indications.** — Modificateur très puissant des états asthéniques.

Echantillon sur demande.

Prix la boîte de 12 ampoules : 4 fr. 50

Produit fabriqué par la SOCIÉTÉ des  
PRODUITS PHARMACEUTIQUES THEVENOT  
DIJON

## SIROP D'AUBERGIER

à base de lactucarium d'Auvergne (Inscrit au Codex  
Communication à l'Académie de Médecine).

**Prop. thér.** — Action sédative et calmante, sans phase d'excitation, ni aucun des inconvénients de l'opium. — Eupucétique, indiqué dans toutes les affections des voies respiratoires. Également employé dans l'insomnie et dans tous les cas de surexcitation du système nerveux.

Convient particulièrement dans la médecine infantile.

**Forme.** — Sirop dosé à 0 gr. 10 de lactucarium et 0 gr. 0012 d'alcaloïde thébaïque par cuill. à soupe.

**Doses.** — Adultes : 2 à 4 cuill. à soupe par jour.  
Enfants : 1 à 3 cuill. à café par jour.

## PÂTE D'AUBERGIER

Adjuvant du traitement par le Sirop. — 10 à 12 morceaux par jour.

Laboratoires CLIN

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

## SIROP DE BLANCARD

A l'iodure de fer inaltérable  
10 cgr. par cuillerée à soupe.

**Dose et mode d'emploi.** — 1 à 3 cuillerées à soupe par jour.

**Propriétés.** — Agent incomparable d'Hématopoïèse.

**Indications.** — Anémie, Scrofules, lymphatisme, Chlorose, Leucorrhée, Aménorrhée, Syphilis accidentelles, ou constitutionnelles, suite de gripes infectieuses, etc.

**BERTAUT BLANCARD Frères,**  
64, Rue de la Rochefoucauld — PARIS

---

## SIROP de DIGITALE de LABELONYE

Sirop d'extrait de Feuilles de Digitale, contenant tous les principes actifs de la Digitale, à leur état naturel, et titré suivant sa teneur en Digitaline.

**Forme.** — Bouteilles et demi-bouteilles.

**Propriétés.** — Régulateur des contractions cardiaques et de la circulation. Diurétique. Toutes les indications de la Digitale. Dosé strictement à 1/3 de milligr. par cuill. à soupe.

**Dose moyenne.** — 3 cuill. à soupe par 24 h. à distance des repas, pendant 5 à 6 jours. Interrompre ensuite 10-15 jours, avant de recommencer.

**LABÉLONYE & C<sup>ie</sup>**  
99, Rue d'Aboukir — PARIS

## SIROP CROSNIER

Minéral-sulfureux  
au Monosulfure de sodium inaltérable  
et goudron.

Appréhation scientifique de l'Académie de Médecine de Paris

### Indic. therap. :

Affections subaiguës ou chroniques des  
voies respiratoires, Lymphatisme,  
Serofule, Dermatoses, Hydrargyrisme.  
Remplace avantageusement les eaux  
sulfureuses.

### Mode d'emploi :

Adultes : Une cuill. à soupe 2 ou 3 fois  
par jour une heure avant ou deux  
heures après les repas.

## GRANULES CROSNIER

Ces granules d'une assimilation parfaite  
ont exactement la même composition  
que le *Sirop Crosnier* et jouissent  
des mêmes propriétés. (2 granules  
correspondent exactement à une cuill.  
de sirop.

Ils conviennent spécialement, par la  
économie de leur emploi, aux per-  
sonnes qui ne peuvent faire usage du  
sirop.

Maison CROSNIER

6, Rue Chanoinesse — PARIS

## SIROP GIRARD

Iodotannique phosphaté

Même composition que le Vin Girard.  
S'ordonne plus spécialement en médecine infantile.

**Mode d'emploi :**

1 ou 2 cuill. à dessert ou à bouche  
par jour.

**A. GIRARD**

48, Rue d'Alésia, 48

PARIS

---

## SIROP DE LA MATERNITÉ

Ext. de fl. pêcheur 25 gr., Manne en larmes 20 gr.

Alcool 60 gr., Alc. de mandarine 5 gr.

Sirop q. s. pour 1 litre.

**Dose et mode d'emploi.** — Jusqu'à 2 mois  
1/2 cuill. à café, au-dessus de 2 mois 1 à  
2 cuill. à café.

**Propriétés thérap.** — Laxatif pour enfants,  
pouvant être donné à tout âge. Pas de  
coliques.

**Indications.** — Constipation, Embarras gas-  
trique. Pas de contre-indications.

**Laboratoire L. LAURIN**

86, Boulevard Port-Royal — PARIS



# SIROP " ROCHE "

## AU THIOCOL

1 cuill. à soupe de Sirop " Roche " = 1 gr. de Thiocol " Roche ".

1 gr. de Thiocol " Roche " = 0,52 egr. de gaiacol cristallisé.

**Doses et Mode d'emploi.** — Adultes : 2 à 4 cuill. à soupe par jour ; Enfants : 2 à 4 cuill. à café selon l'âge.

**Prop. Thér.** — Antiseptique pulmonaire, Phagocyto-gène, Eupéptique, Orexique.

**Indic. Thér.** — Toutes les affections broncho-pulmonaires : Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Grippe, Pneumonie, Coqueluche, Scrofule, Anémie, Rachitisme, Dyspepsie, Entérites, Diarrhées, etc.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**  
21, Place des Vosges — PARIS

# SOLUROL

(Acide thyminique pur)

**Prop. thér.** — Eliminateur physiologique de l'acide urique. Traitement de la diathèse urique sous toutes ses formes.

**Formes.** — Comprimés dosés à 0 gr. 25

**Doses et mode d'emploi.** — Crises aiguës : 5 à 7 comprimés par jour. Cures périodiques : 3 à 4 comprimés par jour. Ecraser les comprimés pour les avaler.

**Remarque.** — Le Solurol doit faire l'objet de cures périodiques chez tous les malades, qui ont à redouter le retour d'accidents uriques. Ces cures devront de préférence avoir lieu au printemps et à l'automne surtout chez les gouteux. Elles dureront chaque fois 3 à 4 semaines, au minimum.

**Laboratoires CLIN**

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

## SOLUTIONS du D<sup>r</sup> CLIN

1<sup>o</sup> Au Salicylate de Soude. 2<sup>o</sup> Au Salicylate de Lithine. 3<sup>o</sup> A l'Antipyrine.

**Avantages.** — Pureté et tolérance garanties.

**Formes et doses.** — 1<sup>o</sup> Solution du D<sup>r</sup> Clin au Salicylate de Soude dosée à 2 gr. par cuill. à soupe. 2 à 4 cuill. à soupe par jour.

2<sup>o</sup> Solution du D<sup>r</sup> Clin au Salicylate de Lithine, dosée à 1 gr. par cuill. à soupe. 1 à 4 cuill. à soupe par jour.

3<sup>o</sup> Solution d'Antipyrine du D<sup>r</sup> Clin, dosée à 1 gr. par cuill. à soupe. 1 à 3 cuill. par jour.

**Remarque.** — Grâce à leur véhicule spécial, les solutions du D<sup>r</sup> Clin assurent la tolérance et la diffusion du médicament et se sont acquises à ce point de vue, une réputation bien connue.

### Laboratoires CLIN

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

---

## SPASMINE JOLLY

Combinaison physiologique stabilisée  
de Valériane fraîche et Aubépine  
*Sans odeur — Saveur agréable*

**Forme.** — Elixir dosé à 0 gr. 10 par cuill. à café.

**Doses et mode d'emploi.** — 1 à 6 cuill. à café par 24 heures, 1/2 dose pour les enfants.

**Prop. thér.** — — Antispasmodique; Sédatif du système nerveux; hypnotique et hypotenseur.

**Indications.** — Nervosisme. — Affections spasmodiques; Hystérie; Insomnies, etc.

Echantillons et notices sur demande au

### Laboratoire Louis JOLLY

27, Rue Mazarine — PARIS (7<sup>e</sup>)

# SPASMALGINE " ROCHE "

## Antispasmodique vrai

**Composition.** — 1 ampoule ou 1 comprimé contient :

- A - Un centigramme PANTOPON " ROCHE "  
(Opium total injectable).
- B - Deux centigrammes PAPAVERINE " ROCHE "  
(Alcaloïde de l'opium le moins toxique, à propriétés spasmolytiques spéciales).
- C - Un milligramme ATRINAL " ROCHE "  
(Ether sulf-atropine, sans action sur le centre parasympathique).

**Propriétés.** — Les propriétés antagonistes des éléments entrant dans la composition de la *Spasmalgine " Roche "* expliquent la toxicité atténuée de ce médicament prouvée par l'expérimentation et la clinique.

**Indic. thérap.** — Tous les états spasmodiques, et notamment coliques hépatiques et néphrétiques, spasmes du larynx, de l'intestin, de l'estomac, coliques, sueurs, diarrhées des tuberculeux, dysménorrhée, angine de poitrine, hoquet épidémique, excitation anté et post-opératoire, accouchements laborieux, tous états d'hyperexcitation, etc.

**Dose et mode d'emploi :**

- |  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| Voie buccale...                            | { | Dose moyenne : 1 à 2 compr.   |
|  |   | par jour.                     |
|  | { | Dose forte : 2 à 4 comprimés  |
|  |   | par jour.                     |
| Voie hypodermique<br>ou<br>intramusculaire | { | Dose moyenne : 1 à 2 ampoules |
|  |   | par jour.                     |
|  | { | Dose forte : 2 à 4 ampoules   |
|  |   | par jour.                     |

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**

21, Place des Vosges — PARIS

## **SPHÉRULINES CHOLAGOGUES**

**" MONCOUR " (Extrait de Bile)**

**Forme :**

Sphérulines dosées à 0 gr. 10.

**Dose :**

2 à 6 sphérulines par jour.

**Indication :**

Coliques hépatiques, Lithiase, Ictère  
par rétention.

**Pharmacie DE MONTCOURT**

49, Avenue Victor-Hugo

**BOULOGNE - PARIS**

---

## **SPHÉRULINES ENTÉRIQUES**

**" MONCOUR " à l'Extrait Intestinal**

**Forme :**

Sphérulines dosées à 0 gr. 30.

**Dose :**

2 à 6 sphérulines par jour.

**Indication :**

Constipation, Entérite muco-mem-  
braneuse.

**Pharmacie DE MONTCOURT**

49, Avenue Victor-Hugo

**BOULOGNE - PARIS**

# SPHÉRULINES HÉPATIQUES

“ MONCOUR ”

**Forme.** — Sphérulines dosées à 0 gr. 30  
et suppositoires dosés à 3 gr.

**Dose.** — 4 à 16 sphérulines par jour et  
1 à 4 suppositoires par jour.

**Indications.** — Toutes maladies du foie  
et Diabète par anhépatie.

**Pharmacie DE MONTCOURT**

49, Avenue Victor-Hugo

BOULOGNE - PARIS

---

# SPHÉRULINES “ MONCOUR ”

A L'EXTRAIT

ENTÉRO-PANCRÉATIQUE

**Forme.** — Sphérulines dosées à 0 gr. 25.

**Dose.** — De 1 à 4 sphérulines par  
jour.

**Indication.** — Affections intestinales  
et Troubles dyspeptiques.

**Pharmacie DE MONTCOURT**

49, Avenue Victor-Hugo

BOULOGNE - PARIS

## SPHÉRULINES "MONCOUR"

à l'Extrait Gastrique

**Forme :**

Sphérulines dosées à 0 gr. 125.

**Dose :**

4 à 16 sphérulines par jour.

**Indication :**

Hypopepsie.

**Pharmacie DE MONTCOURT**

49, Avenue Victor-Hugo

BOULOGNE - PARIS

---

## SPHÉRULINES "MONCOUR"

à l'Extrait Pancréatique

**Formes :**

Sphérulines dosées à 0 gr. 20 et  
suppositoires dosés à 1 gr.

**Dose :**

De 2 à 10 sphérulines par jour et  
de 1 à 2 suppositoires par jour.

**Indications :**

Diabète par Hyperhépatie.

**Pharmacie DE MONTCOURT**

49, Avenue Victor-Hugo

BOULOGNE - PARIS

## SPHÉRULINES "MONCOUR"

à l'Extrait Rénal

**Forme.** — Sphérulines dosés à 0 gr. 15.

**Dose.** — 4 à 16 sphérulines par jour.

**Indication.** — Insuffisance rénale, Albuminurie, Néphrites, Urémie.

**Pharmacie DE MONTCOURT**

49, Avenue Victor-Hugo,

BOULOGNE - PARIS

---

## SPHÉRULINES OVARIENNES

"MONCOUR"

**Forme :**

Sphérulines dosées à 0 gr. 20

**Dose :**

1 à 3 sphérulines par jour.

**Indication :**

Aménorrhée, Dysménorrhée Ménopause, Neurasthénie féminine.

**Pharmacie de MONTCOURT**

49, Avenue Victor-Hugo

BOULOGNE - PARIS

## SPHÉRULINES THYROÏDIENNES " MONCOUR "

### BONBONS THYROÏDIENS " MONCOUR "

**Forme.** — Bonbons correspondant à 0 gr. 05 d'organe frais. Sphérulines correspondant à 0 gr. 35 d'organe frais.

**Dose.** — 1 à 4 bonbons par jour.

1 à 6 sphérulines par jour.

**Indications.** — Myxœdème, Obésité, Arrêt de croissance, Fibrômes.

**Pharmacie DE MONTCOURT**

49, Avenue Victor-Hugo

BOULOGNE - PARIS

---

## STANION

**Description.** — Étain colloïdal en capsules et en ampoules.

*Capsules :* contiennent 0 gr. 05 d'étain colloïdal avec enrobage de kératine (50 capsules par flac.).

*Ampoules :* contiennent 3 cm<sup>3</sup> de solution isotonique d'étain colloïdal électrique (4 ampoules par boîte).

**Action thérapeutique.** — L'étain colloïdal s'emploie dans le traitement de toutes les staphylococcies où il permet d'obtenir la régression de l'œdème, suppression de l'inflammation et de la douleur, retour à la température normale, assèchement des foyers, expulsion aisée des bourbillons, et les récidives sont évitées.

**Indications.** — 1 à 2 ampoules par jour dans le traitement des staphylococcies, soit au voisinage de l'abcès, soit dans la fesse.

*Capsules :* 4 à 10 par jour dans le traitement des furonculoses, folliculites, anthrax, phlegmons, panaris, abcès tuberculeux, pyodermites, sycosis, septicémies staphylococciques.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**

18, Avenue Hoche — PARIS



## STANNOXYL

Préparé sous le contrôle scientifique de A. Frouin

**Compos.** — Produit à base d'étain et d'oxyde d'étain exempts de plomb.

**Forme.** — Comprimés, cachets, stannoxyl injectable en ampoules de 1 cc. (usage interne).  
Stannoxyl liquide, bain, pommade, glycéré, gaze (usage externe).

**Prop. thérap.** — Action spécifique contre les Staphylocoques, Médication de choix contre la Furunculose, l'Acné, les Orgelets, l'Abscess du Sein et la Lymphangite des nourrices.

**Doses et Mode d'emploi.** — Dose quotidienne :  
Quatre à huit comprimés par jour pour les adultes, Deux à quatre pour les enfants.

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE

37, rue de Bourgogne — PARIS

Usines à Bourg-la-Reine.

5 et 7, rue Poliveau, Paris.

## STANNYLOSE THEVENOT

**Composition.** — *Comprimés dissociables* d'étain et d'oxyde d'étain de pureté contrôlée.

**Indications.** — Traitement des infections staphylocoques. La *Stannylose Thevenot* réussit notamment bien contre l'acné des jeunes gens si rebelle à tous traitements. — Il est à noter que nos comprimés se délitent rapidement au contact des liquides. C'est ce qui explique l'énergie de leur action. Les comprimés d'étain fabriqués habituellement dans le commerce traversent inaltérés le tube digestif. (Voir les journaux médicaux et pharmaceutiques de 1920.)

**Doses.** — 2 à 4 comprimés à chacun des grands repas (laisser le produit se délayer de lui-même dans un peu d'eau ou de tisane pendant deux ou trois minutes).

Echantillon sur demande.

Prix du flacon de 80 comprimés : 6 fr.

Produit fabriqué par la SOCIÉTÉ des  
PRODUITS PHARMACEUTIQUES THEVENOT  
DIJON

# STAPHYLASE

du Docteur DOYEN

Solution concentrée des principes actifs des levures de bière et de vin.

**Indications.** — Aené, Furunculose, Anthrax, Ostéomyélite, Impetigo, Angines, Bronchites, Pneumonies, Gripes, Coryza, Stomatites, Dyspepsie, Entérites.

**Doses.** — Adultes : 4 à 12 cuill. à potage par jour ; Enfants : 1 à 4 cuill. à café par jour.

Associée à l'iodure de potassium et au bromure de potassium la Staphylase a la propriété d'annihiler les effets secondaires de ces produits.

**P. LEBEAULT & C<sup>ie</sup>**

5, Rue Bourg-l'Abbé — PARIS (3<sup>e</sup>)

---

# STAPHYLO-COCCINE

FRAQUET

Extrait protoplasmique de la levure de bière isolé de sa membrane cellulaire. La levure est ainsi de digestion plus facile, d'action plus prompte et à doses moindres. Agent de la phagocytose, la Staphylo-coccine s'emploie en solution, comprimés et ampoules contre la furunculose, l'angine, les maladies infectieuses, les dermatoses, etc.

**Laboratoire des PRODUITS SCIENTIA**

10, Rue Fromentin, 10

PARIS

## STÉRAMINE

Pâte antiseptique soluble

**Compos.** — Crème onctueuse stéaro-sodique contenant 1 % de Clonazone Daufresne, libérant lentement dans la plaie de l'hypochlorite naissant.

**Indications.** — Plaies récentes ou infectées, brûlures, engelures, ulcères variqueux....

**Mode d'emploi.** — Appliquer une fois par jour une couche de 2 à 3 millimètres d'épaisseur et recouvrir d'un pansement sec.

**Avantages.** — Action antiseptique prolongée, pansement propre et sans odeur, cicatrisation rapide.

Le tube de Stéramine: 3 fr. 50

Echantillons médicaux sur demande.

**Laboratoire des ANTISEPTIQUES CHLORÉS**

40, rue Thiers — LE HAVRE

---

## STOVAÏNE

Chlorhydrate

de Diméthylaminobenzoylpentanol

Produit synthétique. Le moins toxique des anesthésiques locaux, à pouvoir égal; aucune action vaso-constrictive; agit comme tonique du cœur et comme antiseptique.

L'action de la Stovaïne est au moins égale à celle de la cocaïne, mais son absence de toxicité permet d'en utiliser des doses beaucoup plus considérables. La Stovaïnomanie n'existe pas.

En dehors des emplois chirurgicaux (rachianesthésie, anesthésie locale et régionale) la stovaïne se prescrit dans toutes les affections internes et externes où il s'agit de combattre la douleur, le prurit ou l'irritation. Littérature et échantillons sur demande.

**Etablissements POULENC Frères**

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

## STROPHANTUS CATILLON

(Prix de l'Académie de Médecine)

**Forme.** — Granules de Catillon à 0,001 d'Extrait titré de Strophantus.

**Indications.** — Asystolie, Oppression, Dyspnée, Œdèmes, Affections mitrales, Cardiopathies enfants et vieillards.

**Posologie.** — 2 à 4 granules par jour, comme tonique du cœur *diurétique*. En cas urgent, on peut donner 10 à 20 granules pour forcer la diurèse.

Si l'on ne veut pas d'effet diurétique, mais seulement *tonique*, on prescrit les

### GRANULES DE CATILLON

à 0,0001 de Strophantine cristallisée

3, Boulevard Saint-Martin — PARIS

---

## STRYCHNARSITOL ROBIN

Injectable

Nucléophosphate de soude pur et  
méthylarsinate de strychnine

Ampoules injectables de 2 c.c.

**Dose et mode d'emploi :**

Une injection Hypodermique de 1 c. c.  
par 24 heures pouvant être portée  
à 2 c. c. en une seule injection  
dans les cas graves.

**Laboratoires M. ROBIN**

13, Rue de Poissy — PARIS

## SULFARÈNE

Soufre colloïdal électrique associé :

Au Hg. à l'As, au Va ; Syphilis et toutes ses manifestations. **Ampoules** : Injections intramusculaires.

Aux aromates : Camphre, Essence de Niaouli, etc. Affections gynécologiques : **ovules**.

Aux corps plurimétalliques colloïdaux contenus dans les eaux minérales sulfurées : **Bain-Gelée en tube**.

Formule intégrale sur chaque boîte.

**Formule et Méthode du Dr MOLINÉRY**  
de Luchon

Ancien interne des Hôpitaux de Toulouse

**Dépôt général : Laboratoires du Sulfarène**  
Droguerie Centrale du Sud-Ouest — AGEN  
PARIS — Michelat et Souillard

## SULFARSENOL

(Ether sulfureux du 606)

**Indicat.** — Agit comme un spécifique dans la Syphilis, Rhumatismes. Arthrites et Salpingites bleunhoragiques, Paludisme, Angine de Vincent, Gangrènes pulmonaires, Variole, Pian, Fièvre récurrente.

**Mode d'emploi.** — Injections sous-cutanées et intra-musculaires massives, intra-veineuses.

**Avantages.** — Trois fois moins toxique que le 914. Traitement énergique par doses accumulées. Emploi facile chez enfants et nourrissons (sous-eutané).

**Vente en Gros :**

**Laboratoire R. PLUCHON**

92, rue Michel-Ange — PARIS (XVI<sup>e</sup>)

Téléph. : Auteuil 26-62

## SULFOIODOL ROBIN

Soufre colloïdal

Granulé — Ampoules — Pommades

**Doses et Modes d'emploi.** — *Granulé* : 2 cuillers-mesure 2 fois par jour. Chaque cuiller contenant 10 centig. de soufre colloïdal.

*Injectable* : 1 inj. par jour dans les cas graves. Dans les cas ordinaires 1 inj. tous les 2 ou 3.

**Indications.** — Troubles de la nutrition sulfurée, Pharyngites chroniques, Bronchites chroniques, Antisepsie de l'intestin, Rhumatismes aigus et chroniques, Arthritismes, Syphilis.

**Laboratoires M. ROBIN**

13, Rue de Poissy — PARIS

---

## SULFURION

**Description.** — Complexe colloïdal électrique, isotonique, non toxique et indolore, à base de soufre, en ampoules de 3 cc. (4 ampoules par boîte).

**Action thérapeutique.** — Le sulfurion libère les ankyloses dans le rhumatisme chronique, diminue les nodosités, permet le retour au fonctionnement des articulations et remédie à l'insuffisance sulfurée. En même temps les phénomènes douloureux disparaissent et le retour à la santé s'établit.

**Indications.** — 1 ampoule de 3 cc. tous les 2 ou 3 jours dans toutes les formes de rhumatisme aigu ou chronique, simple, fibreux, osseux, partiel, blennorrhagique, et dans toutes les insuffisances sulfurées, goutte, acné, pharyngites chroniques, etc.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**

18, Avenue Hoche — PARIS

## SULFURYL MONAL

**Forme.** — Pastilles agréables à sucer.

**Compos.** — Synthèse des eaux minérales sulfurcuses. Chaque pastille dégage 2 cc. d'hydrogène sulfuré dans l'estomac.

**Dose.** — 2 à 8 pastilles par jour.

**Propriétés.** — Permet d'instituer d'une façon active partout et en toute saison la *cure sulfureuse*.

**Indications.** — Affections de la gorge et des voies respiratoires. Traitement sulfo-mercuriel dans la syphilis. Maladies de la peau.

**Laboratoires MONAL & Cie**  
6, Rue Daubigny — PARIS

## SUPPARGYRES

du Docteur FAUCHER

Traitement de la Syphilis acquise ou héréditaire, récente ou ancienne. Méthode simple sous forme discrète, *voie rectale*, active et sans inconvénient à tous les âges et dans tous les états (grossesse, fatigue, voyage, etc.).

**Forme.** — Suppositoires à 0,04 cgr. de Hg. vif préparé mécaniquement à froid pour obtenir une division absolue.

**Dose.** — 1 le soir en se couchant. Suivre le traitement 30 à 40 jours, repos de 8 ou 10 jours ou davantage et recommencer.

**Nota.** — Hg. vif est et reste le seul anti-syphilitique indiscutable et redouté. Sa véritable voie d'absorption est la voie rectale parce que tous les capillaires de l'intestin vont au foie qui vitalise et rend Hg. actif : On mélange à une solution d'arséno-bromal des trépanèmes vivants : *Ils vivent*. Mais si l'on ajoute au mélange une trace d'EXTRAIT de FOIE, les trépanèmes sont foudroyés.

(Exp. de Levaditi.)

**Laboratoire du Docteur TISSOT**  
34, Boulevard de Clichy — PARIS

# SUPPOSITOIRES MIDY

(Adrénostyptiques)

Adrénaline.....	1/4 mgr.
Anesthésine-stovaïne.....	0,06 egr.
Ext. de Marrons d'Inde frais	
stabilisé.....	0,02 egr.

(Hamamelis)

pour un suppositoire.

## Dose et mode d'emploi :

Introduire un ou deux suppositoires par jour, aux instants les plus propices, soit le matin une heure avant d'aller à la selle, c'est-à-dire avant le moment où l'expulsion des matières fécales refoule et congestionne les hémorroïdes, soit le soir en se couchant, lorsque les hémorroïdes sont douloureuses, congestionnées par la fatigue et la station verticale.

## Propriétés Thérapeutiques :

Décongestionnants, astringents, anesthésiques, calmants, antiseptiques.

## Indications :

Traitement rationnel des Hémorroïdes.

Détail : 140, Faubourg Saint-Honoré  
PARIS

**Laboratoires MIDY**

9, Rue du Commandant Rivière, 9  
PARIS (8<sup>e</sup>)



## SUPPOSITOIRES PEPET

(Beurre de Cacao-Glycérine)

pour Bébés, pour Garçonnetts,

pour Adultes.

Constipation, Hémorroïdes.

La boîte : 5 francs.

La 1/2 boîte : 3 francs.

**Henry ROGIER**

Docteur en Pharmacie.

19, Avenue de Villers, 19

PARIS

---

## TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

A base d'oxygène naissant, menthol, coca-stovaine, benzoate de soude, etc. Tablettes de goût agréable.

**Doses et mode d'emploi.** — Adultes, 10 à 15 par jour à sucer; Enfants, 6 à 10 par jour à sucer.

**Propriétés.** — Anesthésiques, antiseptiques, pectorales.

**Indications** — Affections des voies respiratoires et de la gorge, Toux, Gripes, Pharyngites, Bronchites, Asthme, Emphysème, Tuberculose, hygiène de la bouche et des dents.

**Laboratoire des Produits Scientia**  
10, Rue Fromentin — PARIS

## TABUROL MONAL

Opothérapie Sanguine et Reminéralisation.

**Forme.** — Dragées.

**Compos.** — Sérum hématopoiétique hémoglobiné associé au fluorure de calcium méthylarsiné.

**Dose.** — 4 à 6 dragées par jour aux repas.

**Action.** — Hématogènes, Reconstituantes, Reminéralisatrices.

**Indications.** — Etats Anémiques, Chlorose, Neurasthénie.

**Laboratoires MONAL & C<sup>ie</sup>**

6, Rue Daubigny — PARIS

## TÆNIFUGE KIRN

en capsules

à base de filicine, principe actif de la fougère mâle dissous dans son huile grasse.

Tœnifuge, le plus actif, ne présentant pas les dangereux inconvénients des trépaniques, comme la pelletièreine.

(Travaux et thèse de Kirn et Schmidt).

**Capsules Kirn.** — Capsules à l'extract vert éthéré de fougère mâle, mais caractérisées par ce fait unique que le titre du principe actif, la filicine, est toujours stable et uniforme; sans calomel.

**Mode d'empl.** — 1<sup>o</sup> Avant-veille, purgation; 2<sup>o</sup> la veille, diète presque absolue (lait); 3<sup>o</sup> Le matin à jeun l'absorption de 6 en 6 minutes, des 12 capsules du flacon avec un peu de sirop d'éther ou un grog.

Résultat certain si ces indications sont scrupuleusement suivies.

**Enfants.** Capsules Kirn, spécialement dosées.

Médication sans similaires ni équivalents

Capsules Kirn, prix : 10 fr., réglementé

Capsules Kirn, prix : 6 fr., réglementé

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**

8, Rue de la Source — PARIS (16<sup>e</sup>). Tél. Aut. 06-62

## TAMPOL " ROCHE "

Pansement gynécologique idéal

Le *Tampol Roche* est constitué par un ovule derrière lequel est comprimée une certaine quantité de laine aseptique non absorbante, contenue dans une capsule de gélatine et portant à son extrémité un cordonnet.

**Mode d'emploi.** — Plonger pendant 3 à 4 secondes environ le *Tampol Roche* dans de l'eau bouillie à peine tiède, puis, la malade ayant pris la position gynécologique, introduire ce pansement, jusqu'au fond du vagin et le maintenir en place quelques minutes. Au bout de ce temps, la dissolution de la gélatine s'est effectuée, la laine s'est développée en tous sens : le *tamponnement vaginal est parfait*.

N. B. Il ne faut jamais se servir pour l'introduction du *Tampol Roche* d'huile ou de corps gras qui empêchent la dissolution de la capsule de gélatine.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**

21, Place des Vosges — PARIS

## TAXOL

**Composition :**

Extrait total des glandes de l'intestin.....	0 gr. 05
Extrait biliaire.....	0 gr. 10
Agar-Agar.....	0 gr. 05
Ferments lactiques.....	0 gr. 05

**Forme.** — En comprimés de 0 gr. 25.

**Prop. Thér.** — Régulateur physiologique de l'intestin. Aucune accoutumance. Non toxique.

**Indication.** — Constipation.

**Dose et Mode d'emploi.** — Commencer le traitement par deux comprimés après un des repas. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit. Avaler sans mâcher.

**Laboratoire de Bio-Chimie Appliquée**

21, Rue Théodore-de-Banville — PARIS (17<sup>e</sup>)

## TERKAL MONAL

**Forme.** — Dragées.

**Compos.** — Carbonate de gaiacol ter-pino-codéiné associé au nucléinate de chaux fluoruré.

**Dose.** — 4 à 6 dragées par jour entre les repas.

**Action.** — Calmantes, Expectorantes, Curatives, Reminéralisatrices.

**Indications.** — Bronchites, Affections broncho-pulmonaires.

**Laboratoires MONAL & C<sup>ie</sup>**  
6, Rue Daubigny — PARIS

---

## THAOLAXINE

(Laxatif-régime)

Combinaison d'agar-agar et d'extrait de rhamnées. Paillettes, cachets, comprimés, granulé.

**Doses et mode d'emploi.** — Paillettes 1 à 4 cuillerées à café à chaque repas; cachets, 1 à 4 cachets à chaque repas; comprimés, 2 à 8 comprimés à chaque repas; granulé, 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas, (Spécialement préparé pour les enfants).

**Prop. Thér.** — Exonérateur de l'intestin, agit en augmentant le volume et l'hydratation des fèces.

**Indications.** — Spécifique de la constipation habituelle.

**Laboratoires DURET & RÉMY**  
5, Avenue des Tilleuls — PARIS (18<sup>e</sup>)

## THÉÏSINE DUBAT

Granulé sucré à base de *théobromine* pure et d'extraît de maïs.

*Le plus puissant diurétique connu dans les affections du cœur et des reins : Urémie, Albuminurie, Artériosclérose, Hydropisies, Intoxications, oppressions.*

Action certaine, constante, durable; toxicité nulle; seule préparation de théobromine ne produisant ni maux de tête, ni troubles nerveux, et tolérée par les enfants, comme par les vieillards.

**Dose et mode d'emploi :**

1 cuill. à café = 0 gr. 25 théobromine pure  
0 gr. 05 extrait mou de maïs.  
une à huit cuillerées à café par jour.

**G. DUBAT**, Docteur en Pharmacie  
80, Rue Faubourg-Saint-Denis — PARIS

## THÉOBROMOSE DUMESNIL

Théobrominate de lithium cristallisé

**Prop. Thé.** — Possède les propriétés toni-cardiaques et diurétiques de la théobromine mais elle agit à des doses 4 à 5 fois moindres que celle-ci; elle est dépourvue des inconvénients de la théobromine.

**Indications.** — Les effets cardio-toniques et vaso-dilatateurs de la Théobromose, en outre de son action diurétique énergique, font de ce produit associé ou non à la Digitaline (Méthode de Huchard) la base de la thérapeutique cardio-rénale. Elle est indiquée dans l'urémie, l'uricémie, l'artério-sclérose, la sclérose cardio-rénale, les œdèmes d'origine cardiaque ou rénale, etc.

**Forme.** — 1<sup>re</sup> Solution. Dose : 3 à 4 cuill. à soupe par jour dans un peu d'eau sucrée.

Une cuill. équivaut à 0,50 egr. de théobromine.

2<sup>e</sup> Gouttes. — Dose : 3 à 4 par jour.

60 gouttes équivalent à une cuill. à soupe de solution.

3<sup>e</sup> Comprimés. — Dose : 6 à 8 par jour.

2 comprimés équivalent à 0,50 egr. de Théobromine.

**Laboratoires DUMESNIL**

10, Rue du Plâtre — PARIS

# THÉOBRYL " ROCHE "

(Théobromine injectable)

Indications, Contre-indications, Action thérapeutique de la Théobromine, mais plus maniable, plus actif et à doses moindres.

(Voir les travaux des Professeurs Pouchet, Rémond, E. Duhot, des Docteurs Jouisse, Richard St-Yves, Bénech, Ségard, Vigouroux, Colomiès, Crampon, etc.)

Toujours très bien toléré par les adultes, les vieillards et les enfants, sous deux formes très pratiques : Ampoules et Gouttes.

## THÉOBRYL " ROCHE " AMPOULES

chaque ampoule = 2 cc.

Cette forme est à préférer quand il y a intolérance gastrique ou susceptibilité du malade et chaque fois qu'il faut agir vite et imposer un traitement intensif.

*Dose moyenne.* — *Par voie intramusculaire indolore.* — Adultes : 2 ampoules par jour. Enfants : 1/2 ampoule par jour.

*Dose forte.* — *Par voie intramusculaire indolore.* — Adultes : 3 à 4 ampoules par jour. Enfants : 1 ampoule par jour.

*Dose d'urgence.* — *Par voie endoveineuse ou intramusculaire.* — Adultes : 3 à 4 ampoules par jour, en 1 ou 2 fois. Enfants : 1 à 2 ampoules par jour, en 1 ou 2 fois.

## THÉOBRYL " ROCHE " GOUTTES

1 cc. = XXX gouttes

Cette forme permet de continuer et de prolonger l'action obtenue par les injections ou de réaliser un *traitement d'entretien* toujours parfaitement supporté. Chaque dose doit être prise dans un verre d'eau sucrée ou aromatisée ou bien dans une tasse de tisane de queues de cerises, orge et chiendent, stigmates de maïs, etc., à n'importe quel moment de la journée, de préférence une demi-heure avant ou après les repas.

*Dose moyenne.* — Adultes : XXX gouttes, 2 à 3 fois par jour et plus. Enfants : XV gouttes, 2 à 3 fois par jour selon l'âge. Ces doses peuvent être largement dépassées sans aucun inconvénient, sous la surveillance médicale.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**

21, Place des Vosges — PARIS (3<sup>e</sup>)

## THÉOSALVOSE

**Composition.** — Théobromine chimiquement pure, extraite du cacao. (Usine à Villeneuve-la Garenne, Seine).

**Propriétés.** — Diurétique d'une innocuité complète, d'un pouvoir remarquable, d'une fidélité constante.

**Indications.** — Artériosclérose, Affections cardiaques et rénales, Albuminurie, Intoxications, Urémie, Uricémie, Goutte, Gravelle, Rhumatismes, Hydropisie, Maladies infectieuses, Scarlatine.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 cachets dosés à 0 gr. 50 par jour.

**Forme.** — Théosalvose pure, digitalique, strophantique, spartéinée, seillitique, caféinée, phosphatée, lithinée.

**Laboratoires André GUILLAUMIN**

13, Rue du Cherche-Midi — PARIS

## THIGÉNOL " ROCHE "

Solution aqueuse d'oléo-sulfonate de sodium, ni toxique, ni caustique, sans odeur désagréable et ne laissant pas de taches indélébiles sur le linge.

**Prop. thér.** — Antiseptique, analgésique, kératoplastique, décongestionnant et puissamment résolutif.

**Indic. thér.** — Dermatologie, Oto-rhino-laryngologie, Ophtalmologie, Médecine générale, Erysipèle, Brûlures, Fissures, Rhumatismes, etc.

*Thigénol " Roche "* pur ou en solution glycérinée (10 à 15 %) en applications externes :

*Savon " Roche "* au *Thigénol*, le meilleur savon antiseptique.

*Toutes les affections gynécologiques :*

*Thigénol " Roche "* pur ou en solution glycérinée (10 à 15 %).

*Ovales " Roche "* au *Thigénol* à 30 % (voir page spéciale).

*Tampol " Roche "* pansement gynécologique idéal (voir page spéciale).

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co**

21, Place des Vosges — PARIS

## THIOL " ROCHE "

Dérivé du gaïacol, inodore ni toxique, ni caustique, soluble dans l'eau.

1 gr. de Thiocol " Roche " = 0,52 de gaïacol cristallisé.

**Doses et modes d'emploi :**

*SIROP " ROCHE " au Thiocol*

(1 cuill. à soupe = 1 gr. Thiocol " Roche ")

Adultes : 2 à 4 cuill. à soupe par jour

Enfants : 2 à 4 cuill. à café, selon l'âge

*CACHETS " ROCHE " de Thiocol*

(1 cachet = 0,50 Thiocol " Roche ")

2 à 6 cachets par jour

*COMPRIMÉS " ROCHE " de Thiocol*

(1 comprimé = 0,50 Thiocol " Roche ")

2 à 6 comprimés par jour

**Propriétés Thér. :**

Antiseptique pulmonaire, Phagocyto-gène, Eupeptique, Orexique.

**Indic. Thér. :**

Toutes les affections broncho-pulmonaires, Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Grippe, Pneumonie, Coqueluche, Scrofule, Anémie, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites. Diarrhées, etc.

**Produits**

**F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**

21, Place des Vosges — PARIS



# THIONHYDROL GRÉMY

Soufre colloïdal

*Liquueur* titrée à 0 gr. 20 par cuill. à soupe. — *Pommade*. — *Ovules gynécologiques*.

**Doses et mode d'emploi.** — Une cuill. à soupe de *Liquueur* au milieu de chaque repas. — *Pommade* en frictions matin et soir.

**Indications principales.** — Rhumatisme chronique. — Affections chroniques des voies respiratoires (rhinites, pharyngites, laryngites, bronchites avec expectoration muco-purulente). — Syphilis (adjuvant du traitement mercuriel). — Vaginites et métrites.

Dans l'arthritisme, il y a avantage à associer au Thionhydrol la Thyrénine Grémy.

14, Rue de Clichy — PARIS (9<sup>e</sup>)

## THYRÉNINE GRÉMY

Principes actifs totaux de la glande thyroïde.

*Pilules* dosées à 0,02, correspondant à 0,20 de glande fraîche.

*Tablettes* dosées à 0,01, correspondant à 0,10 de glande fraîche.

**Doses et mode d'emploi.** — Débuter par une pilule par jour pendant deux jours, puis alternant une et deux, puis deux pilules par jour. Au besoin, élever progressivement la dose jusqu'à six pilules, dose maxima.

*Tablettes* : doses doubles.

Suspendre momentanément le traitement : 1<sup>o</sup> si le pouls dépasse 100 pulsations, 2<sup>o</sup> si le malade accuse de la diarrhée, des transpirations, des bouffées de chaleur, des palpitations, du tremblement.

**Indications.** — Insuffisance thyroïdienne.

Arthritisme : associer la *Thyrénine* au *Thionhydrol Grémy*.

14, Rue de Clichy — PARIS (9<sup>e</sup>)

## TISANE SAINT-LUC

Plantes aromatiques dépuratives

Séné et Bourdaine privés de leur ferment irritant.

Dépuratif : 1 dose.

Laxatif : 2 doses.

Purgatif : 3 doses.

Très agréable au goût, ne produisant jamais de douleurs intestinales.

Prix : 3 francs la boîte

**Comte René de GRAUWE**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe

16, Rue de Rocroy — PARIS

---

## TOCHLORINE

(Paratoluène sulfochloramine)

Produit antiseptique préconisé par Dakin sous le nom de Chloramine T.

C'est une poudre cristalline blanche, très soluble dans l'eau, ne coagulant pas l'albumine des plaies.

Douée d'une action germicide intense, elle n'est ni toxique ni irritante.

**Usages Chirurgicaux :** La Toehlorine trouve de nombreuses applications sous forme, soit de solution aqueuse à 1 % ou 2 %, soit de pâtes ou crèmes, en chirurgie générale, en urologie, en oéulistique, en stomatologie.

**Usages médicaux :** Pour l'usage interne la Toehlorine a été proposée comme désinfectant de l'intestin ainsi que dans le traitement de la tuberculose pulmonaire.

Littérature et échantillons sur demande

**Etablissements POULENC Frères**

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

# TONIKÉINE CHEVRETIN

## Sérum neuro-tonique

Ampoules contenant chacune :

Eau de mer isotonique.....	5 cc.
Cacodylate de soude.....	0,05
Glycérophosphate de soude..	0,20
Sulfate de strychnine.....	1 mil.

**Prop. thér.** — Possède les propriétés stimulantes de l'eau de mer auxquelles s'ajoute l'action des 3 médicaments dont l'action tonique et reconstituante est bien connue.

**Indications.** — Tuberculose, neurasthénie, entérites. Convalescents.

**Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE**

5, Rue Ballu — PARIS (Tél. Central 45-56)

---

## TRIFERYL

**Forme.** — Comprimés chocolatés de Nucléinate de fer, composé ferro-organique entièrement assimilable, dosées à 0 gr. 30.

**Doses et mode d'emploi.** — Adultes : 3 comprimés par jour, au début de chacun des repas. Les croquer.

Enfants : Donner 1 ou 2 comprimés par jour aux repas.

**Prop. thér.** — Puissant reconstituant des globules sanguins et des noyaux cellulaires. Augmente la quantité d'hémoglobine dans le sang jusqu'à 90 %

**Indications.** — Anémies, Chlorose, Faiblesse générale, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, etc.

**E. HAUTDIDIER**

37, Rue Galilée — PARIS

## TRICALCINE

A base de sels calciques rendus assimilables : phosphates tribasiques, carbonates et autres sels de chaux et de magnésie nécessaires à l'organisme. Cette spécialité reproduit la formule de Ferrier, ce qui explique et justifie sa vogue. La Tricalcine pure s'emploie en poudre, comprimés, granulés, cachets et tablettes chocolat dans le traitement de la tuberculose et comme tonique de premier ordre, dans l'anémie, les convalescences, etc.

Tricalcine en poudre : une mesure à chacun des 3 repas dans un peu d'eau ou mélangée aux aliments, 1/2 dose au-dessous de 10 ans; comprimés : 3 par jour; granulés : 2 cuillers-mesure à chaque repas, enfants au-dessous de 10 ans, 1/2 dose; tablettes chocolat : 2 tablettes à chacun des 3 repas, enfants au-dessous de 10 ans, une tablette; cachets : 3 par jour.

Tricalcine méthylarsinée (0 gr. 01 par cachet) en cachets seulement : 3 par jour; enfants, 2.

Tricalcine adrénalinée en cachets seulement : 3 par jour.

Tricalcine fluorée en cachets seulement : 3 par jour.

(1) Les études radiographiques sur l'ostéoporose dans les fractures de guerre ont démontré l'importance de la récalcification par la Tricalcine, en chirurgie osseuse. De plus dans les cas de déminéralisation, elle apporte par transformation physiologique, grâce au chlorure de calcium et à l'acide glycérophosphorique, les matériaux indispensables pour rétablir la nutrition troublée.

**Laboratoire des Produits Scientia**  
10, Rue Fromentin — PARIS

## TUBERCULINE C. L.

Pour le traitement de la tuberculose

Le Tuberculine C. L. est présentée en solution dans de l'eau physiologique stérilisée.

La série des ampoules est répartie en trois boîtes de 12 :

Boîte O. — Ampoules contenant par centi-cube de 1 cent millième à 7 dix-millièmes et demi de milligramme.

Boîte A. — Ampoules contenant par centi-cube de 1 millième à 8 dixièmes de milligramme.

Boîte B. — Ampoules contenant par centi-cube 1 milligramme.

Dose. — Habituellement, une injection tous les 12 jours.

Les injections ne produisent aucune douleur ni aucune gêne et le malade peut vaquer aux occupations permises par son médecin.

Littérature et échantillons sur demande

**Etablissements POULENC Frères**  
92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

## TUBÉROL

Association d'essences balsamiques pures.

Prop. thérap. — Sans aucune toxicité. Inoffensif. Il est absorbé par la peau ou respiré en fumigations ou inhalations, puis exhalé avec toute son efficacité antiseptique par la muqueuse des voies respiratoires. Une petite quantité est éliminée par les reins dans les urines.

Indic. therap. — A). Toutes affections des voies respiratoires : Broncho-pneumonie, Bronchite capillaire, Abscès du poulmon, Pneumonie grises, Bronchites aiguës, Catarrhes des emphysemateux, etc.

B). Les états ganglionnaires : Ganglions et Abscès froids non fistuleux.

Mode d'emploi — 1° Applications thoraciques. Dans une flanelle bien imbibée qui séchera à même la peau.

2° En inhalations. Une demi-cuill. à cuilé dans un litre d'eau bouillante.

3° En compresses. Sur les ganglions, pur ou mélangé de 2 ou 3 parties d'huile ou de vaseline.

**A.-P. BROCADET**

89, Rue du Commerce — PARIS

Téléph. Saxe 52-47

## ULCERINE BERGER

**Forme.** — Pommade contenant les principes actifs du *populus nigra* et *balsamifera*.

**Indic. Thé.** — Ulcères variqueux, Brûlures anciennes, Escarres, Radiodermites, Chancre mou, Bubons chancereux, Plaies à la suite d'opérations, Ulcérations succédant aux gelures.

**Propriétés.** — Cicatrisation des Ulcères variqueux en déterminant une prolifération cellulaire intense qui remplace la perte de substance. — Epidermisation rapide des brûlures anciennes, des Escarres, des Radiodermites. Guérison des chancres mous en quelques jours.

**Mode d'emploi.** — Laver la plaie avec de l'eau bouillie additionnée de moitié eau oxygénée chirurgicale à 12 volumes. Appliquer ensuite sur la plaie une gaze stérilisée préalablement enduite d'Ulcérine et maintenir le pansement avec une bande élastique. Faire le pansement matin et soir

Echantillons sur demande :

**Laboratoires I. BERGER**

90, Av. du Bac La Varenne-Saint-Hilaire (Seine)

## URASEPTINE ROGIER

A base de Piperazine, Urotropine, Helmitol, Benzoate de soude et de lithine.

Granulé soluble dosé à 0 gr. 60 de substance active par cuill. à café.

**Dose.** — 3 à 6 cuill. à café par jour.

**Propriétés.** — Antiseptique Urinaire par excellence. Dissout et chasse l'acide urique.

Le flacon : 8 fr.

**Henry ROGIER, Docteur en Pharmacie**  
19, Avenue de Villiers — PARIS

## URAZINE

(Citro-salicylate de Pipérazine)

Le plus actif des dissolvants de l'acide urique et des urates, analgésique, antiseptique.

Le médicament de choix à opposer à la *lithiase rénale* et à toutes les *manifestations arthritiques* (goutte, rhumatisme, gravelle, etc.).

Innocuité absolue. Aucune contre-indication.

**Comprimés** dosés à 0 gr. 30 (3 à 4 par jour, au moment des repas).

**Granulés effervescents**, une cuillerée à café, dans un demi-verre d'eau, aux deux principaux repas.

**Laboratoire des Produits**

**"USINES DU RHONE"**

21, Rue Jean-Goujon — PARIS (8<sup>e</sup>)

---

## UROFORMINE GOBEY

(Urotropine Française)

Comprimés dosés à 0,50. Solution injectable en ampoules de 1, 2 et 5 cc. à 0 gr. 25 par cc.

**Dose et mode d'emploi.** — 2 à 6 comprimés par jour dans un verre d'eau froide. Injections de 1 à 3 gr. par jour.

**Prop. thér.** — Le plus puissant antiseptique interne. Dissolvant parfait de l'acide urique.

**Indications.** — Fièvres infectieuses, Grippe, Encéphalite, Complications broncho-pulmonaires, etc., Rhumatismes, Infections des voies biliaires et urinaires, etc.

**G. BEYTOUT & L. CISTERNE**

12, Boulevard St-Martin — PARIS (10<sup>e</sup>)

# UROMETINE LAMBIOTTE FRÈRES

Comprimés de 0 gr. 50  
d'Hexaméthylène tétramine pure

**Dose et Modes d'emploi.** — *Traitement de la Diathèse urique* : 3 comprimés par jour dissous dans un peu d'eau et pris à n'importe quel moment.

*Maladies des voies Urinaires.* — *Etats aigus* : 6 à 8 comprimés par jour pris dans un peu d'eau à n'importe quel moment. — *Etats chroniques* : de 3 à 4 comprimés par jour.

**Indications.** — Contre la Diathèse urique et les infections des voies urinaires.

**Prop. Thér.** — Dissolvant puissant des urates, antiseptique urinaire type.

Littérature et échantillons :

**Produits LAMBIOTTE Frères**

3, Rue d'Edimbourg — PARIS (8<sup>e</sup>)

Téléph. Wagram 14-73

## UROTRYPSINE

**PAGEL, Docteur en Pharmacie**

*Directeur du laboratoire de chimie biologique de Vittel.*

à base des sels de

**VITTEL**

Véritable ferment uricolytique.

Empêche la formation de l'acide urique et en facilite l'élimination.

**Granulé effervescent** : Une cuillerée à café, 3 fois par jour.

**Indication** : Il n'existe pas de remède plus puissant contre : Arthritisme, artériosclérose, lithiases rénale et biliaire, rhumatisme, sciaticque, goutte.

**Laboratoire DEMASLES**

VIENNE (Isère)



## VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

Ces vaccins sont constitués par des émulsions de cultures microbiennes en milieu fluoruré.

Le procédé de préparation assure d'une façon absolue la mort des microbes, qui conservent cependant toutes leurs propriétés à la vie près. Pratiquement *atoxiques* et *stabilisés* ils conservent leur activité pendant une très longue période.

On peut les utiliser à titre *curatif*, sans réaction fébrile appréciable.

Polyethniques, donc polyvalents, leur efficacité est sensiblement égale à celle des auto-vaccins. Leur emploi ne nécessite ni calculs, ni technique compliquée.

La série comprend les trois vaccins suivants :

DMEGON antigonococcique,

DMESTA antistaphylococcique,

DMETYS anticoquelucheux.

(Voir chacun de ces mots)

**Mode d'emploi et Posologie.** — Injections sous-cutanées ou intra-musculaires d'une ampoule tous les jours ou tous les deux jours.

Littérature et échantillons sur demande :

**Etablissements POULENC Frères**

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

# VACCINS MICROBIENS CURATIFS

## IMMUNIZOLS GRÉMY INJECTABLES

(Voir : Immunizols)

### Médicaux

- 10 Furonculose.
- 11 Entérite.
- 12 Appendicite.
- 13 Asthme.
- 14 Asthme des foins.
- 15 Eczéma. — Psoriasis.
- 16 Bronchites chroniques.
- 17 Rhumatisme.
- 18 Uréthrites.
- 19 Aené.
- 20 Méningocoque.
- 21 Dysenterie.
- 22 Typhoïde.
- 23 Grippe.

### Oculaires

- 60 Conjonctivites chroniques.
- 61 Ulcérations de la cornée.

### Chirurgicaux

- 30 Ostéomyélite.
- 31 Abscès chauds. Plaies suppurées.
- 32 Abscès froids. — Fistules.
- 33 Sarcome.
- 34 Gangrène.

### Génito-Urinaires

- 40 Cystites. — Pyélonéphrites.
- 41 Métrites.
- 18 Uréthrites.

### Auriculaires

- 50 Otites. — Sinusites. Mastoïdites.

### Dentaires

- 70 Pyorrhée alvéolo-dentaire.

## IMMUNIZOLS GRÉMY en comprimés

à administrer par voie buccale.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>10 Furonculose.</li> <li>11 Entérite.</li> <li>12 Appendicite.</li> <li>13 Asthme.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>14 Asthme des foins.</li> <li>15 Eczéma. — Psoriasis.</li> <li>18 Uréthrites.</li> <li>22 Typhoïde.</li> <li>41 Métrites</li> </ul> |
|--|--|

## VACCINS MICROBIENS PRÉVENTIFS

### IMMUNIZOLS GRÉMY

- 22 Typhoïde mixte (injectable ou en comprimés).
- 23 Grippe.

NOTA. — On prescrit les IMMUNIZOLS GRÉMY en spécifiant :

1° Le nom de l'affection à traiter ou le numéro qui lui correspond dans la nomenclature ci-dessus ; 2° s'il s'agit d'un Immunizol *injectable* ou d'un Immunizol *en comprimés* (voie buccale).

Exemples : Immunizol Grémy "Asthme" injectable ou Immunizol Grémy 13 injectable. — Immunizol Grémy "Entérite" en comprimés ou Immunizol Grémy 11 en comprimés.

14, Rue de Clichy — PARIS (9<sup>e</sup>)

## VALBORNINE ROGIER

(Iso-Valérianate de Bornyle Bromé)

**Perles.** — 3 à 6 par jour avant les repas; ou, pour l'insomnie, 2 perles le soir, deux heures après un léger repas.

**Propriétés.** — Antispasmodique énergique et puissant sédatif du système nerveux, régulateur de la circulation et de la respiration.

Le flacon : 6 fr.

**Henry ROGIER, Docteur en Pharmacie**  
19, Avenue de Villiers — PARIS

---

## VALÉRAL PUY

Liquide ou capsules  
Bromovalérianate sodique alcalin.

Succédané plus actif des Valérianates et des Bromures, tolérance absolue, odeur, saveur agréables, action fidèle et soutenue, pas d'accoutumance.

*Véritable spécifique des Névroses convulsives douloureuses spasmodiques, Phobies, Névralgies, Insomnies, Crampes.*

**Dose.** — Une cuillerée à soupe ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral. 2 à 3 cuillerées à soupe dans 1/2 verre d'eau sucrée par jour, dont une le soir.

Envoie échantillon et littérature

**Laboratoire PUY**  
GRENOBLE

## VALÉRIANATE LIQUIDE GRIGNON

à odeur dissimulée

**Composition.** — Contient tous les principes actifs de la plante fraîche.

**Forme.** — Liquide de goût agréable, l'odeur de valériane est absolument masquée.

**Prop. therap.** — Antinerveux, antispasmodique.

**Dose et mode d'emploi.** — 2 à 3 cuill. à café par jour.

**Pharmacie GRIGNON**  
2, Rue Duphot — PARIS

---

## VALÉRIANATE PIERLOT

Le VALERIANATE PIERLOT,

liquide ou en capsules

RESTE TOUJOURS et MALGRÉ TOUT

l'unique préparation efficace et inoffensive, résumant tous les principes sédatifs et névrosthéniques de la valériane officinale.

**H. RIVIER**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe

Successeur de LANCELOT & C<sup>le</sup>

26 et 28, Rue Saint-Claude

PARIS

## VALÉRIANE GMET

Extrait *total* de Valériane officinale

Préparation liquide *sans alcool* correspondant à 2 gr. de plante par cuill. à café.

**Doses et mode d'emploi.** — 1 à 4 cuill. à café par jour dans un peu d'eau froide. Enfants 1/2 dose.

**Prop. thér.** — Antispasmodique. Tonis-sédatif cérébro-médullaire.

**Indications.** — Insomnies, Chorée, Epilepsie, Agitation, Névralgies. Tous états névropathiques.

Littérature et échantillons sur demande au

**Service Médical des Produits GMET**

27, Faubourg Montmartre — PARIS (9<sup>e</sup>)

Tél. Bergère 43.10

---

## VALÉROBROMINE LEGRAND

*Liquide* : Dosé à 0,50 egr. de bromovalérianate de soude par cuill. à café.

*Capsules enrobées de gluten* : Dosées à 0,25 egr. de bromovalérianate de magnésie par capsule.

**Propriétés.** — Sédatif anti-nerveux. Exerce une action énergique sur les centres nerveux. Diminue et abolit leur excitabilité réflexe.

**Indications.** — Toutes les indications des bromures avec plus d'activité et sans en avoir les inconvénients.

**Doses.** — *Liquide* : 2 à 6 cuill. à café par jour dans un peu d'eau sucrée. *Capsules* : 4 à 12 capsules par jour.

**DARRASSE Frères**

13, Rue Pavée — PARIS

## VALÉROMENTHOL

Préparation à base de *sue frais de valériane* combiné au *Validol*.

**Prop. thérap.** — Tous les avantages des bromures sans aucun de leurs inconvénients. Calmant par excellence. Antispasmodique sûr. Antidote de la douleur, des troubles nerveux et des états pathologiques de la neurasthénie.

**Indic. thérap.** — Neurasthénie, Hystérie, Insomnie, toutes Affections nerveuses.

**Mode d'emploi.** — 3 à 5 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau ou d'infusion.

**Laboratoire de la**  
**PHARMACIE INTERNATIONALE**  
108, Faubourg Saint-Honoré, 108  
PARIS

## VALÉRONAL

Solution ou Comprimés.

Sédatif puissant et inoffensif  
des troubles nerveux, Psychopathies.

**Hypnotique doux sans odeur.**

**Formule** par cuil. à café ou par comprimé :  
Véronal sodique très pur..... 0 gr. 15  
Extrait fluide de Valériane fraîche Q. S.

**Dose sédatif** : 1 cuillerée à café ou un comprimé, 2 à 4 fois par jour.

**Dose hypnotique** : 1 cuillerée à café ou un comprimé avant le dernier repas et 2 ou 3 au coucher dans infusion.

Prix : 7 Fr.

**Laboratoire BERGER**  
14, Rue des Pyramides — PARIS

## VANADARSINE GUILLAUMIN

### GOUTTES

**Composition.** — Solution d'arséniate de Vanadium au centième.

**Propriétés.** — Puissant stimulant de l'appétit, sans aucune action néfaste sur l'estomac et les intestins. Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces. Sous son influence le teint redevient frais.

**Indications.** — S'emploie avec succès dans la pré-tuberculose et la tuberculose, la chorée, le rachitisme des enfants, les états anémiques, chlorotiques, dans la neurasthénie, les dépressions nerveuses, le surmenage, le paludisme et les leucémies.

**Mode d'emploi.** — La Vanadarsine s'administre aux mêmes doses que la liqueur de Fowler dont elle n'a pas les inconvénients : V à X gouttes dans un peu d'eau avant les 2 principaux repas.

## VANADARSINE GUILLAUMIN

### AMPOULES

(Sérum Vanadarnisé)

**Composition.** — Ampoules contenant 0 gr. 002 arséniate de vanadium par cent. cube.

**Propriétés.** — Solution très stable, indolore, parfaitement tolérée en injections hypodermiques. Reconstituant globulaire sanguin de premier ordre, oxydant énergique, excite l'appétit, augmente le poids et les forces et stimule les combustions organiques.

**Indications.** — Chlorose, anémie, pré-tuberculose, tuberculose, chorée, rachitisme, paludisme, syphilis, asthénie, leucémies, neurasthénie, surmenage, convalescence, anorexie.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : Injecter 1 à 2 cent. cubes par jour ou tous les deux jours.

*Enfants* : Injecter selon l'âge,

Faire une vingtaine d'injections. Après 8 à 10 jours de repos recommencer le traitement si nécessaire.

**Laboratoires André GUILLAUMIN**

13, Rue du Cherche-Midi — PARIS

## VARILAXINE

Groupe cinq laxatifs différents : Rhubarbe, Cascara, Podophyllin, Rhamnus, Tamarin, mais d'action équivalente.

Chaque boîte renferme 5 tubes, numérotés de 1 à 5.

**Dose et Mode d'emploi.** — Avaler, sans les croquer, un ou deux Comprimés avant le repas du soir en alternant du n° 1 au n° 5, pour reprendre au n° 1 le 6<sup>e</sup> jour, et continuer la variation.

**Prop. Thér.** — Action laxative toujours identique — Jamais d'accoutumance ni d'irritation — Tolérance parfaite — Innocuité absolue.

**Laboratoire de la VARILAXINE**

164, Rue Saint-Honoré — PARIS

---

## VASOLAXINE

Huile de Vaseline pure

**Dose :**

Adultes : 1 cuillerée à soupe en se levant à jeun et le soir en se couchant.

Enfants : 1 cuillerée à café.

Aromatiser, si jugé nécessaire, avec menthe, citron, cognac, etc.

**Indications :**

Constipation, Entérites, Appendicites chroniques, Hémorroïdes.

Le flacon 6 fr. 50

**Laboratoires FOURNIER Frères**

26, Boulevard de l'Hôpital — PARIS



## VEINOSINE

Traitement spécifique complet des affections veineuses.

Comprimés à base de : Hamamélis virginica, Marrons d'Inde, Citrate de soude, Glandes thyroïde et hypophyse.

**Indications.** — Hyposphyxie, Phlébites aiguës et chroniques, Insuffisance valvulaire de la saphène, Varices, Varices de la grossesse, Pseudo-varices par troubles des glandes à sécrétions internes, Hémorroïdes, Troubles de la vie génitale chez la femme, Puberté, Ménopause.

**Doses.** — Deux comprimés avant les repas de midi et du soir.

**P. LEBEAULT & C<sup>ie</sup>**

5, Rue Bourg-l'Abbée — PARIS (3<sup>e</sup>)

---

## VERONIDIA BUISSON

Solution de diéthylmalonylurée associée à l'extrait de Passiflora incarnata dans un véhicule synergique et agréable au goût. Chaque cuill. à soupe de solution ou chaque comprimé renferme 0 gr. 25 de principe actif.

**Prop. Thér.** — Sédatif idéal de l'hyperexcitabilité nerveuse dans toutes ses manifestations : Névroses diverses, Palpitations, Phobies, Insomnies, Névrose d'angoisse, etc.

**Dose.** — 2 cuill. à café comme antispasmodique dans le courant de la journée. — 1 à 2 cuill. à soupe ou comprimés comme hypnotique, le soir au coucher.

**Etablissements Albert BUISSON**

157, Rue de Sèvres — PARIS

## VIN DE BUGAUD

Toni-nutritif

Malaga vieux - Quinquina - Cacao

### Indications .

Faiblesse générale, Anémie,  
Surmenage, Etats consomptifs, Diabète,  
Convalescence des Maladies aiguës,  
Anémie palustre, etc.

### Dose :

Un verre à liqueur aux deux principaux repas.

**P. LEBEAULT & C<sup>ie</sup>**

5, Rue Bourg-l'Abbée — PARIS (3<sup>e</sup>)

---

## VIN GIRARD

Iodo-tannique phosphaté.

**Nature.** — Le *Vin Girard* est la meilleure formule des préparations iodo-tanniques phosphatées consacrée par l'usage. — Un verre à madère de *Vin Girard* contient :

Iode.....	0 gr. 075 mil.
Tannin.....	0 gr. 50 cent.
Lactophosphate de chaux	0 gr. 75 cent.

**Mode d'emploi.** — 1 ou 2 verres à madère par jour pour une grande personne, demi-dose pour enfant.

**Prop. therap.** — Tonique et reconstituant, augmente la phagocytose.

**Indicat.** — Lymphatisme, scrofule, tuberculose au 1<sup>er</sup> degré, engorgements ganglionnaires, convalescences.

**Laboratoire A. GIRARD**

48, Rue d'Alésia — PARIS

# VIN ET SIROP NOURRY

Iode et tannin en combinaison stable

**Applications thérapeutiques.** — 1° Lymphatisme dans toutes ses manifestations osseuses, ganglionnaires, oculaires, etc. — 2° Voies respiratoires : Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques. — 3° Gynécologie : Formation des jeunes filles, Ménopause, Aménorrhée, Dysménorrhée. — 4° Convalescences : Intoxications chroniques, Anoréxies. — 5° Artériosclérose : Athéromes, Anévrisme de l'aorte, Angine de poitrine. — 6° Affections thyroïdiennes. — 7° Syphilis tertiaire.

**Formes.** — Vin et sirop dosés à 0 gr. 05 d'iode et 0 gr. 10 de tannin par cuill. à soupe de 15 gr. 00 gr. 015 par cuillère à café.

**Dosés.** — La dose moyenne à prescrire est : Adultes, une cuill. à soupe ; Adolescents, une cuill. à dessert ; Enfants, une cuill. à café. Au moment des principaux repas.

**Nota.** — En raison de la réaction que le Vin Nourry peut avoir sur le métal de certaines cuillères, il est bon d'employer un verre à liqueur ordinaire préalablement gradué, une fois pour toutes avec des cuillerées d'eau.

## Laboratoires CLIN

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

## VIOFORME CIBA

Antiseptique pulvérulent à base d'iode.

**Comp. et Prop.** — Iodoehloroxyquinoléine, poudre jaune brun, de réaction neutre, inaltérable à l'air et à la lumière. Le meilleur succédané de l'iodoforme; inodore, non toxique, n'irritant pas les tissus. Anti-séptique énergique et cicatrisant de premier ordre.

**Indicat.** — Ulcères variqueux, escarres, plaies atones, chancrels mous. Eczémas, brûlures (pommade de 2 à 10 %). Plaies du nasopharynx (insufflation). Plaies et cavités infectées.

**Posologie et Forme pharm.** — Se formule magistralement à la dose jugée nécessaire.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND, Ph<sup>icien</sup>**

1, Place Morand — Lyon

## VULCASE

Comprimés laxatifs,  
dépuratifs au soufre organique assimilable.

**Prop. thérap.** — Destinés à combattre l'intoxication d'origine diathésique et infectieuse, les comprimés de *Vulcase* aseptisent les voies digestives, participent à la désagrégation du bol alimentaire, compensent en soufre les pertes consécutives à la période d'intoxication et fournissent aux tissus la molécule de soufre nécessaire à la charpente des albumines variées qui forment l'ensemble de l'organisme.

**Indicat.** — Constipation, Rhumatismes articulaires, dermatoses, maladies des voies respiratoires, affections de l'intestin, entérite, hémorroïdes.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 comprimés par jour.

**Laboratoires Pierre BRISSON & C<sup>ie</sup>**  
111, Rue du Mont-Cenis — PARIS

---

## XEMADERM

**Composition.** — Pommade à base de corps gras entièrement absorbés par la peau.

**Aspect.** — Crème blanche d'odeur agréable.

**Propriétés.** — Calme les démangeaisons et favorise la reconstitution des tissus.

**Indications.** — ECZÉMA et toutes les affections para-eczémateuses : aené, impétigo, pityriasis, psoriasis, séborrhée, etc...

**Mode d'emploi.** — En applications matin et soir.

Dans l'aené ponctuée, lotionner d'abord avec l'*Acnédermine* (solution décapante).

**Laboratoire GILLOT**

59, Rue de Châteaudun — PARIS

## ZOHOL

**Prop. Thér.** — Reconstituant.

**Indications.** — Anémie, Surmenage, phaturie, Convalescences.

1<sup>e</sup> Forme : En granulés

**Composition :**

Hypophosphite de chaux .....	0 gr. 50
— fer.....	0 gr. 06
— manganèse.....	0 gr. 06

**Mode d'emploi.** — 1 cuill. à café à chacun des principaux repas.

2<sup>e</sup> Forme : En ampoules.

**Composition :**

Hypophosphites composés. ....	0 gr. 18
Sulfate de strychnine .....	1/10 de mgr.
Eau physiologique Q. P. ....	2 cm <sup>3</sup>

**Mode d'emploi.** — Le contenu d'une ampoule en injection sous-cutanée.

**Laboratoire de Bio-Chimie Appliquée**

21, Rue Théodore-de-Banville — PARIS (17<sup>e</sup>)

## ZYMATINE LESCÈNE

**Composition** — Galactozymases, Vitamines associées aux carbonophosphates minéralisants.

**Propriétés.** — Elle ne change pas la saveur du lait dont elle assure la conservation et la parfaite tolérance.

Fait disparaître les troubles digestifs et la constipation.

Le meilleur saturant dans l'hyperacidité stomacale. Elle supprime les fermentations secondaires.

**Indications.** — *Enfants* : Prophylaxie de la gastro-entérite, Maladies de nutrition aiguës ou chroniques, Constipation, Rachitisme.

*Adultes* : Constipation, Affections du tube digestif, Dyspepsies avec hyperacidité, Ulcères de l'estomac.

**Doses.** — *Enfants* : 1 centigramme par gramme de lait pur ou 2 cuillerées à café par litre de lait bouilli et refroidi ; agiter fortement pour mélanger. Donner tiède en agitant de temps en temps, à une température ne dépassant pas 50°.

*Adultes* : 1 à 2 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau avant ou après les repas.

**Laboratoires LESCÈNE**  
à LIVAROT (Calvados)











3<sup>e</sup> Partie

---

**TABLE**

par Indications Thérapeutiques  
des Spécialités  
figurant dans cet ouvrage

---



# Table par indications thérapeutiques des Spécialités figurant dans cet ouvrage

	Pages
Albuminurie .....	5
Alimentation — Régimes .....	5
Analgésiques externes — Anesthésiques.....	5
Analgésiques internes — Antinévralgiques.....	5-6
Anémie — Asthénie.....	6-7
Antipyrétiques .....	7
Antiseptiques externes — Désinfectants.....	7-8
Antiseptiques internes — Antioxygènes.....	8
Artériosclérose — Hypertension artérielle — Angine de poitrine, etc.....	8-9
Arthritisme — Goutte — Rhumatismes.....	9
Blennorrhagie.....	9-10
Bronches — Poumons — Appareil respiratoire.....	10-11
Calants — Antispasmodiques.....	11
Cœur — et Appareil circulatoire.....	11-12
Constipation.....	12
Convalescences.....	12-13
Dermatoses — Acné — Eczéma — Furunculose, etc.....	13-14
Empoisonnements et intoxications.....	14
Estomac.....	14
Foie — Pancréas — Rate.....	15
Gynécologie et Obstétrique.....	15
Hémostatiques.....	16
Hypnotiques.....	16
Intestins.....	16-17
Lymphatisme — Scrofule — Rachitisme.....	17-18
Maladies infectieuses — Grippe — Paludisme, etc.....	18
Nerfs (Hystérie, Epilepsie, Neurasthénie, etc).....	18-19
Obésité — Diabète.....	19
Ophthalmologie.....	19-20
Oto-Rhino — Laryngologie.....	20
Opothérapie et Vaccinothérapie.....	20-21
Peau et Cuir chevelu.....	21
Reconstituants, Stimulants, Toniques, Récalci- fiants.....	21-22
Stomatologie.....	23
Syphilis.....	23
Système veineux — Varices — Hémorroïdes.....	23-24
Tuberculose.....	24-25
Voies Génito-Urinaires (Reins, Vessie, Urètre, Tes- ticules, etc.).....	25



## I. — ALBUMINURIE

Afatyl.	Théobryl Roche (ampoules, gouttes).
Curatoxine.	Théosalvose.
Dialyl.	Uraseptine Rogier.
Doloma-Cenophos.	Urazinc.
Eau de Saint-Colomban.	Uroformine Gobey.
Immunizols Grémy.	Urométine Lambiotte.
Santhéose.	Urotrypsine.
Théisine.	

## II. — ALIMENTATION - RÉGIMES

Atural.	Mokavène.
Blédine Jaqueimaire.	Opothérapie Choay.
Embryonine Barré.	Opothérapie Le Pecq.
Extrait de malt français Desjardins.	Phosphatine Falières.
Farine lactée Salyy.	Produits diététiques Favri-ehon.
Képhir Salmon.	Psinase Grémy.
Kynosine.	Pulvo-Képhyr Salmon.
Lab-Ferment Petit-Mialhe.	Zymatine.
Lait caillé Salmon.	

## III. — ANALGÉSQUES EXTERNES ANESTHÉSQUES

Adrénaline Clin.	Goménol.
Algolane.	Kélène.
Bétul-Ol Midy.	Salène Cyba.
Chéloïdine.	Salénal Cyba.
Chloroforme Usines du Rhône.	Seurénaline.
Créosoforme Lambiotte.	Seurocaine.
Ether Usines du Rhône.	Seuroforme.
	Stovalne.

## IV. — ANALGÉSQUES INTERNES ANTINÉVRALGIQUES

Algoeratine Lancosme.	Antigrippine Midy.
Ampoules de Pantopon Roche.	Antipyrine Usines du Rhône
Ampoules de spasmalgine Roche.	Autodyné.
Antialgos Christlaens.	Asciatine Usines du Rhône.
	Aspirine Usines du Rhône.
	Aspirine granulée Usines du Rhône.

Atophan Cruet.  
 Béalol.  
 Bi-bromure Vicario.  
 Broméine Montagu.  
 Bromiase Couturieux.  
 Bromogénol Pépin.  
 Bromure Robin.  
 Bromure de Camphre Clin.  
 Bromures Souffron.  
 Dial Ciba.  
 Dialacétine Ciba.  
 Didial Ciba.  
 Energétène Valériane Byla.  
 Hypneural Cos.  
 Képhaldol.  
 Kluchol Remcaud.  
 Nareyl Grémy.  
 Neurène.  
 Neurinase.  
 Névralgol Brossard.  
 Pantopon Roche.  
 Paroxyl.  
 Pilules de Moussette.

Pyramidon Usines du Rhône.  
 Quictol.  
 Rhoféine.  
 Sédobrol Roche.  
 Solutions du D<sup>r</sup> Clin.  
 Spasmalgine Roche (Ampoules, Comprimés).  
 Spasminc Jolly.  
 Valbornine Rogler.  
 Valéral Puy.  
 Valérianate liquide Grignon.  
 Valérianate Picriot.  
 Valériane Byla.  
 Valériane (Extrait fluide Dausse).  
 Valériane Gmet (sans alcool).  
 Valérobromine Legrand.  
 Valéromenthol  
 Valéronal.  
 Véronidia Buisson.

## V. — ANÉMIE - ASTHÉNIE

Algatan.  
 Arséniode Buriat.  
 Amponles Churchill indolores.  
 Bi-iodures Souffron.  
 Biogénol Demasles.  
 Bionéol.  
 Biophorine Girard.  
 Blédine Jacquemaire.  
 Cacodyle-phosphaté Jacquemaire  
 Capsules de Morhuéine Puy.  
 Chlorocalcion.  
 Composés Gmet.  
 Comprimés Roche de Thio-col.  
 Dragées Hequet.  
 Electromartiol.

Embryonine Barré.  
 Eniode.  
 Extrait de malt français Desjardins.  
 Extrait hématique Choay.  
 Extrait moelle osseuse Choay.  
 Fer Bravais.  
 Féroxal.  
 Fer Rabuteau  
 Ferrocodile et Ferricodile.  
 Ferrophytine Ciba.  
 Ferrygène Carron.  
 Fortossan Ciba  
 Fosfoxyl Carron.  
 Fucus Gmet.  
 Glycérophosphates Robin.  
 Glykolaïne Robin.  
 Granulé Girard

Granules Crosnier.  
 Hémocrinol (lipoides H. I.)  
 Hémagénine du D<sup>r</sup> Girard.  
 Hémoglobine Byla.  
 Hémoglobine Deschiens.  
 Hémostyl du D<sup>r</sup> Roussel.  
 Hémotonine.  
 Holos.  
 Hypodermine Le Pecq.  
 Hypophosphites Churchill.  
 Iodaseptine Cortial.  
 Iodéyl Fournier.  
 Iodogénol Pépin.  
 Iodostarine Roche.  
 Iodurasc Couturieux.  
 Iodures Souffron.  
 Ionoïdes.  
 Jugland Gmet.  
 Kola Astier.  
 Lécithine Clin.  
 Lécithosine Robin.  
 Marinol.  
 Mésothorium Buisson.  
 Morrhuétine Jungken.  
 Narsénol.  
 Néoursycodile.  
 Néo-rhomnol.  
 Neurotrophol Byla.  
 Nucléarsitol Robin.

Nucléatol Robin.  
 Nucléo-Fer Girard.  
 Opocalcium du D<sup>r</sup> Guersant.  
 Opothérapie Le Pecq.  
 Pancalcine.  
 Pepto-Fer du D<sup>r</sup> Jaillet.  
 Peptonate de fer Robin.  
 Phosphate vital Jacquemaire.  
 Phytine Ciba.  
 Pilules Blancard.  
 Pilules Gip.  
 Quinquina Gmet.  
 Santogénol Caubin.  
 Sérum Neurophile Thévenot.  
 Sirop Blancard.  
 Sirop Crosnier.  
 Sirop Roche au Thiocol.  
 Splénoocrinol (lipoides H. I.)  
 Tabural Monal.  
 Tricalcine.  
 Triféryl.  
 Vanadarsine (Ampoules, Gouttes).  
 Vin de Bugeaud.  
 Vin Girard.  
 Vin et Sirop Nourry.  
 Zohol.

## VI. — ANTIPYRÉTIQUES

Antigrippine Midy.  
 Antipyrine Usines du Rhône  
 Aspirine Usines du Rhône.  
 Apaludol.  
 Dialacétine Ciba.  
 Elbon Ciba.

Néquinine Falières.  
 Pantopon Roche.  
 Pyramidon Usines du Rhône  
 Quinquina Gmet.  
 Rhoféine.

## VII. — ANTISEPTIQUES EXTERNES (DÉSINFECTANTS)

Aïrol Roche.  
 Aniodol.  
 Antiphlogistine.

Clonazone Daufresne.  
 Comprimés Guillaumin à  
 l'oxycyanure d'Hg.

Goménol.	Savons Lieutaud.
Lusoforme.	Savons Spa.
Néol.	Stéramine.
Savon Pérusol.	Thigénol Roche.
Savon Roche au thigénol.	Tochlorine.
Savons antiseptiques	Tubérol.
Vigier.	Vioforme Ciba.

## VIII. — ANTISEPTIQUES INTERNES (ANTITOXIQUES)

Aniodol.	Immunizols Grémy.
Apaludol.	Lebnol.
Atonos.	Lentol Couturieux.
Bulgarine Thépénier.	Levurase.
Chloramine.	Mycolysine du D <sup>r</sup> Doyen.
Colloïdes Clin.	Néolides.
Electrargol.	Opothérapie Le Péeq.
Electroéuprol.	Phylactone Byla.
Electrosélénium.	Produits Midy au Collargol.
Entéroseptyl Clérambourg.	Propidon.
Glycogène Clin.	Sauge Gmet.
Goménol.	Séliénol Couturieux.
Hypodermie Le Péeq.	Septicémine Cortial.
Hypodermozone.	Staphylase du D <sup>r</sup> Doyen.
Iodaseptine Cortial.	Staphylococcine.
Iodométine.	Thionhydrol Grémy.

## IX. — ARTÉRIOSCLÉROSE HYPERTENSION ARTÉRIELLE ANGINE DE POITRINE

Afatyl (lipoides H. I.)	Iodure Robin.
Bi-iodure Souffron.	Iodostarine Roche.
Cathiod.	Iodural Novat.
Dioséine Prunier.	Iodurase Couturieux.
Diurène.	Iodures Souffron.
Enlode.	Lipoïodine Ciba.
Eranol.	Mésothorium Buisson.
Goménol.	Opothérapie Chaoy.
Gul Gmet.	Opothérapie Le Péeq.
Gulpsine.	Opothérapie Moncour.
Iodéyl Fournier.	Riodine.
Iodogénol Pépin.	Sauthéose.



Théïsine.  
Théobryl Roche (Ampou-  
les, Gouttes).  
Théosalvose.  
Thyrénine Grémy.

Thyrol (lipoides H. I.)  
Trinitrine Vicario.  
Urotrypsine.  
Velnosine.

## X. — ARTHRITISME - GOUTTE - RHUMATISME

Afatyl (lipoides H. I.) .  
Algatan.  
Algolane.  
Antialgos Christiaens.  
Arthritose.  
Aspiriné Usines du Rhône.  
Aspirine granulée Usines  
du Rhône.  
Atophan Gruet.  
Azufrol.  
Bétul-ol Midy.  
Capsules de Morrhuine  
Puy.  
Cathiodé.  
Chéloïdine.  
Colchi-sal Midy.  
Collothiol.  
Corps thyroïdes Moneour.  
Curatoxine.  
Diabétifuge.  
Doloma-Cénophos  
Dialyl.  
Eau de Saint-Colomban.  
Extrait hépatique Choay.  
Extrait thyroïdien Choay.  
Fosfoxyll Carron.  
Fucus Gmet.  
Glycogène Clin.  
Goménol.  
Immunizols Grémy : Rhu-  
matisme.

Iodométine.  
Iodo-thyroïdine Catillon.  
Liqueur Laville.  
Néphroerinol (lipoides  
H. I.)  
Oxydothyroïne Paris.  
Panurol Tissot.  
Pilules du Dr Séjournet.  
Pipérazine Midy.  
Révulsif-liquide Boudin.  
Révulsior.  
Salène Ciba.  
Santhéose.  
Soluroi.  
Solutions du Dr Clin.  
Sphérulines Moneour.  
Sulfoiodol Robin  
Sulfurine.  
Théïsine.  
Théobryl Roche (Ampou-  
les, Gouttes).  
Thyonhydrol Grémy.  
Thyrénine Grémy.  
Uraseptine Rogler.  
Urazine.  
Uroformine Gobey.  
Urométine Lambiotte.  
Urotrypsine.  
Vin de Bugeand.  
Vulcase.

## XI. — BLENNORRHAGIE

Arhéol.  
Clonazone Daufresne.  
Coccidal Grémy.

Dmégon.  
Eumietine  
Goménol.

Gonacrine.  
 Immunizols Grémy : Ure-  
 trite.  
 Néol.  
 Pipérazine Midy.  
 Préventyl.  
 Salol Usines du Rhône.  
 Santal Monal.  
 Santhéose.  
 Sécacornine Roche.  
 Sektal Grémy.

Sirop Custos.  
 Théisine.  
 Théobryl Roche (Ampon-  
 les, Gouttes).  
 Théosalvose.  
 Thigénol Roche.  
 Uraseptine Rogier.  
 Urazine.  
 Uroformine Gobey.  
 Urométine Lambiotte.

## XII. — BRONCHES ET POUMONS

### ASTHME - COQUELUCHE, ETC.

Æthone.  
 Algatan.  
 Anaquintine Lescène.  
 Antiasthme Bengalais.  
 Antigrippine Midy.  
 Arséniodé Buriat.  
 Balsamol Lescène.  
 Biogénol Demasles.  
 Broméine Montagu.  
 Cachets Galacalcine La-  
 tour.  
 Cachets Roche de Thiocol.  
 Capsules Dartois.  
 Cigarettes Espic.  
 Collothiol.  
 Comprimés Roche de  
 Thiocol.  
 Dmétys.  
 Doloma-Enophos.  
 Elatine Bouin.  
 Elbon Ciba.  
 Elixir Duchamp.  
 Emulsion Marchais.  
 Entérozone.  
 Extrait Surréno-Hypophy-  
 saire injectable Choay.  
 Galacalcine Latour.  
 Germose.  
 Goménol.

Gouttes Nican.  
 Granules Crosnier.  
 Gouttes livoniennes de  
 Trouette-Perret.  
 Hémogénine du D<sup>r</sup> Giraud.  
 Immunizols Grémy : As-  
 thme; Asthme des foins;  
 Bronchites chroniques.  
 Iodéine Montagu.  
 Iodural Novat.  
 Kluchol Rémaud.  
 Kréofos Novat.  
 Lipoféine Ciba.  
 Marinol.  
 Mycolysine du D<sup>r</sup> Doyen.  
 Opothérapie Le Pecq.  
 Pancalcine.  
 Pantopon Roche.  
 Paroxyl.  
 Pastilles Géraudel.  
 Pastilles Méry.  
 Phosote Lambiotte.  
 Phosphotal Clin.  
 Poudre Espic.  
 Régénérateur Bouyer.  
 Résyl.  
 Révulsif Boudin.  
 Révulsior.  
 Saugé Gmet.

Sédogène Sallé.  
Sirop Aubergier.  
Sirop Crosnier.  
Sirop Roche au Thioeol.  
Terkal Monal.

Thioeol Roche.  
Thionhydrol Grémy.  
Thyrénine Grémy.  
Tubérol.  
Vulense.

### XIII. — CALMANTS - ANTISPASMODIQUES

Algoératine Laneosme.  
Ampoules de Pantopon  
Roche.  
Ampoules de Spasmalgine  
Roche.  
Aseiatine Usines du Rhône.  
Béatol.  
Bibromure Vleario.  
Broméine Montagu.  
Brominase Couturieux.  
Bromogénol Pépin.  
Bromone Robin.  
Bromure de Camphre Clin.  
Bromure Souffron.  
Energétène de Valériane  
Byla.  
Hypneural Cos.  
Kluehol Rémaud.  
Nareyl Grémy.  
Neurène.

Neurénase.  
Pantopon Roche.  
Paroxyl.  
Quiétol.  
Sédobrol Roche.  
Solutions du D' Clin.  
Spasmalgine Roche.  
Spasmine Jolly.  
Valbornine Rogier.  
Valéral Puy.  
Valérianate liquide Gri-  
gnon.  
Valérianate Pierlôt.  
Valériane Byla.  
Valériane Dausse.  
Valériane Gmet (sans alcool).  
Valérobromine Legrand.  
Valéromenthol.  
Valéronal.

### XIV. — CŒUR ET APPAREIL CIRCULATOIRE

Ampoules de Digalène  
Roche.  
Ampoules de Théobryl  
Roche.  
Cardioerinol (lipofides H. I.)  
Cathiodé.  
Digalène Roche.  
Digifoline Ciba.  
Digitale (Intrait Dausse).  
Digitaline cristallisée Nati-  
velle.  
Digitaline Petit-Mialhe.

Diurène.  
Extrait myocardique Choay  
Kola Astier.  
Kola Midy.  
Opothérapie Le Peeq.  
Ouabaïne.  
Pantopon Roche.  
Physéine Grémy.  
Santhéose.  
Séneornine Roche.  
Sirop a Digitale Labélonye.  
Sédobrol Roche.

Strophantus Catillon.  
Thélsine.  
Théobromose Dumesnil.

Théobryl Roche (Ampoules, Gouttes).  
Théosalvose.

## XV. — CONSTIPATION

Amylodiastase Thépénier.  
Cascara liquide Alexandre.  
Cascara Midy.  
Cascarine Leprince.  
Entérocrinol (lipoides H. L.)  
Extrait entéritique Choay.  
Extrait intestinal Moneour.  
Fermentérol Milan.  
Frangulose Flach.  
Hullaxine Gillot.  
Képhir Salmon.  
Laxagarine.  
Laxatif orgeat.  
Laxopeptine Girard.

Oléolaxine.  
Paraffinéol Hamel.  
Péristaltine.  
Purganol Daguin.  
Reetopanbline.  
Seorogène.  
Sirop de la Maternité.  
Suppositoires Pépet.  
Tamar Indien.  
Taxol.  
Thaolaxine.  
Tisane Saint-Luc.  
Varilaxine.  
Vasolaxine.

## XVI. — CONVALESCENCES

Ampoules Churchill indolores.  
Arsyeodile.  
Aseoléine Rivier.  
Bioealeose Chevreton.  
Biogénol Demasles.  
Biophorine Girard.  
Blédine Jacquemaître.  
Caeodylo-phosphate Jacquemaître.  
Calcéose.  
Calciline.  
Composés Gmet.  
Diasténine Grémy.  
Doloma-Enophos.  
Dragées Hœquet.  
Dragées névrosthéniques Yse.  
Electromartiol.  
Embryonine Barré.

Exo-Orehitine Byla.  
Extrait orehitique Choay.  
Feroxal.  
Fer Rabuteau.  
Ferrocodile et Ferrieodile.  
Ferrygène Carrau.  
Fortossan Ciba.  
Fosfoxyl Carron.  
Gaurol.  
Géodyl.  
Glycérophosphate Robin.  
Stykolaine Robin.  
Hémagénine du D<sup>r</sup> Giraud.  
Hémocrinol (lipoides H. L.)  
Hémoglobine Byla.  
Hémoglobine Deschiens.  
Hémostyl du D<sup>r</sup> Roussel.  
Holos.  
Hypodermine Le Pécq.  
Hypophosphite Churchill.

Injection Clin strychno-arséniée.  
 Kola Astier.  
 Kola Midy.  
 Lécithine Clin.  
 Lipochol Byla.  
 Marinol.  
 Médication arrhénique Clin  
 Mesothorium Buisson.  
 Morrhuétine Jungken.  
 Musculosine Byla.  
 Néo-Arsyeodile.  
 Néo-Rhomnol.  
 Neurôtrophol Byla.  
 Névrosthénine Freyssinge.  
 Nucléarsitol Robin.  
 Nucléatol Robin.  
 Nucléo fer Girard.  
 Opocalcium du D<sup>r</sup> Guer-  
 sant.  
 Opothérapie Choay.  
 Opothérapie Le Peeq.  
 Orellitine Byla.  
 Ostéo-hépatine.

Ovo-lécithine Billon.  
 Pancalcine.  
 Pepto-fer Jaillet.  
 Pepto-kola Robin.  
 Peptonate de fer Robin.  
 Phosphate vital Jacque-  
 maire.  
 Phytine Ciba.  
 Quina Laroche.  
 Quinéine.  
 Quinquina Gmet.  
 Rhomnol.  
 Santogénol Caubin.  
 Sirop d'Hémoglobine Byla.  
 Strychnarsitol Robin.  
 Strychno-Fluocodyle  
 Toni lécithine Rogier.  
 Tonikéine Chevrelin.  
 Tricalcine.  
 Vanadarsine.  
 Vin Bugeaud.  
 Vin Girard.  
 Vin et Sirop Nourry.  
 Zohol.

## XVII. — DERMATOSES - ACNÉ - ECZÉMA FURONCULOSE, ETC.

Baume Duret.  
 Bi-iodure Souffron.  
 Bulgarine Thépénier.  
 Clonazone Daufresne.  
 Collothiol.  
 Caratoxine.  
 Dermo-plastols Dumesnil  
 Dmesta.  
 Entéroseptyl Clérambourg.  
 Extrait thyroïdien Choay.  
 Eranol.  
 Favolysine Thiévenot.  
 Gastrô-Sodine.  
 Gominol.  
 Granules Crosnier.  
 Hémagénine du D<sup>r</sup> Giraud.

Immunizols Grémy : Acné,  
 Eczéma, Furonculese.  
 Iodéyl Fournier.  
 Iodogénol Pépin.  
 Iodone Robin.  
 Iodostarine Roche.  
 Iodothyriue Catillon.  
 Iodurase Couturieux.  
 Iodures Souffron.  
 Jugland Gmet.  
 Laccodermes.  
 Léonal.  
 Levurase.  
 Levurine Couturieux.  
 Lipiodine Ciba.  
 Nisaméline Trouette-Perret

Panurol Tissot.  
 Proeula.  
 Propidon.  
 Rioline.  
 Savon Lieutaud.  
 Savon Pérusol.  
 Savon Roche au Thigénol.  
 Savons Spa.  
 Savons Vigier.  
 Stannoxy.  
 Stanylose Thévenot.

Stanion.  
 Staphylase du D<sup>r</sup> Doyen.  
 Staphylo-coccine Fraquet.  
 Stéramine.  
 Thigénol Roche.  
 Thyréine Grémy.  
 Thionhydrol Grémy.  
 Ulcértine Berger.  
 Vulcase.  
 Xemaderm.

## XVIII. — EMPOISONNEMENTS INTOXICATIONS

Bulgarine Thépénier.  
 Charbon Tissot.  
 Colloïdes Clin.  
 Digalène Roche.  
 Electrargol.  
 Electrocuprol.  
 Electrosélénium.  
 Entéroseptyl Clérambourg.  
 Hypoderminine Le Pecq.  
 Iodaseptine.

Lantol Couturieux.  
 Mycolysine du D<sup>r</sup> Doyen.  
 Phylactone Byla.  
 Propidon.  
 Produits Midy au Collargol.  
 Sélénol Couturieux.  
 Septicémine.  
 Staphylase du D<sup>r</sup> Doyen.  
 Staphylo-coccine Fraquet.

## XIX. — ESTOMAC

Antacidol.  
 Bismuth Desleaux.  
 Charbon Tissot.  
 Condurango Gmet.  
 Doloma-Enophos.  
 Entérozone.  
 Extrait de malt français  
   Desjardins.  
 Extrait gastrique Choay.  
 Extrait gastrique Moncour.  
 Gélobarine.  
 Gastrosodine.  
 Képhir-Salmon.  
 Levurase.  
 Mangaine.  
 Opothérapie Choay.

Opothérapie Le Pecq.  
 Papaine Trouette-Perret.  
 Peptosthénine.  
 Poudre Génia.  
 Psinase Grémy.  
 Quina Laroche.  
 Royérine Dupuy.  
 Satnrol.  
 Sauge Gmet.  
 Sel de Hunt.  
 Spasmalgine Roche  
   (Ampoules).  
 Sphérulines gastriques  
   Moncour.  
 Vin de Bugeaud.

## XX. — FOIE - PANCRÉAS - RATE

Biléyl Fournier.  
 Boldo Gmet.  
 Chlorobyl.  
 Choléine Camus.  
 Cholélyse.  
 Choléo-boldine Thévenot.  
 Choléo Kinase.  
 Choléo-lactol.  
 Cholergine.  
 Diurène.  
 Extrait de bile Choay.  
 Extrait de bile Moncour.  
 Extrait hépatique Choay.  
 Extrait entéro-pancréatique Moncour.  
 Extrait pancréatique Choay  
 Extrait splénique Choay.

Gastrosodine.  
 Glycogène Clin.  
 Glycolactimase.  
 Hépatobyl.  
 Hépatocrinol (lipoides H. I.)  
 Jécol.  
 Opothérapie Choay.  
 Opothérapie Le Pecq.  
 Panbiline.  
 Pancréol (lipoides H. I.)  
 Peptosthénine.  
 Spasmalgine Roche (Ampoules, Comprimés).  
 Sphérulines Moncour.  
 Splénoocrinol (lipoides H. I.)

## XXI. — GYNÉCOLOGIE ET OBSTÉTRIQUE

Aïrol Roche.  
 Aniodol.  
 Clonazone Daufresne.  
 Comprimés Guillaumin à l'oxycyanure d'Hg.  
 Corps thyroïdes Moncour  
 Elixir de Virginie Nyrdhal.  
 Extrait ovarien Choay.  
 Extrait mammaire Choay.  
 Extrait placentaire Choay.  
 Extrait hypophysaire (lobe postérieur), injectable Choay.  
 Gobérol.  
 Goménol.  
 Gynocrinol (lipoides H. I.)  
 Gynolutéol (lipoides H. I.)  
 Hamamelis Gmet.  
 Immunizols Grémy : Métrites.  
 Néolides.  
 Novarine Vicario.

Oeréine Grémy.  
 Opothérapie Choay.  
 Opothérapie Le Pecq.  
 Ovules Derma.  
 Ovules Roche au Thigénol.  
 Physéine Grémy.  
 Poudre ovarienne Moncour  
 Savon antiseptique Lieutaud.  
 Savons antiseptiques Vigier-Huerre.  
 Savon Pérusol.  
 Savon Roche au thigénol.  
 Sécacornine Roche.  
 Sirop de la Maternité.  
 Syncrines n° 1 - 4 - 4bis - 6bis - 7.  
 Tampol Roche.  
 Thigénol Roche.  
 Thionhydrol Grémy.  
 Thyrénine Grémy.  
 Veinosine.

## XXII. — HÉMOSTATIQUES

Adrénaline Clin.	Gui Gmet.
Anthéma.	Guipsine.
Chlorocalcion.	Hamamelis (Extrait fluide Dausse).
Elixir de Virginie Nyrdaht.	Hamamelis Gmet.
Ergot de seigle.	Hémostyl du Dr Roussel.
Ergotine Bonjean.	Physcine Grémy.
Extrait de sérum sanguin Choay.	Seurénaline.
Extrait hypophysine (lobe postérieur) injectable Choay.	Sécacornine Roche (Ampoules, Comprimés).

## XXXIII. — HYPNOTIQUES

Ampoules de Pantopon Roche.	Neurintase.
Ampoules de Spasalgine Roche.	Nyctal.
Asciatine.	Pantopon Roche.
Bromiase Couturieux.	Sédobrol Roche.
Bromogénol Pépin.	Sédol.
Bromure de Camphre Clin.	Sirop d'Aubergier.
Bromures Souffron.	Sirops Henry Mure.
Dial Giba.	Spasalgine Roche (Ampoules, Comprimés).
Didial Giba.	Valbornine Rogier.
Energétène de Valériane Byla.	Valéral Puy.
Gardénal.	Valérianate Grignon.
Hypneural Cos.	Valérianate Pierlot.
Hypodermozone.	Valériane Gmet.
Nareyl Grémy.	Valérobromine Legrand.
Neurène.	Valéromenthol.
	Valéronal.
	Véronidia Buisson.

## XXIV. — INTESTINS

Acésine.	Bulgarine Thépénier.
Amylodiastase Thépénier.	Cascara liquide Alexandre.
Bismuth Desleaux.	Cascara Midy.
Biolactyl Fournier.	Cascarine Leprince.
Blédine Jacquemaire.	Cathiodé.
Boldo Gmet.	Charbon Tissot.
Boléase Monal.	Chloramine.



Chlorobyl.  
 Choléltoires Byla.  
 Condurango Ginet.  
 Coréine.  
 Créosotforme, Lamblotte.  
 Doloma-Cénophos.  
 Entéroseptyl Clérambourg.  
 Extrait de bile Choay.  
 Extrait entérifique Choay.  
 Extrait entéro-hépatique  
 Choay.  
 Extrait intestinal Moncour.  
 Fermentérol Milan.  
 Fixine Grémy.  
 Frangulose Flaeh.  
 Gastro-Sodine.  
 Gélotanin.  
 Glycolactimase.  
 Goménol.  
 Gouttes Lolotsé Isberg.  
 Huilaxine Gillot.  
 Immunizols Grémy : Ap-  
 pendicite ; Dysenterie ;  
 Entérite.  
 Képhir-Salmon.  
 Lactimase.  
 Laetobacilline.  
 Laetolaxine Fydan.  
 Laetoxymase.  
 Laxagarine.  
 Laxatif Orgeat.  
 Laxopeptine Girard.  
 Lebnol.  
 Levurase.  
 Mangaine.

Marron d'Inde (Dausse).  
 Oléolaxine.  
 Opothérapie Le Pecq.  
 Paneréol (lipoides H. I.)  
 Panlaeto Midy.  
 Papaine Trouette-Perret.  
 Paraffinéol Hamel.  
 Peptosténine.  
 Péristaltine.  
 Phylactone Byla.  
 Physéine Grémy.  
 Poudre Génla.  
 Pstase Grémy.  
 Pommade Midy.  
 Purganol Daguin.  
 Reetoline.  
 Reetopanbiline.  
 Salol Usines du Rhône.  
 Seorogène.  
 Sirop de la Maternité.  
 Sphérulines entérifiques  
 Moncour.  
 Suppositoires Adreno-Styp-  
 tiques Midy.  
 Suppositoires Pepet.  
 Tenifuge Kien.  
 Tamar indien.  
 Taxol.  
 Thaolaxine.  
 Thigénol Roche.  
 Tisane Saint-Luc.  
 Varilaxine.  
 Vasolaxine.  
 Vulease.

## XXV. — LYMPHATISME - SCROFULE

### RACHITISME

Arséniodé Buriat.  
 Cachets Roche de Thioeol.  
 Cacodylo-phosphate Jac-  
 quemaire.

Capsules de Morrhuine Puy.  
 Chloro-Calcion.  
 Comprimés Roche de  
 Thioeol.

Embryonine Barré.  
 Extrait malt français Des-  
 jardins.  
 Extrait moelle osseuse  
 Choay.  
 Fosfoxyll Carron.  
 Glycérophosphate Robin.  
 Granulé Girard.  
 Holo.  
 Hypophosphites Churchill  
 Iodaseptine Cortial.  
 Iodéyl Fournier.  
 Iodogénol Pépin.  
 Iodostarine Roche.  
 Iodurase Couturieux.

Lécithine Clin.  
 Lécithosine Robin.  
 Marinol.  
 Morhuétine Jungken.  
 Opocalcium de D' Guersant.  
 Pancalcine.  
 Phosphate vital Jacque-  
 maire.  
 Phosphogène Favrichon.  
 Phytine.  
 Sirop Roche au Thiocol.  
 Tricalcine.  
 Vanadarsine.  
 Zohol.

## XXVI. — MALADIES INFECTIEUSES GRIPPE - PALUDISME, ETC.

Apaludol.  
 Alonos.  
 Colloïdes Clin.  
 Digalène Roche.  
 Hypodermozone.  
 Immunizols Grémy.  
 Opothérapie Le Pecq.

Produits Midy au Collargol.  
 Propidon.  
 Sélénol Couturieux.  
 Septicémine.  
 Staphylase du D' Doyen.  
 Staphylo-coccine.  
 Thyonhydrol Grémy.

## XXVII. — NERFS (HYSTÉRIE, EPILEPSIE, NEURASTHÉNIE, ETC.)

Ampoules de Pantopon  
 Roche.  
 Ampoules de Spasmalgine  
 Roche.  
 Antialgos Christiaens.  
 Béatol.  
 Bionéol.  
 Broméine Montagu.  
 Bromiase Couturieux.  
 Bromogénol Pépin.  
 Bromure Robin.  
 Bromure de camphre Clin.  
 Bromures Souffron.

Cacodylo-phosphate Jac-  
 quemaire.  
 Cérébrocrinol (lipoïde  
 H. I.)  
 Dial Ciba.  
 Dialacétine Ciba.  
 Diasténine Grémy.  
 Doloma-Cenophos.  
 Dragées névrossthéniques  
 Yse.  
 Encrétène de valériane  
 Byla.  
 Fosfoxyll Carron.

Gardéual.  
 Glycérophosphate Robin.  
 Hypneural Cos.  
 Neurène.  
 Neurinase.  
 Neurotrophol Byla.  
 Opothérapie Choay.  
 Opothérapie Le Pecq.  
 Panbiline.  
 Pantopon Roche.  
 Phosphate vital Jacquemais.  
 Pilules de Moussette.  
 Quiétol.  
 Sédobrol Roche.  
 Sédol.  
 Sérum Neurophile Thévenot.

Sirop d'Aubergier.  
 Spasmalgine Roche.  
 Spasmine Jolly.  
 Staphylase bromurée du Dr Doyen.  
 Valbornine Rogier.  
 Valéral Puy.  
 Valériane Gmet (sans sucre).  
 Valérianate liquide Grignon.  
 Valérianate Pierlot.  
 Valériane (Extrait fluide Dausse).  
 Valériane (Intrait Dausse).  
 Valérobromine Legrand.  
 Valéromenthol.  
 Valéronal.  
 Véronidia Buisson.

## XXVIII. — OBÉSITÉ - DIABÈTE

Afatyl (Iipoïdes H. I.)  
 Algatan.  
 Algolane.  
 Corps thyroïde Moneour.  
 Diabétifuge.  
 Doloma-Génophos.  
 Dialyl.  
 Eau de Saint-Colomban.  
 Extrait thyroïdien Choay.  
 Fucus Gmet.  
 Iodométine.  
 Iodostarine Roche.  
 Iodo-thyroïdine Catillon.  
 Oxydothyridine Pâris.

Panurot Tissot.  
 Pilules du Dr Séjournet.  
 Santhéose.  
 Théisine.  
 Théobryl Roche (Ampoules, Gouttes).  
 Théosalvose.  
 Thyrénine Grémy.  
 Uraseptine Rogier.  
 Urazine.  
 Uroformine Gobey.  
 Urométine Lambiotte.  
 Vin de Bugeaud.

## XXIX. — OPHTHALMOLOGIE

Adrénaline Clin.  
 Aniodol.  
 Clonazone Daufresne.  
 Colluberine Dupuy.  
 Goménol.

Immunizols Grémy : Conjonctivites ; Ulcérations de la Cornée.  
 Néol.  
 Ophtalmine.

Scurénaline.  
Seurocaine.  
Seuroforme.  
Sirop Crosnier.

Stéramine.  
Thigénol Roche.  
Thionhydrol Grémy.  
Vioforme Ciba.

### XXX. — OTO-RHINO - LARYNGOLOGIE

Adrénaline Clin.  
Aniodol.  
Antiasthme Bengalais.  
Arhine.  
Audigénine.  
Cigarettes Espic.  
Clonazone Daufresne.  
Cocaine Midy.  
Colluborine Dupuy.  
Goménol.  
Granules Crosnier.  
Immunizols Grémy : As-  
thme des Foins; Otites.

Kipsol.  
Néol.  
Pastilles Géraudel.  
Pastilles Mackenzie.  
Pastilles Méry.  
Rhino-menthol.  
Stéramine.  
Sulfuryl Monal.  
Tablettes d'oxymenthol  
Perraudin.  
Thigénol Roche.  
Vioforme Ciba.

### XXXI. — OPOTHÉRAPIE ET VACCINOTHÉRAPIE

Choléine Camus.  
Choléo Kinase.  
Endocrisines Fournier.  
Extraits totaux Choay.  
Immunizols Grémy : Absès  
chauds - Plaies suppu-  
rées; Absès froids - Fis-  
tules; Aené; Appendi-  
cite; Asthme; Asthme des  
foins Bronchites chro-  
niques; Conjunctivites;  
Cystites-Pyélonéphrites;  
Dysenterie; Eczéma-Pso-  
triasis; Entérite; Furon-  
culose; Gangrène; Grip-  
pe; Métrites; Méningoco-  
que; Ostéomyélite; Otites;  
Rhumatismes; Sarcome;

Typhoïde; Ulcérations de  
la cornée; Uréthrites.  
Lipoides H. I. — Chaque  
lipotide est en même  
temps un aliment et un  
excitant pour l'organe  
dont il provient.  
Oeréine Grémy.  
Opothérapie Byla.  
Opothérapie Choay.  
Opothérapie Fournier  
Frères.  
Opothérapie Le Pecq.  
Opothérapie Moncour.  
Opothérapie Viglier-Huerre  
Opothérapie Paris.  
Ostéohépatine.  
Panglandine.

Peptostémine Choay.  
 Physéine Grémy.  
 Synerines Choay.  
 Thyrénine Grémy.

Vaccins atoxiques stabilisés Poulenc.  
 Vaccins microbiens curatifs et préventifs Grémy.

## XXXII. — PEAU ET CUIR CHEVELU

Aniodol.  
 Baume Duret.  
 Bi-iodure Souffron.  
 Bulgarine Thépénier.  
 Clonazone Daufresne.  
 Collothiol.  
 Caratoxine.  
 Dermo-plastols Dumesnil.  
 Dmesta.  
 Entéroseptyl Clérambourg.  
 Éranol.  
 Extrait Thyroïdien Choay.  
 Favolysine Thévenot.  
 Gastro-Sodine.  
 Goménol.  
 Granules Crosnier.  
 Hémagénine du D<sup>r</sup> Giraud.  
 Immunizols Grémy : Acné ;  
     Eczéma. — Psoriasis ; Fu-  
     roneulose.  
 Iodéyl Fournier.  
 Iodogénol Pépin.  
 Iodone Robin.  
 Iodostarine Roche.  
 Iodothyroïdine Catillon.  
 Iodurase Couturier.  
 Iodures Souffron.  
 Jugland Gmet.  
 Lacodermes.

Labriol.  
 Levurase.  
 Levurine Couturier.  
 Lipoiodine Ciba.  
 Nissaméline Trouette-Perrét.  
 Panurol Tissot.  
 Proenta.  
 Propidon.  
 Riodyne.  
 Savon Lieutaud au gou-  
     dron boraté.  
 Savon marque Spa, à tous  
     médicaments.  
 Savon Pérusol.  
 Savon Roche au Thigénol.  
 Savons antiseptiques Vigier  
     et Huerre.  
 Stanion Couturier.  
 Stannoxyl.  
 Stanylose Thévenot.  
 Staphylase du D<sup>r</sup> Doyen.  
 Staphylocoociné Fraquet.  
 Stéramine.  
 Thigénol Roche.  
 Thyrénine Grémy.  
 Thionhydrol Grémy.  
 Uléérine Berger.  
 Vulcase.  
 Xemaderm.

## XXXIII. — RECONSTITUANTS - STIMULANTS TONIQUES - RÉCALCIFIANTS

Ampoules Churchill Indo-  
 lores.  
 Arsyco-dyle  
 Ascéléine Rivier.

Biocalcose Chevreton.  
 Biogénol Demasles.  
 Biophorine Girard.  
 Blédine Jacquemaire.

Cacodylo-Phosphate Jacquemaire.  
 Calcéose.  
 Calciline.  
 Composés Gmet.  
 Diasténine Grémy.  
 Doloma-Cenphos.  
 Dragées Hecquet.  
 Dragées névrosthéniques Ysc.  
 Electromartiol.  
 Embryonine Barré.  
 Exo-orchitine Byla.  
 Extrait orchitique Choay.  
 Extrait surrénal Choay.  
 Feroxal.  
 Fer Rabuteau.  
 Ferrocodile et Ferrieodile.  
 Ferrygène Carron.  
 Fortossan Ciba.  
 Fosfoxyl Carron.  
 Gaurol.  
 Géodyl.  
 Glycérophosphate Robin.  
 Glykolaïne Robin.  
 Hémagénine du D<sup>r</sup> Giraud.  
 Hémocrinol (lipoides H. I.)  
 Hémoglobine Byla.  
 Hémoglobine Deschiens.  
 Hémostyl du D<sup>r</sup> Roussel.  
 Holes.  
 Hypodermie " Le Pecq ".  
 Hypophosphites Churchill  
 Injection Clin strychno-arséniée.  
 Kola Astier.  
 Kola Midy.  
 Lécithine Clin.  
 Lipochol Byla.  
 Marinol.  
 Médication arrhénique composée Clin.  
 Médication arrhénique simple Clin.

Mésothorium Buisson.  
 Morrhuétine Juncken.  
 Musculosine Byla.  
 Néo-arsyeodile.  
 Néo-Rhominol.  
 Neurosine Prunier.  
 Neurotrophol Byla.  
 Névrosthénine Freyssinge.  
 Nucléarsitol Robin.  
 Nucléatol Robin.  
 Nucléo-fer Girard.  
 Opocalcium du D<sup>r</sup> Guersant  
 Opothérapie Choay.  
 Opothérapie Le Pecq.  
 Orchitine Byla.  
 Ostéohépatine.  
 Ovlécithine Billon.  
 Pancaleine.  
 Pepto-fer Jaillet.  
 Pepto-Kola Robin.  
 Peptonate de fer Robin.  
 Phosphate Vital Jacquemaire.  
 Phytine Ciba.  
 Quina-Laroche.  
 Quinéine.  
 Quinquina Gmet.  
 Rhominol.  
 Santogénol Caubin.  
 Sirop d'Hémoglobine Byla.  
 Strychnarsitol Robin.  
 Strychnofluocodyle.  
 Toni-lécithine Rogier.  
 Tonikéine Chevreton.  
 Tricalcine.  
 Vanadarsine (ampoules-gouttes).  
 Vin de Bugeaud.  
 Vin Girard.  
 Vin et Sirop Nourry.  
 Zohol.  
 Zymatine.

## XXXIV. — STOMATOLOGIE

Adrénaline Clin.  
 Aniodol.  
 Antipyrine Usines du Rhône  
 Aspirine Usines du Rhône.  
 Clonazone Daufresne.  
 Dial Ciba.  
 Didial Ciba.  
 Képhaldol.

Néol.  
 Névralgol Brossard.  
 Pilules de Moussette.  
 Pyramidon Usines du Rhône  
 Quiétol.  
 Spasmalgine Roche.  
 Véronidia Buisson.

## XXXV. — SYPHILIS

Arquéritol Lesure.  
 Arsénobenzol.  
 Biiodure Hg. Midy.  
 Biiodures Souffron.  
 Cathiote.  
 Cérébrocrinol (lipoides  
 H. I.)  
 Cosmargyre Thévenot.  
 Electr. Hg.  
 Elixir Déret.  
 Elixir iododépuratif Pépin.  
 Enésol.  
 Eniode.  
 Eranol.  
 Granules Crosnier.  
 Hydrargol.  
 Huiles stérilisées Vigier-  
 Huerre.  
 Hypodermic Le Pecq.  
 Iodaseptine Cortial.  
 Iodéyl Fournier.  
 Iodogénol Pépin.  
 Iodone Robin.  
 Iodostarine Roche.

Iodurase Coufurieux.  
 Iodures Souffron.  
 Lipogyre Ciba.  
 Lipiodine Ciba.  
 Narsénol.  
 Novargyre.  
 Novarsénobenzol.  
 Pilules d'Hermal Breton-  
 neau.  
 Préventyl.  
 Riodine.  
 Savon dentifrice Vigier.  
 Savon marque Spa à tous  
 médicaments.  
 Sirop Crosnier.  
 Staphylase iodurée du D'  
 Doyen.  
 Sulfarène.  
 Sulfarsénol.  
 Sulfoiodol Robin.  
 Suppergyres du D' Faucher  
 Thionhydrol Grémy.  
 Vin et Sirop Nourry.

XXXVI. — SYSTÈME VEINEUX  
VARICES - HÉMORROIDES

Dioséine Prunier.  
 Gouttes de Séru.  
 Gouttes Lolotsé Isberg.

Hamaméline Royn.  
 Hamamélis (Extrait fluide  
 Dausse).

Hamamelis Gmet.  
Pommade Midy.  
Rectoline.

Suppositoires Midy.  
Veinosine.

## XXXVII. — TUBERCULOSE

Algatan.  
Ampoules Churchill.  
Ascoléine Rivier.  
Bactioxyne.  
Bioealeose Chevretin.  
Biogénol Demasles.  
Bionéol.  
Biophorine Girard.  
Caehets Roche de Thiocol.  
Cacodylo-phosphate Jacquemaître.  
Calcéose.  
Calciline.  
Capsules de Morrhuine Puy  
Cathode.  
Chlorocaléion.  
Cholergine.  
Collothiol.  
Composés Gmet.  
Comprimés Roche au  
Thiocol.  
Doloma-Cenophos.  
Elatine Bouin.  
Elbon Ciba.  
Elixir Duchamp.  
Embryonine Barré.  
Emulsion Marchais  
Fétoissan Ciba.  
Fosfoxyl Carron.  
Guiacaleine La Tour.  
Gaurôl.  
Géodyl.  
Germose.  
Geménol.  
Gouttes livoniennes de  
Tronette-Perret.  
Gouttes Nican.  
Granules Crosnier.

Granulé Girard.  
Hémagénine du D<sup>r</sup> Giraud  
Hémoglobine Deschiens.  
Hémostyl du D<sup>r</sup> Roussel.  
Holos.  
Hypodermic Le Pecq.  
Hypophosphites Churchill  
Immunizols Grémy : Abscès  
froids. — Fistules.  
Iodéine Montagu.  
Jugland Gmet.  
Kola Astier.  
Kola Midy.  
Kréofos Novat.  
Mésothorium Buisson.  
Morrhuetine Jungken.  
Musculosine Byla.  
Néocarsycodile.  
Neurotrophol Byla.  
Nucléarsito<sup>1</sup> Robin.  
Nucléotol Robin.  
Nucléo-fer Girard.  
Opocalcium du D<sup>r</sup> Guersant  
Ostéohépatine.  
Ostréine Buisson.  
Pancalcine.  
Pélospanines Fournier.  
Phosol Lambiotte.  
Phosphate vital Jacquemaître.  
Phosphotal Clin.  
Phytine Ciba.  
Régénérateur Bouyer.  
Révulsif liquide Boudin.  
Révulsior.  
Résyl Ciba.  
Santogénol Caubin.  
Sauge Gmet.



Sirop Crosnier.  
 Sirop Roche au Thiocol.  
 Terkal Monal.  
 Thiocol Roche.  
 Tonikéine Chevreton.  
 Tricaleine.  
 Tuberculiné C. L.

Tubérol.  
 Vanadarsine (ampoules,  
 Gouttes).  
 Vin de Bugeaud.  
 Vin Girard.  
 Zohol.

### XXXVIII. — VOIES GÉNITO-URINAIRES

(REINS, VESSIE, URÈTRE, TESTICULES, etc...)

Arhèol.  
 Atonos.  
 Clonazone Daufresne.  
 Cocéidal Grémy.  
 Colchi-Sal Midy.  
 Dmégon.  
 Eau de Saint-Colomban.  
 Elatine Boulm.  
 Eumictine.  
 Extrait Rénal Choay.  
 Extrait Rénal Moncour.  
 Globules Romon.  
 Goménol.  
 Gonacrine.  
 Hamamelis Gmet.  
 Hétérolysine Oliviero.  
 Immunizols Grémy : Uré-  
 thrite.  
 Néphrocrinol (lipéides  
 H. I.)

Panurool Tissot.  
 Pipérazine Midy.  
 Préventyl.  
 Salol Usines du Rhône.  
 Santal Monal.  
 Santhéosc.  
 Sécacornine Roche.  
 Sektal Grémy.  
 Septicémine.  
 Sirop Custos.  
 Sphérullines Moncour.  
 Thésine.  
 Théobryl Roche (Ampou-  
 les, Gouttes).  
 Thigénol Roche.  
 Uraseptine Rogier.  
 Urazine.  
 Uroformine Gobey.  
 Urométine Lambiotte.



